

581.9453
R83



LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN

Special Book Fund
1910

Sept 6 1899 R. W. Gibson - Inv



R. Friedländer
& Sohn, Berlin







3

FLORA

DEI LIDI VENETI

DI

G. RUCHINGER

GIARDINIERE DELL'I. R. ORTO BOTANICO

DEL LICEO DI VENEZIA

IN VENEZIA

PRESSO GIO. GIACOMO FUGHS

Dalla Tip. Picotti, 1818.

.R82

OPERE CITATE.

- Barr. ic.* Plantae per Galliam, Hispaniam et Italianam observatae a I. Barrelliero, fol. Paris, 1714.
- Bauh. Hist.* Historia universalis Plantarum, Auctoribus I. Bauhino, I. H. Cherlero, D. Chabreo, vol. 3, fol. Ebrodum, 1650-1651.
- Diet. Lex.* Lexicon der Gärtnerey und Botanick von F. G. Dietrich. Berolin vol. 10. 8.vo.
- Donat. marin.* Della Storia naturale dell' Adriatico di V. Donati, 4.to Ven. 1750.
- Fuchs Hist.* De Hist. Stirpium etc. fol. Basil. 1542.
- Ginan. op. post.* Opere postume del co. Ginnani, fol. Venezia, 1755.
- Linn. Sp. pl.* Caroli a Linnè Species Plantarum, vol. 2. 8.vo Holm.
- EjUSD. Syst. Nat.* Systema Naturae et XIII. a Gmelin, tom. 2. 4.to, Lyon, 1797.
- Matth. Piet. And.* Matthioli nelli sei libri di P. Dioscoride, vol. 2. fol. Ven. 1604.
- Pers. Syn.* Synopsis Plantharum curante. C. H. Persoon, vol. 2. 16.mo, Paris, 1805-1807.
- Röhl. germ.* Deutschlands Flora von I. C. Röbling, Frankf. 1813.
- Roth. cat.* Catalecta botanica ab I. W. Roth. vol. 3. 8vo, 1797-1806.
- EjUSD. neue Beitr.* Neue Beiträge zur Botanick von A. W. Roth, 8.vo, Frankf. 1802.

- Sav. Bot. Etrusc.* Botanicon Etruscum ab C. Savi,
8.vo, 1807.
- EjUSD. Mat. med.* Materia medica Vegetabile Toscana
di Gaetano Savi, fol. Florent. 1805.
- EjUSD. Obs.* Observationes in varias Trifoliorum Spe-
cies, 8.vo, Florent. 1811.
- Schreb. Gram.* Beschreibung der Gräser nebst ihren
Abbildungen von I. C. D. Schreber, fol. Lips. 1769
1810.
- Schult. aust.* Oesterreichs Flora von Schultes, vol. 2.
8.vo, 1814-1815.
- Tratt. Fung.* Fungi austriaci ab L. Trattinick, 4to,
Wien. 1805.
- Wulf. Crypt.* Cryptogamia aquatica ab X. Wulfen,
Lips. 1800.
- Zannich. Ven.* Istoria delle Piante che nascono nei Li-
di intorno a Venezia di I. Zannichelli, fol. Ve-
netiis, 1735.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

SALICORNIA. (Glasschmalz) Salicornia.

Cal. ventricoso intero. Petali 0. Seme 1.

1. *S. fruticosa*. (Strauchartiges G.) *S. frutescente*.

Fusto dritto fruticoso. *L. Pers. Syn. I p. 5. Röhl. germ. II p. 90.*

S. geniculata sempervirens. Zannicheli Ven. icon. tab. 32.

Nasce abbondantemente nei luoghi detti comunemente Barene; fiorisce nei mesi d' Agosto e Settembre.

2. *S. herbacea*. (Krautartiges G.) *S. erbacea*.

Fusto erbaceo allargato, articoli compressi nell' apice, smarginato-bifidi, spighe ascellari opposte picciolate, squame ottuse. *Pers. Syn. I p. 5. Röhl. germ. II p. 90. Schult. aust. I p. 4.*

S. geniculata annua. Zann. Ven. ic. tab. 33. f. 11. Cali geniculatum sive Salicornia Bauh. Hist. tom. III p. 705. cum icone.

Kali geniculatum. Barr. ic. tab. 192.

Nasce nei luoghi detti Barene; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è annuale.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

LIGUSTRUM. (Hartriegel) Ligustro.

Cor. 4 fida. *Bacca* con quattro semi.

L. vulgare. (Gemeiner H.) *L. vulgare.*

Foglie ovate acute, pannocchia con fiori approssimati. *L. Pers. Syn.* I p. 8. *Röhl. germ.* II p. 81. *Schult. aust.* I p. 15. *Ligustrum.* *Zann. Ven.* p. 164. *Bauh. Histor.* I p. 528. cum icone.

Ligustro. *Matth.* p. 187. cum icone.

Nasce intorno il luogo detto Malghera e nel Cavallino, nelle Siepi; fiorisce nei mesi di Maggio, e Giugno, ed è frutticoso.

ORNUS. (Waldesche) Orno.

Cal. 4. partito. *Cor.* 4. partita con petali bislungi, lineari. *Filamenti* lunghi. *Noce* alata.

O. europaea (Europäische W.) *O. europeo.*

Pers. Syn. I p. 9.

Fraxinus Ornus. *L. Röhl. germ.* II p. 91. *Schult. aust.* I p. 81.

Fraxinus tenuiori et minori folio. *Bauh. Hist.* I p. 177. cum icone.

Nasce in Campalto e Treporti; fiorisce il mese di Maggio, ed è arboreo.

VERONICA. (Ehrenpreis) Veronica.

Cor. col limbo 4. partito, colla lacinia inferiore minore. *Cass.* di due cavità.

1. *V. spicata.* (Ehrentragender E.) *V. spicata.*
 Spiga terminale, foglie opposte intaccate ottuse, nella cima interissime, fusto ascendente semplicissimo. *L. Pers. Syn.* I p. 10. *Röhl. germ.* II p. 82. *Schult. aust.* I p. 15. *Savi Bot. Etrusc.* p. 1.
V. spicata minor. *Zann. Ven. ic. tab.* 73.
V. spicata recta minor Bauh. Hist. III p. 282. cum icone.
Nasce nel Cavallino nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.
2. *V. Chamaedris* (Wald E.) *V. dei boschi.*
 Grappoli laterali, foglie ovate sessili rugose dentate, fusto munito di due serie di peli. *L. Pers. Syn.* I p. 12. *Röhl. germ.* II p. 85. *Savi. Bot. Etrusc.* p. 13. *Chamaedris spuria latifolia Bauh. Hist.* III p. 286. cum icone.
Nasce in Campalto appresso le Siepi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è perenne.
3. *V. agrestis.* (Aker E.) *V. campestre.*
 Fusto giacente, foglie cordato-ovate intagliate, più corte del peduncolo richinato. *L. Röhl. germ.* II p. 86. *Schult. Aust.* I p. 29. *Savi Bot. Etrusc.* p. 14.
V. flosculis longis pediculis insidentibus, Chamaedrios folio. Zann. Ven. p. 274.

Alsine serrato folio glabro. *Bauh. Hist.* III p. 366. cum icone.

Nasce comunemente negli Orti; fiorisce nei mesi di Marzo e Aprile, ed è annuale.

4. *V. serpyllifolia* (Quendelblättriger E.) V. a foglie di Serpillo.

Fiori solitarii quasi in spica, foglie ovate, le inferiori intaccate, fusto alla base serpeggiante.

Pers. Syn. V. foemina quibusdam aliis Betonica Pauli, Serpillifolia. *Bauh. Hist.* III p. 285. cum icone.

Nasce in Campalto nei Prati unidi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

5. *V. hederæ folia*. (Epheublättriger E.) V. a foglie d'edera.

Fiori solitarii, foglie cordato-subrotonde piane 5.

lobe, più corte del peduncolo, foglie calicine ovate, fusto giacente. *L. Pers. Syn.* I p. 13. *Röhl. germ.* II p. 86. *Schult. aust.* I p. 30. *Savi Bot.*

Etrusc. p. 16.

V. cymbalariaefolio, verna *Zann. Ven.* p. 274.

Alsines Genus, Fuchsio, Folio hederulae hirsuto

Bauh. Hist. III p. 368. cum icone.

Nasce comunemente negli Orti; fiorisce nei mesi di Marzo e Aprile, ed è annuale.

GRATIOLA (Purgierkraut). Graziola.

Cal. di 7. foglie, delle quali le due foglie esteriori patenti. *Cor.* resupinata. *Stami* 4. dei quali due sterili. *Cass.* di due cavità.

G. officinalis. (Eches P.) *G. officinale*.

Fusto eretto semplice, superiormente quadrangolare, foglie lanceolate seghettate, fiori pedunculati. *L. Pers. Syn.* I p. 14. *Röhl. germ.* II p. 87. *Schult; aust.* I. p. 32.

Savi. Mat. Med. tab. V. Bot. Etrusc. p. 18.

G. centauroides. *Zann. Ven. p.* 134. *tab.* 293.

Gratiola. Bauh. Hist. III p. 434. cum icone.

Gratiola Matth. p. 734. cum icone mediocri.

Nasce comunemente intorno Malghera e Campalto nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

UTRICULARIA. (Wasserschlauch) *Utricularia*.

Cal. di due foglie eguale. *Cor.* ringente spronata. *Stami* piegati in dentro; *Cass.* di una sola cavità.

U. vulgaris. (Gemeiner. W.) *U. volgare*.

Nettario conico, labbro superiore intero, eguale al palato, foglie pennato-moltofesse *L. Pers. Syn.* I p. 18. *Röhl. germ.* II p. 88. *Schult. aust.* I p. 33. *Savi. Bot. Etrusc. p.* 19.

Millefolium aquaticum flore luteo galericulato Bauh. Hist. III p. 783. icone.

Nasce intorno Malghera e Campalto; fiorisce nei mesi di Giugno sin Agosto, ed è perenne.

LYCOPUS. (Wolfsfuss) *Licopo*.

Cal. tubuloso 5. fido. *Cor.* tubulosa quasi eguale 4. fida, colla lacinia superiore smarginata. *Semi* 4.

L. vulgaris. (Gemeiner W.) *L. volgare.*

Foglie sinuato-seghettate appendicolate. *Pers. Syn.* I p. 24.

L. europaeus. *L. Röhl. germ.* II p. 88. *Schult. aust.* I p. 35.

L. palustris glaber. *Zann. Ven.* p. 177.

Marrubium aquaticum quorumdam. *Bauh. Hist.* III p. 318. cum icone.

Siderite prima. *Matth.* p. 1056. cum icone.

Nasce comunemente in Malghera e Malamocco nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre ed è perenne.

SALVIA. (Salbey) *Salvia.*

Cor. ringente, filamenti con un'appendice nella parte inferiore. *Semi* 4.

S. pratensis. (Wiesen S.) *S. dei prati.*

Foglie cordato-bislunghe intagliate e intaccate, brattee più corte dei calici, labbro superiore glutinoso, più lungo dell'inferiore. *Pers. Syn.* I p. 26. *Röhl. germ.* II p. 89. *Schult. aust.* I p. 36.

Sclarea pratensis, foliis serratis, flore caeruleo. *Zannich. Ven.* p. 239.

Gallitrichum sylvestre vulgo, sive silvestri Sclarea. Flore purpureo caeruleoemagno. *Bauh. Hist.* III p. 311. cum icone.

β con fiori rosei.

Nasce comunemente nei Prati specialmente intorno Malghera; fiorisce tutta la state, ed è perenne.

ANTHOXANTHUM. (Ruchgras) Antossanto.

Cal. Gluma 2. valve con un solo fiore. *Cor.* Gluma
2. valve acuminata restata. *Seme* 1.

A. odoratum (Wohlriechendes R.) A. odoroso.

Pannochia spiciforme cilindrica. *Pers. Syn.* I p. 31.

Röhl. germ. II p. 91. *Schult. aust.* I p. 83.

Schreb. Gram. p. 49. t. 5. *Savi Bot. Etrusc.* p. 2.

Gramen avenaceum odoratum spica flavescente.

Zannich. Ven. p. 124.

Gramen Anthoxanthon spicatum *Bauh. Hist.* I
p. 466.

*Gramen Alopecurum, spica glumosa lutea. Villis
crispis* *Barr. rar. ic. tab.* 124. *fig.* I.

*Nasce comunemente in Campalto nei Prati erbosi;
fiorisce nei Mesi d' Aprile e Maggio, ed è perenne.*

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

VALERIANA. (Baldrian.) Valeriana:

Cal. 0, ovvero un margine piccolissimo. *Cor.* mono-
petala 5. fida, alla base più o meno gobba,
superiore. *Seme*, coronato da un pappo piumoso.

V. dioica. (Klecner. B.) *V. dioica.*

*Triandra, dioica, foglie radicali ovate interissime,
le caulinari pennate.* *Röhl. germ. Schult. aust.* I
p. 96.

V. minor pratensis vel aquatica *Bauh. Hist.* III
p. 211.

Nasce in Campalto nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

FEDIA. (Fedie) Valerianella.

Cal. dentato. *Cor.* 5. fida alla base gobba. *Noce*
di due o tre cavità, delle quali una senza seme.

F. ololitoria. (Küchengarten F.) V. olitoria.

Frutto tridentato, fusto quasi glabro. *Röhl. germ.*

II p. 93. *Schult. aust.* I p. 100. *Valeriana olitoria Pers. Syn.* I p. 39.

Valerianella arvensis, praecox humilis semine compresso. Zann. Ven. p. 270.

Locusta herba. Bauh. Hist. III. p. 323. *cum icone.*

Nasce comunemente negli Orti, e ai Treporti; fiorisce il mese di Aprile, ed è annuale.

GLADIOLUS. (Siegwurz) Gladiolo.

Cor. 6. partita ineguale, lobi superiori conniventi.

Stami ascendenti. *Spata* 2. 3. valve, con valve lanceolate. *Stimm.* 3. *Semi* alcune volte alati.

G. communis. (Gemeine) G. comune.

Foglie spadiformi nervose, fiori laterali, spate più

lunghe dei tubi, fusto semplice. *Pers. Syn.* I

p. 43. *Röhl. germ.* II p. 94. *Schult. aust.* I p.

101.

G. sive Xiphion. Zann. Ven. p. 113. *tab.* 53. *Bauh.*

Hist. II p. 701. *cum icone.*

Gladiolo . *Matth.* p. 1042. cum icone:

Nasce ai Treporti , nei Prati umidi ; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno , ed è perenne .

IRIS . (Schwertel) Iride .

Cor. 6. partita , con lacinie alternativamente richinate . *Stimm.* petaliformi .

I. *Pseud' Acorus.* (Wasser S.) I. aquatica .

Cor. senza barba , foglie spadiformi , petali interni minori dello stinma . *Pers. Syn.* I p. 52. *Röhl. germ.* II p. 95. *Schult. aust.* I p. 105.

I. palustris lutea . *Zann. Ven. ic. tab.* 96.

I. palustris lutea , sive *Acorus adulterinus* . I *Bauh. Hist.* II p. 732. cum icone .

Acoro falso . *Matth.* p. 24. cum icone .

Nasce comunemente intorno Malghera e Campalto nei Fossi ; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio , ed è perenne .

SCHOENUS . (Knopfgras) Marisco .

Squame fascicolate ammucchiate , le esterne sterili nitide . Cor. 0. *Seme* 1. subrotondo nudo , ovvero setoloso .

1. *S. Mariscus.* (Gemeines K.) M. comune .

Culmo terete folioso , foglie nel margine e nel dorso aculeate . Pers. Syn. *Cladium germanicum.* *Röhl. aust.* II p. 91. *Schult. aust.* I p. 82.

Pseudocyperus palustris , foliis , et carina serratis . Zann. Ven. p. 219.

Cyperus longus inodorus sylvestris Lobelio. *Bauh. Hist.* II p. 503. cum icone.

Nasce comunemente in Malghera e Campalto nei Fossi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

2. *S. mucronatus*. (Spitziges K.) M. mucronato.

Culmo terete nudo, spighette ovate fascicolate, invoglio quasi di sei foglie patente, foglie scanalate. *Pers. Syn.* I p. 58. *Röhl. germ.* II p. 96.

Melanoschoenus maritimus humilis, *Cyperus effigie*. *Zann. Ven. ic. tab.* 16.

Gramen marium cyperoides. *Bauh. Hist.* II p. 498. cum icone.

Juncus maritimus panicula subrotunda glumosa. *Barell. ic. tab.* 203. *fig.* 1.

Nasce nei Treporti, Cavallino e Malamocco nei luoghi arenosi appresso il mare; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

3. *S. nigricans*. (Schwärzliches K.) M. nero.

Culmo terete nudo, capolino ovato, invogli di due foglie ovate, delle quali una lesiniforme bislunga. *Pers. Syn.* I p. 58. *Röhl. germ.* II p. 96. *Schult. aust.* I p. 109.

Melanoschoenus palustris, angustifolius, Junci facie, lithospermi semine *Zannich. Ven. ic. tab.* 41.

Nasce abbondevolmente nel Lido e Treporti nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

CYPERUS. (Cyperngras) Cipro:

Glume paleacee distiche, imbricate *Cor.* o. *Semi* 1. nudo. *Spighette* compresse.

1. *C. flavescens*. (Gelbliches C.) C. giallo:

Culmo triquetro nudo, ombrella quasi composta, spighette lanceolate, glume ottuse. *Pers. Syn.* I p. 62. *Röhl. germ.* II p. 96. *Schult. aust.* I p. III

Gramen pulchrum parvum, panicula lata compressa. *Bauh. Hist.* II p. 470. icone.

Nasce nei Treporti *nei luoghi erbosi e umidi; fiorisce il mese di* Settembre, *ed è annuale.*

2. *C. virescens*: (Grünliches C.) C. verdastro.

Culmo triquetro, ombrella composta di tre foglie, spighette lineari conferte, glume acute patenti. *Pers. Syn.* I p. 62. *Röhl. germ.* II p. 97.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di* Luglio e Agosto, *ed è annuale.*

3. *C. longus*. (Langes C.) C. lungo.

Culmo triquetro folioso, ombrella foliosa arcicomposta, peduncoli nudi, spighe alterne lineari. *Pers. Syn.* I p. 64. *Röhl. germ.* p. 97. *Schult. aust.* I p. 112.

C. panicula sparsa speciosa. *Bauh. Hist.* II p. 493. cum icone.

Cipro *Matth.* p. 28. cum icone:

Nasce comunemente intorno Malghera e Campalto *nei luoghi acquidosi e fossi; fiorisce nei mesi di* Giugno e Luglio, *ed è perenne;*

4. *C. monti*.) Montisches C.) C. di Monti.

Culmo triquetro, ombrella ricomposta panicolata, Spighette ovate, glume distanti, involglio di sei foglie, radice serpeggiante. *Pers. Syn.* I p. 64. *Röhl. germ.* p. 97. *Schult. aust.* p. 113.

C. scrotinus odoratus, radice longa, paniculis et locustis latis, ferrugineis compositis. *Zann. Ven.* p. 82.

Nasce intorno Malghera nei Fossi; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è perenne.

SCIRPUS. (Biuse) Scirpo.

Glume paleacee, imbricate da tutte le parti. *Cor.* o. *Seme* 1.

1. *S. palustris*. (Sumpf. B.) S. paludoso.

Radice serpeggiante, culmo quasi terete nudo, spiga ovato bislunga quasi terete, glume acute, due stimmi. *Pers. Syn.* I p. 63. *Röhl. germ.* II p. 98. *Schult. aust.* p. 114.

Juncus capitulis longis sive clavatus. *Bauh. Hist.* II p. 523. cum icone.

Nasce comunemente intorno Malghera nei Fossi e Prati umidi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

2. *S. acicularis* (Nadel förmige B.) S. acicolare.

Culmo quadrangolare setiforme, spiga terminale ovata bivalve, seminudi. *Pers. Syn.* *Röhl. germ.* II p. 98. *Schult. aust.* I p. 115.

Juncus humilis. *Bauh. Hist.* II p. 522.

Nasce intorno Malghera nei luoghi inondati; fiorisce la State, ed è perenne.

3. *S. lacustris.* (See B.) S. dei laghi.

Culmo terete prolungato nudo, spighe ovate sessili e peduncolate, terminali. *L. Pers. Syn.* I p. 67. *Röhl. germ.* II p. 99. *Schult. aust.* I p. 116.

S. palustris altissimus. *Zann. Ven.* p. 239.

Juncus maximus. *Holloschoenos.* *Bauh. Hist.* II p. 522. cum icone.

Nasce abbondevolmente in Campalto e Malghera; fiorisce i mesi di Giugno e Luglio; ed è perenne.

4. *S. holloschoenus:* (Knopfgrasartige B.) S. Marischino.

Culmo terete prolungato nudo, capolini glomerati sessili ovvero peduncolati, involglio di due foglie. *Pers. Syn.* I p. 67. *Röhl. germ.* II p. 99. *Schult. aust.* I p. 116.

Scirpoides maritimum, capitulis sparsis glomeratis. *Zann. Ven.* p. 238.

Nasce comunemente in Campalto nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è perenne.

5. *S. romanus.* (Romanische B.) S. romano.

Culmo nudo, capolino laterale sessile conglobato, brattea richinata. *L. Pers. Syn.* I p. 67. *S. Holloschoenus* β *Röhl. germ. Schult. aust.* I p. 116.

Scirpoides acutum maritimum capitulo glomerato. *Zann. Ven.* p. 238. *tab. 45. fig. 2.*

Juncus minor globoso singulari capitulo, radice tomentosa. *Barrell. ic. tab. 255. f. 3.*

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è perenne.

6. *S. mucronatus*. (*Zugespitzte B.*) *S. mucronato*. Culmo triangolare acuminato, spighe laterali ovate sessili glomerate, culmo nella cima orizzontale. *Pers. Syn. I p. 68. Röhl. germ. II p. 100. Schult. aust. I p. 118.*

Scirpo cyperus maritimus cc. cc. *Zann. Ven. p. 237. Nasce in Campalto nei fossi e luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è perenne.*

7. *S. maritimus*. (*See B.*) *S. maritimo*.

Culmo triquetro, pannochia conglobata foliacea, squame delle spighette trifide, delle quali la lacinia di mezzo lesiniforme, invoglio di molte foglie. *Pers. Syn. I p. 68. Röhl. germ. II p. 100. Schult. aust. I p. 119.*

Scirpo cyperus palustris, radice repente. *Zann. Ven. ic. tab. 50.*

Gramen cyperoides vulgatus aquaticum. *Bauh. Hist. II p. 495. cum icone.*

Nasce comunemente nel Lido e Malghera nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

LIMNETIS. (*Meerstrandgras*) *Limnetide*.

Spiga lateriflora. Cal. 2. valve delle quali una mi-

nore. *Cor.* di due valve, mutica compressa carenata. *Stil.* bislungo. *Nettar.* o.

L. pungens. (*Stechender M.*) *L.* pungente.

Foglie convolute pungenti, spighe poche appoggiate, pubescenti, carina del calice inerme. *Pers. Syn.* I p. 72.

Dactylis cynosuroides L.

Gramen spicatum secalinum maritimum. *Zann. Ven.* ic. tab. 36.

Nasce nei Treporti comunemente nelle Barene; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è perenne.

DYGYNIA

AGROSTIS (*Windhalm*) Agrostide.

Cal. di due valve, con un solo fiore, valve acute.

Cor. di due valve. *Stimm.* piumoso.

1. *A. interrupta.* (*Unterbrochener W.*) *A.* interrotto.

Gluma esteriore aristata, pannochia attenuata, approssimata interrotta. *Pers. Syn.* I p. 74. *Röhl. germ.* II p. 108. *Schult. aust.* p. 177.

Nasce in Campalto nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.

2. *A. sylvatica.* (*Wald. W.*) *A.* selvatica.

Mutica; pannochia fruttifera approssimata, culmo dritto, radice serpeggiante. *Schult. aust.* I p. 182.

Nasce intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

3. *A. alba.* (Weisser W.) *A. bianca.*

Pannochia allargata, calici mutici eguali, culmo serpeggiante. *L. Pers. Syn.* I p. 76. *Röhl. germ.* II p. 51. *Schult. aust.* I p. 181.

Nasce comunemente nei Prati umidi intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è perenne.

MELICA. (Perlgras) *Melica.*

Cal. di due valve con due fiori, membranaceo, con un rudimento di un terzo fiore. *Cor.* di due valve, mutica. *Seme* libero, coperto dalla corolla.

M. caerulea. (Blaues P.) *M. celeste.*

Pannochia approssimata, fiori conico-cilindrici. *L. Röhl. germ.* II p. 114. *Schult. aust.* p. 204. *Aira caerulea. Pers. Syn.*

Gramen pratense serotinum panicula longa purpurascens. *Zann. Ven.* p. 130.

Gramen harundinaceum enode minus. *Bauh. Hist.* II p. 481., absque icone.

Nasce ai Treporti nei Prati umidi; fiorisce l'Autunno, ed è perenne.

CRYPISIS. (Dornengras) *Crisside.*

Cal. di due valve. *Cor.* di due valve, maggiore del calice. *Seme* libero coperto dalla corolla.

C. schoenoides (Knopfgrasartiges D.) *C. maris-
schino*.

Culmo ramoso compresso, panocchia quasi spiciforme cinta alla base da una vagina, fiori con tre stami. *Röhl. germ. II p. 105. Schult. aust. I p. 170.*

Nasce benchè di rado, nei luoghi umidi a S. Niccolò di Lido; fiorisce i mesi di Luglio e Agosto, ed è annuale.

PHALARIS. (Glanzgras) Falaride.

Cal. di due valve, con un solo fiore. *Valve* subovate membranaceo-carenate nel dorso, ovvero lanceolate eguali nervose. *Cor.* di due valve pelosa alla base.

P. arenaria. (Sand G.) *F. arenaria.*

Spiga obovata, glume calicine interissime ciliate, guaina ventricosa, culmo alla base ramoso. *Pers. Syn. I p. 79 Phleum arenarium. Röhl. germ. II p. 113. Schult. aust. I p. 174.*

Gramen typhinum, maritimum minus Zann. Ven. p. 122. t. 168.

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.

PHLEUM (Lieschgras) Fleo.

Cal. di due valve, valve colla carena sporgente nella cima. *Cor.* di due valve, minore del calice
Fiorescenza in spica.

1. *P. Phalaris*. (Glanzgrasartiges L.) F. falaroide:
Spiga composta cilindrica, glume ciliate carenate:
Pers. Syn I p. 79. *P. Boehmeri*. *Röhl. germ.*
p. 112. *Schult. aust.* p. 173.

Gramen typhinum junceum perenne. *Barrell. ic.*
tab. 21. fig. 2.

*Nasce nei luoghi arenosi, secchi, fra sassi; fiorisce
nei mesi di Giugno e Luglio, ed è annuale.*

2. *P. pratense*. (Wiescen L.) F. dei prati.
Spiga cilindrica ciliata prolungata, culmo dritto.
L. Perf. Syn. I p. 79. *Schreb. gram.* p. 102. *tab. 14.*
Gramen typhoides maximum, spica longissima.
Zann. Ven. p. 121. *tab. 144. fig. 1.*

Gramen cum cauda muris majoris longa, majus
Bauh. Hist. II p. 472. cum icone.

*Nasce comunemente in Campalto e Malghera; fio-
risce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.*

ALOPECURUS. (Fuchs schwanz gras) Alopecuro.
Cal. di due valve con un solo fiore. *Cor.* di una
sola valve, alla base restata, ovvero mutica. *Fio-
rescenza* in spiga.

A agrestis. (Aker F.) A. dei campi.

Culmo dritto, spiga cilindrica purpurecente, glume
lisce. *Pers. Syn.* I p. 80. *Schreb. Gram.* p. 140.
tab. 19. fig. 2. *Röhl. germ.* II p. 104. *Schult.*
aust. I p. 166.

Gramen typhoides, spica angustiore, longiore. *Zann.*
Ven. ic. tab. 66. fig. 3.

- Gramen cum cauda muris purpurecente. *Bauh. Hist.*
II. p. 473. cum icone.
- Gramen typhinum plantagis spica, aristis geniculatis.
Barr. ic. t. 699. fig. 2.
- Nasce comunemente nei terreni di S. Marta; fiorisce nei mesi di Marzo e Aprile, ed è annuale.*
- POLYPOGON. (Bürstengras) Polipogine.
- Cal.* di due valve, restato, con un solo fiore. *Cor.*
di due valve colla valvola esteriore restata.
- P. monspeliense.* (Französisches B.) P. francese.
- Pannochia unita quasi spiciforme, calici quasi pubescenti, ciliati nel margine. *Pers. Syn. I p. 80.*
Röhl. germ. II p. 113.
- Alopecurus monspeliensis.* *L. Sp.*
- Phleum crinitum.* *Schreb. gram. p. 151. tab. 20.*
f. 3.
- Alopecurus altera maxima anglica paludosa.* *Bauh. Hist. II p. 474.*
- Gramen alopecurum majus, spica virescente, divulsa, pilis longioribus. *Barr. ic. tab. 115. fig. 2.*
- ♁. *P. paniceum* minore, con glume pelose. *Pers. l. c.*
- Alopecurus paniceus.* *L. Sp. pl.*
- Gramen alopecurum minus, spica virescentes, divulsa. *Barr. ic. tab. 115. fig. 1.*
- Nasce comunemente intorno Malamocco e nel Lido; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.*

PANICUM. (Fennich) Panico .

Cor. di tre valve con un solo fiore : valva terza dorsale piccolissima . *Cor.* di due valve . *Fiorescenza* varia .

1. *P. verticillatum*. (Querlblütiger F.) *P. verticillato*.

Pannocchia quasi spiciforme cilindrica verticillata , invoglietti ispidi all' indietro , valve dei fiori ermafroditi glabri . *Röhl. germ. Schult. aust. I p. 209.*

P. vulgare spica simplici , et aspera . *Zannich. Ven. p. 202.*

Gramen geniculatum . *Bauh. Hist. II p. 469.*

Nasce comunemente intorno Malghera e nei Orti ; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto , ed è annuale .

2. *P. glaucum*. (Graugrüner F.) *P. glauco*.

Grappolo spiciforme cilindrico , invoglietti fascicolatopelosi , corolle ermafrodite trasversalmente ondiate . *Pers. Syn. I p. 81. Röhl. germ. II p. 117. Schult. aust. I p. 210. Schreb. gram. p. 21. tab. 25.*

P. vulgare spica simplici et molliori . *Zann. Ven. p. 202.*

P. sylvestre dictum , et dens canis I. Bauh. Hist. II p. 443.

Nasce negli Orti nei luoghi umidi fiorisce il mese di Luglio , ed è annuale .

3. *P. viride*. (Grüner F.) *P. verde*.

Pannochia quasi spiciforme cilindrica, invoglietti fascicolato-pelosi, corolla ermafrodita glabra. *Röhl. germ.* II p. 118. *Schult. aust.* I p. 210.

P. spica cylindrica, involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. *L. Pers. Syn.* I p. 81.

P. vulgare spica simplici, vestibus non adhaerente. *Zann. Ven.* p. 202.

Nasce comunemente negli Orti, e nei Prati intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è annuale.

4. *P. Crus Galli.* (Hühner F.) P. gallinaceo.

Pannochia unilaterale dritta, spighette restate approssimate, foglie lineari-lanceolate nude. *Röhl. germ.* II p. 118. *Schult. aust.* I p. 211.

P. spicis alternis conjugatisque secundis, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, Rachi quinquangolari. *Pers. Syn.* I p. 81.

P. vulgare, spica multiplici asperiuscula. *Zann. Ven.* p. 203.

Dens caninus secundus, s. Panicum sylvestre, panicula divulsa. *Bauh. Hist.* III p. 443. cum icone.

Panico salvatico. *Matth.* p. 431. cum icone.

Nasce comunemente nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è annuale.

5. *P. miliaceum.* (Hirse F.) P. migliaccio.

Pannochia pieghevole nutante, spighette mutiche, foglie lanceolate pelose. *Röhl. germ.* II p. 118. *Schult. aust.* p. 212.

P. (*Milium*). Panicula laxa flaccida, fol. vagiatis

hirtis , glumis mucronatis nervosis . *Pers. Syn. I*
p. 83.

Milium. *Bauh. Hist. II p. 446.* cum icone .

Miglio. *Matth. p. 429.* cum icone .

Nasce nei luoghi coltivati, nei Orti , e nei Rovinazzi a S. Marta ; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio , ed è annuale .

DIGITARIA. (Fingergras) Ditaria .

Cal. di due o tre valve, concavo, colla valva esterna minutissima, e l'interna lunga al pari della corolla. *Cor.* di due valve, bislungo-ovata terete mutica. *Stil.* lunghissimi. *Fiori* in spighe ditate lineari .

D. sanguinalis : (Blut. F.) *D. sanguinale.*

Culmo serpeggiante , fiori imbricati , vagine e foglie papilloso-pelose . *Pers. Syn. I p. 84.*

Panicum . (*sanguinale*) Spicis digitatis basi interiori nodosis , flosculis geminis muticis , vaginis foliorum punctatis . *L. Schreb. gram. p. 119. tab. 16.*

Syntherisma vulgare . *Röhl. germ. II p. 105. Schult. aust. I p. 168.*

Gramen Dactylon folio latiore . *Zann. Ven. p. 117.*

Graminis Genus. Dens caninus tertius s. Gramen primum , vel Galli crus . *Bauh. Hist. II p. 444.* cum icone .

Sanguinella . *Matth. p. 1068.* cum icone .

Nasce comunemente nei luoghi coltivati, e Orti ; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto , ed è annuale .

CYNODON. (Hundszahn) Gramigna .

Cal. di due valve, patente, lanceolato. *Cor.* maggiore, di due valve: valva esterna grande. *Nettar.* troncato. Spighe ditate imbricate in una sola serie .

C. Dactylon. (Gemeiner H.) G. volgare. *Pers. Syn.* I p. 85.

Panicum. (Dactylon) Spicis digitatis patentibus : basi interiore villosis , floribus solitariis sarmentis repentibus . *L. Savi. Mat. med. tab.* 36.

Digitaria stolonifera. *Röhl. germ.* II p. 105. *Schult. aust.* I p. 169.

Gramen Dactylon folio arundinaceo, majus, et minus. *Zann. Ven. ic. tab.* 192. *mala.*

Gramen repens cum panicula graminis mannae. *Bauh. Hist.* II p. 459.

Nasce comunemente intorno S. Niccolò di Lido; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

LAPPAGO. (Stachelgras) Lappagine .

Cal. quasi di tre valve, muricato. *Cor.* di due valve, resupinata.

L. racemosa. (Traubenblüthiges S.) L. con fiori a grappoli. *Pers. Syn.* I p. 85. *Röhl. germ.* I I p. 107. *Schult. aust.* I p. 191.

Cenchrus. (*racemosus*) Panicula spicata glumis muricatis, setis ciliaribus. *L. Schreb. Gram.* p. 45. *tab.* 4.

Gramen parvum echinatum. *Bauh. Hist.* II p. 467.
cum icone.

Gramen caninum maritimum spicatum, echinatis glumis. *Barr. ic. tab.* 718.

Nasce a Brondolo nei luoghi arenosi e secchi; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è annuale.

CYNOSURUS. (Kammgras) Cinosuro.

Cal. 2. valve multifloro. *Ricett.* proprio unilaterale fogliaceo.

C. echinatus. (Stachliges K.) *C. echinato.*

Pannochia unita ovata, spighette restate brattee ineguali, foglie lanceolate. *Röhl. german.* II p. 140.

C. Bracteis pinuato-paleaceis aristatis. *Persoon. Syn.* I p. 86.

Gramen alopecurum spica aspera. *Barell. ic. t.* 123.
f. 2.

Nasce intorno i terreni di S. Marta, nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

DACTYLIS. (Knaulgras) Dattilo.

Cal. di due valve compresso, delle quali una valvola maggiore carenata. Spighette ovate o capitate.

D. glomerata. (gemeines K.) *D. comune.*

Pannochia unilaterale glomerata. *Pers. Syn.* I p. 88.

Schreb. gram. t. 8. *f.* 2. *Röhl. germ.* II p. 134.

Schutt. aust. I p. 232.

Gramen asperum. *Zann. Fen. p.* 132. *tab.* 194.

fig. 1. mala. Bauh. Hist. VI p. 467. cum icone.
 Gramen spicatum, folio aspero, spica grumosa.
Barr. ic. tab. 26. medic.

Nasce nei Rovinazzi, specialmente intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

POA. (Rispengras) Fienarola (Savi).

Cal. di due valve, multifloro. Spighette ovate mutiche. Valvole scariose nel margine.

1. *P. aquatica.* (Wasser. R.) F. aquatica.

Pannochia diffusa ramosissima, spighette lineari con 5-9. fiori, radice serpeggiante. *Röhl. germ. p. 119. Schult. aust. I p. 217.*

P. altissima, panicula diffusa, spiculis sexfloribus linearibus. *L. Pers. Syn. I p. 88.*

Gramen majus aquaticum. *Bauh. Hist. VI p. 481.*

Nasce nei fossi intorno Mestre; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

2. *P. maritima.* (Meer. R.) F. maritima.

Pannochia patente, rami fruttiferi approssimati, spighette lineari con cinque fiori, fioretti un poco acuti, con cinque nervi, valve calicine con tre nervi, radice serpeggiante. *Röhl. germ. II p. 119. Schult. aust. I. p. 217.*

Nasce nei luoghi inondati dall'acqua salza specialmente intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

3. *P. bulbosa*. (Zwiebeltragendes R.) F. bulbosa.
 Pannochia diffusa, spighette ovate, quasi con cinque fiori, fiori alla base villosi, culmo quasi nudo, alla base tuberoso. *Pers. Syn.* I p. 89. *Röhl. germ.* II p. 121. *Schult. aust.* I p. 224.
- β. *P. crispa*. Pannochia crispa. L. Sp.
 Gramen vernum radice ascalonitidis. *Zann. Ven.* p. 131.
 Gramen cum panicula molli rubente. *Bauh. Hist.* II p. 464. cum icone.
 Gramen arvense panicula crispa. *Barr. ic. tab.* 703.
Nasce nel Cavallino nei Prati erbosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.
4. *P. pratensis*. (Wiesen R.) F. dei prati.
 Pannochia diffusa, spighette bislungo-ovate con cinque fiori, fiori alla base villosi, culmo e vagine glabre, Ligula breve, radice serpeggiante. *Röhl. germ.* II p. 121. *Schult. aust.* I p. 226.
- P. Panicula diffusa, spiculis 5. floris glabris, culmo erecto tereti glabro, ligula brevi truncata, foliis planis. *Pers. Syn.* I p. 89.
 Gramen pratense paniculatum majus latiore folio Poa Theophrasti. *Zann. Ven.* p. 130.
Nasce comunemente nei Prati; fiorisce il mese di Maggio, ed è perenne.
5. *P. annua*. (Iähriges R.) F. annuale:
 Pannochia quasi unilaterale, diffusa, spighette bislungo-ovate con 5-7. fiori, culmo compresso obliquo, radice fibrosa. *Röhl. germ.* II p. 123. *Schult. aust.* I p. 228.

P. parvula, foliis margine subundulatis, panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *Pers. Syn.* I p. 90.

Gramen pratense paniculatum minus album: *Zann. Ven.* p. 131.

G. paniculatum minus album: *Bauh. Hist.* II p. 465: cum icone.

Nasce comunemente negli Orti; fiorisce nei mesi di Marzo e Aprile, ed è annuale.

6. *P. pilosa*: (Haariges R.) F. pelosa.

Pannochia approssimata, dopo la fiorecenza allargata, rami inferiori alla base e alle ramificazioni pelosi, spighe lineari con 7-9. fiori, fioretti acuti, radice fibrosa. *Schult. aust.* I p. 219.

P. Panicula patente stricta: ramificationibus primariis pilosis. *L. Pers. Syn.* I p. 90.

Nasce intorno Malghera, nei Prati umidi; fiorisce nei mesi d'Agosto e Settembre, ed è annuale.

7. *P. Eragrostis*. (Schönstes R.) F. bellissima.

Pannochia patente, rami inferiori alla base e alle ramificazioni pelosi, spighe lanceolate con 9-15. fiori, fiori ottusi, radice fibrosa. *Röhl. germ.* II p. 120. *Schult. aust.* I p. 220.

P. Panicula patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis decemfloris, glumis trinerviis. *L. Pers. Syn.* I p. 90. *Schreb. gram.* 81. tab. 38.

Gramen phalaroides sparsa brizae panicula, minus: *Barr. ic. t. 44. f. 2.*

Nasce negli Orti nei luoghi arenosi erbosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.

8. *P. megastachia.* (Grossähriges R.) F. a spighe grandi.

Pannochia patente, rami inferiori alla base e alle ramificazioni pelosi, spighe lanceolate con 15-20. fiori, fiori ottusi, radice fibrosa. *Röhl. germ. II p. 120. Schult. aust. I p. 220.*

Briza. (*Eragrostis*) Spiculis lanceolatis, flosculis viginti. *L. Schreb. Gram. II p. 83. tab. 39.*

Gramen amoris dictum. *Bauh. Hist. II. p. 470. sine icone.*

Gramen Eranthemum, seu Eragrostis, phalaroides paniculatum, multiplici tenui brizae spica. *Barr. ic. t. 43.*

Nasce e fiorisce come la precedente.

9. *P. rigida.* (Steifes R.) *P. rigida.*

Pannochia distico-unilaterale conferta rigida, spighe lineari acute con 5-11. fiori, fioretti con cinque nervi, radice fibrosa. *Röhl. germ. Schult. aust. I p. 218. cum descript. bona.*

P. panicula lanceolata disticho-secunda coarctata glabra: rachi marginata spiculis 7. floris, flosculis tertibus enerviis. *Pers. Syn. I p. 92.*

Gramen arvense, filicina duriore panicula gracilius. *Zann. Ven. p. 133. tab. 126. Barr. ic. t. 49.*

Gramen loliaceum minus multiplici spica. *Bauh. Hist. II p. 544.*

Nasce nei muri antichi in S. Niccolò di Lido; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.

BRIZA. (Zittergras) Tremolina (Savi).

Cal. di due valve, con molti fiori. *Spighetta* distica. *Valvole* esteriori cordate ottuse ventricose, le interne molto minori.

B. media. (Gemeines Z.) T. volgare.

Pannochia dritta, spighette quasi con sette fiori, ovate, calice minore dei fiori. *Röhl. germ. Schult. aust.* I p. 232.

B. spiculis ovatis, calice flosculis (7.) brevior: *L. Pers. Syn.* I p. 92.

Gramen tremulum majus. *Zann. Ven.* p. 129. t. 220.

Gramen tremulum. *Bauh. Hist.* II p. 469. cum icone.

Gramen tremulum, seu phalaroides minus, lata sparsa panicula. *Barr. ic.* t. 16. medioc.

Nasce intorno Malghera nei luoghi montuosi ed erbosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

Festuca. (Schwingel) Paleo. (Savi).

Cal. di due valve, con molti fiori. *Spighetta* bislunga un poco terete mutica ovvero con una resta terminale.

1. *F. Myurus.* (Mausechwanzartiger S.) P. miuro.

Pannochia spicata lunga nutante, calici minutissimi

mutici, fiori scabri, reste lunghe, foglie setacee.
Pers. Syn. I p. 93. *Schult. aust.* I p. 240.

F. panicula spicata, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris, risticis longis. *L. Sp. pl.*

Gramen festuceum myurum, minus spica heteromalla. *Barr. ic. t.* 99. *f.* 1.

Nasce nei luoghi sterili a S. Marta; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.

2. *F. uniglumis.* (Einspelziger S.) *P. uniglume.*

Pannochia unilaterale dritta quasi semplice, fioretti lesiniformi compressi restati, una valvola del calice brevissima. *Savi bot. Etrusc.* p. 73.

Gramen bromoides spicatum maritimum, glabrum ec. ec. *Zann. Ven.* p. 128.

Nasce nel Lido e a Chioggia nei luoghi arenosi appresso il mare; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.

3. *F. elatior.* (Hoher S.) *P. alto.*

Pannochia patente ramosissima, spighette ovato-lanceolate, quasi restate, con 4-5. fiori, foglie lineari-lanceolate, radice serpeggiante. *Röhl. germ.* I p. 126. *Schult. aust.* II p. 244.

F. panicula secunda subrecta, spiculis obtusiusculis: exterioribus teretibus. *Pers. Syn.* I p. 94. *Schreb. Gram.* p. 34. *t.* 2.

Nasce intorno Malghera nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

BROMUS. (Trespe) Bromo.

Cal. di due valve con molti fiori. *Spighetta* bis-

lunga distica. *Gluma* esterna restata sotto l'apice, la *gluma* interna pettinato-ciliata.

1. *B. sterilis*. (Unfruchtbare T.) *B. sterile*.

Pannochia patente quasi semplice pendente, spighettoe bislunghe-distiche, glume subulato-restate. *Pers. Syn.* I p. 96. *Röhl. germ.* II p. 130. *Schult. aust.* I p. 262.

B. panicula patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato aristatis. *L. Sp.*

Graeme avenaceum, panicula sparsa, locustis majoribus et aristatis. *Zann. Ven.* p. 128.

Nasce comunemente nei Prati e nei Muri antichi, fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.

2. *B. mollis*. (Weichhaarige T.) *B. molle*.

Pannochia dritta approssimata, peduncoli ramosi, spighettoe ovate pubescenti, glume ellittiche, foglie e vagine villose. *Pers. Syn.* I p. 95. *Röhl. germ.* p. 128. *Schult. aust.* I p. 255. *Schreb. gram.* p. 60. t. 6. f. 1.

Festuca graminea, hirsutis brizae glumis compactior. *Barr. rar. ic. t.* 83: f. 1.

Nasce nei Prati, e nei luoghi arenosi e secchi, fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è biennale.

3. *B. squarrosus*. (Sparrige T.) *B. allargato*.

Pannochia nutante, spighettoe ovate, reste nella spiga matura distese, peduncoli semplici. *Pers. Syn.*

I p. 95. *Röhl. germ.* II p. 128. *Schult. aust.* I p. 256.

Gramen phalaroides, acerosa, nutante spica. *Zann. Ven. ic. t.* 67. mala. *Barr. ic. t.* 24. f. 1.

Gramini murali Dalechampi simili, si non idem. *Bauh. Hist.* II p. 438. cum icone mala.

Nasce comunemente nei luoghi sterili, specialmente nei terreni di S. Marta; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.

4. *B. madritensis.* (Madriter T.) *B. madritense.*

Pubescente, pannochia patente quasi unilaterale, spighette lineari scabre all'indietro, reste lunghissime scabre. *Pers. Syn.* I p. 96. *Röhl. germ.* II p. 130. *Schult. aust.* I p. 262.

B. panicula, rariore patulo-erecta, spiculis linearibus, intermediis geminis, pedicellis superne incrassatis. *L. Sp. pl.*

B. sterilis, erecta panicula, major. *Barr. ic. t.* 76. f. 1. *Nasce nei luoghi sterili, e Muri antichi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno ed è annuale.*

5. *B. pinnatus.* (Gefiederte T.) *B. pennato.*

Glabra, spiga semplice disticha, spighette alterne, quasi sessili, tereti, lunghe, quasi restate. *Pers. Syn.* I p. 96.

Festuca pinnata. *Röhl. germ.* *Schult. aust.* I p. 96.

Gramen spica brizae majus. *Bauh. Hist.* II p. 477. sine icone.

Gramen sparteum spicata brizae panicula et corniculata. *Barr. ic. t.* 25.

Gramen arundinaceum, ramòsum, plumosum, album. *Zann. Ven. ic. t. 52. f. 2. mala.*

Nasce intorno i Treporti nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è perenne.

ROTTBOELLIA. (Rottboellie) Rottboellie :

Rachide articolata un poco terete, filiforme in più specie. *Cal.* ovato lanceolato piano di una ovvero di due valve. *Cor.* minore di due valve, *fiorretti* alterni sopra il rachide flessuoso.

R. incurvata. (Eingebogene R.) *R. incurvata.*

Spiga terete lesiniforme incurvata, gluma bipartita lesiniforme appoggiata. *Pers. Syn. tom. I p. 106. Röhl. germ.*

R. Spica tereti subulata subarcuata, gluma calycina subulata adpressa. *Roth. neue Beytr. zur Bot. tom. I. p. 120.*

Nasce nel Lido e nei Treporti, nei luoghi arenosi umidi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

HORDEUM. (Gerste) Orzo.

Cal. di sei foglie in guisa d'invoglio. *Fiori* terni, quello di mezzo sessile, i laterali stipitati, spesso sterili. *Cor.* stipitata di due valve acuta, colla valva esterna restata. (Fiorescenza in spiga).

1. *H. murinum.* (Mäuse G.) O. sorcino.

Fiori laterali maschi restati, invogli di mezzo cilia-

ti, lanceolati. *Pers. Syn.* I p. 108. *Röhl. germ.* II p. 135.

Nasce comunemente nei muri e nei rovinazzi, fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è annuale.

2. *H. maritimum.* (Meer G.) O. marino.

Fiori laterali maschi, brevemente restati, glabri nel dorso, fogliola interna dei fiori laterali semiova-
ta. *Pers. Syn.* I p. 108. *Röhl. l. c.*

Nasce nei luoghi erbosi nei terreni di S. Marta; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è annuale.

SECALE. (Roggen) Segala.

Cal. opposto di due valve 2. 3. floro, solitario. *Glume* lineari lanceolate lisce, ovvero scanalate dalle due parti.

S. villosum. (Borstiger) S. villoso.

Le cilia delle glume villose. *Röhl. germ. Schult. aust.* I p. 197.

Nasce comunemente intorno Chioggia nei luoghi arenosi; fiorisce il mese di Maggio, ed è annuale.

TRITICUM. (Weitzen) Frumento.

Cal. di due valve, solitario, multifloro. *Spighetta* appoggiata all'asse per il lato largo.

17. *T. junceum.* (Binsen W.) F. junceo.

Calici troncati con cinque fiori, mutici, foglie invo-

luto-mucronato-pungenti. *Persoon Syn.* I p. 109.

Röhl. germ. II p. 138. *Schult. aust.* I. p. 254.

Nasce comunemente nel Lido; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

2. *T. repens.* (Kriechender W.) F. serpeggiante.

Calici lesiniformi con molti nervi, con cinque fiori, fioretti acuminati, foglie piane, radice serpeggiante nodosa. *Pers. Syn.* I p. 109. *Röhl. l. c.* p. 37. *Schreb. Gram. t.* 26.

Gramen loliaceum radice repente, sive gramen officinarum. *Zan. Ven.* p. 119. t. 197. fig. 1. mala.

Gramen repens officinarum, forte triticeae spicae aliquatenus simile. *Bauh. Hist.* II p. 457. sine icone.

* *glaucum* totum amoene glaucum, foliis planis, spiculis majoribus aristatis aut muticis. *Pers. l. c.*

Nasce comunemente negli Orti, nei Prati e nei luoghi sassosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

LOLIUM. (Lolch) Loglio.

Cal. di una sola foglia, solitario, spighette appoggiate all'asse per il loro lato stretto.

1. *L. perenne.* (Ausdauernder L.) L. perenne.

Spiga mutica, spighette compresse multiflore *Pers. Syn.* I p. 110. *Röhl. p.* 136. *Schult. aust. p.* 213.

Phoenix lolio similis. *Bauh. Hist.* II p. 436. sine icone.

Phoenix. *Dalech. Hist. p.* 416. cum icone.

Nasce comunemente nei Prati e negli Orti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

2. *L. temulentum*. (Betäubender L.) L. zucco (Savi). Spiga restata, spighette quasi con sei fiori eguali al calice. *Pers. Syn.* I p. 110. *Röhl. l. c. Schult. l. c.*

L. spica aristata spiculis compressis multifloris. *Schreb. Gram.* II p. 74. t. 36,

L. gramineum spicatum caput tentans. *Bauh. Hist.* II p. 477. cum icone mala.

Lolium. *Dalech. Hist.* p. 417. cum icone.

Nasce comunemente fra le biade; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è annuale.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

GLOBULARIA. (Kugelblume) Globolaria.

Cal. comune imbricato, proprio tubuloso inferiore.

Cor. il labro superiore bipartito, l'inferiore tripartito. *Ricett.* paleaceo.

G vulgaris. (Gemeine K.) G. volgare.

Fusto erbaceo, foglie radicali tridentate lecauline lanceolate. *Pers. Syn.* I p. 118. *Schult. aust.* I p. 283.

Globularia. *Zann. Ven. ic. t. 33. f. 1.*

Nasce intorno Malghera nei luoghi montuosi e erbosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

KOELERIA. (Koelerie) Coeleria.

Cal. di due valve, con molti fiori, compresso-careinato. *Cor.* di due valve brevemente restate, glume nervose. (Spiga composta da spiglette compresse, spesso pubescenti, quasi sessili).

K. cristata. (Kammförmige K.) *C. cristata.*

Spiga pieghevole, spiglette distese, con 3. 4. fiori quasi restati, rugolosi, carena quasi ciliata. *Pers. Syn.* I p. 97.

Aira cristata. *Röhl. germ. Schult. aust.* I p. 198.

Nasce in Campalto nei Prati sterili, fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

TRisetum. (Dreigranne) Trisetto.

Cal. con due o tre fiori, acuminato, carenato. *Cor.* con due reste terminali ed una dorsale dritta.

T. pratense. (Wiesen D.) *T. pratense.*

Pannochia quasi unita, spiglette nitide, guaine striate lisce, foglie di sopra setolose. *Pers. Syn.* I p. 97.

Avena flavescens. *L. Röhl. germ. Schult. aust. Schreb. gram. t. 9. bon.*

Nasce intorno Malghera nei Prati, fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

LAGURUS. (Hasenschwanz) Piumino.

Cal. di due valve con un solo fiore, con reste pelose.

Cor. di due valve, colla gluma esterna 2 restata nella cima e munita di una terza nel dorso.

L. ovatus. (eiförmiger H.) P. ovato.

Spiga ovata villosa *L. Pers. Syn.* I p. 98. *Schreb. gram.* p. 143. t. 19. f. 3.

Gramen alopecuroides spica longiore. *Zann. Ven.* p. 122. tab. 66. fig. 2.

Gramen alopecuros altera *Lobelii. Bauh. Hist.* II p. 475. absque icone.

Gramen alopecuroides, molle spica incana. *Barr. ic.* t. 116. bona.

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è annuale:

STIPA. (Pfriemengras) Stipa.

Cal. di due valve con un solo fiore. *Cor.* di due valve, minore del calice, resta terminale, attorcigliata alla base, lunghissima.

S. pennata. (Fedrigues P.) S. pennata.

Reste piumose. *Pers. Syn. Röhl. germ. Schul. aust.* I p. 191.

Gramen avenaceum, speciosissimis pennatis, aristis donatum. *Zannich. Ven.* p. 124. t. 48.

Gramen pennatum aliis spartum. *Bauh. Hist.* II p. 512. cum icone.

Gramen pinnatum. *Dalech. Hist.* p. 431. cum icone.

Gramen sparteum pennatum majus. *Barr. ic. t. 46.*
Nasce nei luoghi arenosi non lungi da Cortelazzo;
fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pe-
renne.

AVENA. (Hafer) Avena.

Cal. di due valve, con molti fiori, resta dorsale
 attorcigliata. (*Glume membranacee.*)

A. strigosa. (Rauch II.) *A. strigosa* :

Pannocchia bislunga unilaterale, fioretti geminati con
 due reste nella cima e una dorsale ginocchiata.
Pers. Syn. I p. 100. Röhl. germ. II p. 131. Schult.
aust. 1. p. 263.

Avena, panicula laxa, calicybus bifloris, flosculis
 laevibus, apice biaristatis, arista dorsali longissi-
 ma. *Schreb. Grām. II p. 123. tab. 46.*

Nasce intorno Brondolo nei luoghi montuosi ed or-
bosi; fiorisce il mese di Aprile, ed è annuale.

ARUNDO. (Rohr) Canna.

Cal. di due valve 1 multifloro, glabro. *Cor.* lanata
 alla base, mutica.

1. *A. donax.* (Zahmes R.) *C. domestica*,

Calici con cinque fiori, pannocchia diffusa, culmo
 fruticoso. *Pers. Syn. I p. 102. Röhl. germ. II p. 111.*

A. maxima et hortensis. *Bauh. Hist. II p. 486 cum*
icone.

Canna. *Matth. p. 164. cum icone.*

Nasce nei luoghi poco lontani dall'acqua, appres-

so i Fossi, intorno Malamocco; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre.

2. *A. Phragmites* (gemeines R.) C. comune.

Calici con cinque fiori, pannochia pieghevole. *Persoon Syn. I p. 103. Röhl. l. c. Schult. aust. I p. 190.*

Nasce comunemente nei Fiumi e Fossi, specialmente intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è perenne.

3. *A. arenaria*. (Sand R.) C. arenaria.

Calici con un solo fiore, più lunghi della corolla, pannochia spicata, fiori eretti mutici, foglie involute pungenti. *Pers. Syn l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

Gramen secalinum spicatum maritimum maximum, spica longiore. Zann. Ven. p. 120.

Spartium spicatum pungens oceanicum. Bauh. Hist. II p. 511.

Nasce comunemente in tutte le spiagge arenose, specialmente in quella del Lido; fiorisce nei mesi di Aprile e di Maggio, ed è perenne.

SACHARUM. (Zuckerrohr) Zuccherò.

Fiori tutti ermafroditi. Cal. di due valve, circondato da lanugine lunga. Cor. di una o due valve mutica, ovvero restata.

S. *Ravennae*. (Ravenna Z.) Z. di Ravenna.

Pannochia pieghevole, rachi lanata, fiori restati. Pers. Syn. p. 103. Röhl. germ. II p. 107,

Nasce nei luoghi coltivati e negli Orti; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è annuale.

RUBIA . (Röthe) Robbia .

Cor. monopetala campanulata 4-5-fida . *Bache* 2. monosperne .

R. tinctorum . (Färber R.) R. dei Tintori .

Foglie lanceolate , quasi sene , annue , fusto aculeato rampicante . *Pers. Syn.* I p. 129. *Röhl. germ.* II p. 145. *Schult. aust.* I p. 300.

R. sylvestris monspessulana major . *Bauh. Hist.* III p. 715. *sine icone* .

β *R. sylvestris* . Foglie inferiori sene , le superiori quaterne ovvero bine aspre dalle due parti .

R. tinctorum sativa . *Zann. Ven. ic. tab.* 120.

R. sativa . *Bauh. Hist.* III p. 714.

Nasce intorno Malinocco nei luoghi erbosi , e nei luoghi montuosi e arenosi nel Cavallino ; fiorisce nel mese di Giugno , ed è perenne .

PLANTAGO . (Wegerich) Piantagine .

Cal. 4-fida . *Cor.* 4 fida , lembo inchinato . *Stami* lunghissimi . *Cass.* di due cavità , coperchiata .

1. *P. maxima* . (Gröstes W.) P. massima .

Foglie ovate concavo cucollate con nove nervi glabre . Spiga cilindrica imbricata , scapo terete . *Pers. Syn.* sub *P. cucullata?* *Schult. aust.* p. 295?

P. maritima latifolia glabra , spica longiori purpurascente . *Zann. Ven. ic. t.* 75.

Nasce nei luoghi inondati dall'acqua salsa specialmente intorno Malghera e Campalto; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è perenne.

Specie distinta dalla P. cucullata? Pers. l. c.?

2. *P. major*. (Grosser W.) *P. grande*.

Foglie ovate glabre, scapo terete spiga con fiori imbricati. *Pers. Syn. p. 138. Röhl. germ. p. 143. Schult. aust. I p. 294.*

P. latifolia sinuata. Zann. Ven. ic. t. 137:

P. major folio glabro non laciniato. Bauh. Hist. III p. 502. cum icone.

Piantaggine maggiore. *Matth. p. 508.*

Nasce comunemente negli Orti; fiorisce nei mesi di Giugno sino Ottobre, ed è perenne.

3. *P. media*. (Mittlerer W.) *P. mezzana*.

Foglie ovato-lanceolate pubescenti, spiga cilindrica, scapo terete. *Pers. l. c. Röhl. germ. p. 143. Schult. aust. I p. 295.*

P. major hirsuta media. Bauh. Hist. III p. 504. cum icone.

Piantaggine mezzana. *Matth. p. 507. cum icone.*

Nasce intorno Malghera nei Prati erbosi; fiorisce nei mesi di Maggio sino Settembre, ed è perenne.

4. *P. altissima*. (Höchster W.) *P. altissima*.

Foglie lanceolate con cinque nervi dentate glabre, spiga bislunga cylindrica, scapo angolato scabro. *Pers. l. c. Schult. aust. I p. 296.*

Nasce nel luogo detto Aca bianca; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

4. *P. lanceolata.* (Lanzenblättriger W.) *P. lanceolata:* Foglie lanceolate, spiga subovata nuda, scapo angolato. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p. 144. Schult. l. c. Savi. Mat. Med. t. 39.*

P. angustifolia major. *Zann. Ven. p. 212. t. 111 et 191.*

P. lanceolata. *Bauh. Hist. III p. 505. cum icone.*

Piantaggine lunga. *Matth. p. 509. cum icone.*

β *P. polistachia.* Spica composita. *Pers. l. c.*

γ *P. spica apice foliosa.* *Schult. l. c.*

Nasce nei luoghi erbosi, nei Prati e negli Orti; fiorisce nei mesi di Maggio sino Ottobre, ed è perenne.

5. *P. maritima.* (Meerstrands W.) *P. marino.*

Foglie semicilindriche, interissime, alla base lanate, scapo terete. *Pers. Syn. I p. 139. Röhl. loc. cit. Schult. l. c. p. 197.*

P. maritima major tenuifolia. *Zann. Ven. ic. t. 60.*

Coronopus maritima nostras. *Bauh. Hist. III p. 511. cum icone.*

♂ con foglie dentate.

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi ed erbosi; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è perenne.

6. *P. coronopus.* (Krähenfussartiger W.) *P. coronopo.*

Foglie lineari dentate, scapo terete. *L. Pers. Syn. I p. 139. Röhl. l. c. Schult. aust. I p. 299.*

Coronopus hortensis. Zann. Ven. ic. t. 207.

Coronopus s. cornu cervinum vulgo, spica plantaginis. Bauh. Hist. III p. 509. cum icone.

Coronopo. Matth. p. 522. cum icone.

Nasce nei luoghi arenosi e umidi nel Lido e Malamocco; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

7. *P. Psyllium*. (Betäubender W.) *P. psillio*.

Fusto ramoso, foglie quasi dentate recurvate, capolini senza foglie. Pers. Syn. I p. 140. Röhl. germ. II p. 144.

Psyllium majus erectum. Zannichel Ven. p. 220: t. 77. Bauh. Hist. III p. 513.

Nasce nel Lido e Malamocco nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è annuale.

CORNUS. (Kornelbaum) Corgniolo.

Invoglio spesso di quattro foglie, petali quattro superiori. *Drupa* con nocciolo di due cavità.

C. sanguinea. (Rother K.) *C. sanguineo*.

Arborea, cime senza invoglio, rami dritti. L. Sp. pl. Gmel. Syst. Nat.

C. ramis rectis, foliis ovatis concoloribus, cymis depressis. Pers. Syn. I p. 143. Röhl. germ. II p. 150. Schult. aust. I p. 315.

C. foemina. Zann. Ven. p. 73.

C. foemina, putata, virga sanguinea. I. Bauh. Hist. I p. 214 sine icone.

Aphyllantes anguillarae, sive *globularia bellidi* simili. *Bauh Hist.* III p. 13. cum icone.

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è perenne.

DIPSACUS. (Karten) Dissaco.

Cal. comune di molte foglie, il proprio superiore.

Ricett. paleaceo.

D. sylvestris. (Wald K.) D. selvatico.

Foglie sessili seghettate, palee dritte, involglio più lungo del capolino. *Pers. Syn.* p. 119. *Röhl. germ.*

D. sylvestris aut *virga pastoris major.* *Zann. Ven. ic. t.* 163.

D. silvestris s. *labrum veneris.* *Bauh. Hist.* III p. 74. cum icone.

Dissaco. *Matth.* p. 698. cum icone.

Nasce in Campalto nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è biennale.

SCABIOSA. (Scabiose) Scabiosa.

Cal. comune, di molte foglie, il proprio doppio superiore. *Ricett.* paleaceo ovvero nudo.

1. *S. succisa.* (Sumpf S.) *S. succisa.*

Cor. quadrifide eguali, fusto semplice, rami approssimati, foglie lanceolato-ovate, le caulinari quasi dentate, fiori subglobosi. *Pers. Syn.* I p. 119. *Schult. aust.* I p. 287.

Succisa hirsuta. *Zann. Ven. ic. t.* 29.

Morsus diaboli. *Dalechamp. Hist. p. 1067. Matth. p. 658. cum icone.*

Nasce in Campalto nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è perenne.

2. *S. columbaria.* (Tauben S.) *S. colombaria.*

Corolette cinquefide raggianti, foglie radicali ovate e lirate, intaccate, le caulinari pennate lineari. *Pers. Syn. I p. 120. Röhl. germ. II p. 143. Schult. aust. I p. 292.*

S. minor vulgaris. Bauh. Hist. III p. 3. cum icone p. 4.

S. matthioli minor. Dalech. Hist. p. 1066. cum icone.

S. minore. Matth. p. 1021. cum icone.

Nasce nei Treporti appresso i Fossi nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

3. *S. stellata* γ (Sternförmige S.) *S. stellata.*

Corolette 5-fide raggianti, foglie intagliate. *Ricett. dei fiori subrotondo. L. Sp.*

S. stellata minima. Zann. Ven. ic. t. 11.

S. cum pulchro semine minor. Bauh. Hist. III p. 7. cum icone.

Nasce nei luoghi arenosi, nei Treporti e nel Lido; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è perenne.

SIERARDIA. (Serardie) *Serardia.*

Cor. monopetala infundibuliforme. Sem. 2, tridentati.

S. arvensis. (Acker) S. dei campi.

Foglie tutte verticillate, fiori terminali. *Pers. Syn.*

I p. 124. *Röhl. germ.* p. 149. *Schult. aust.* I p. 313.

Rubia parva flore caeruleos, se pargens. *Bauh. Hist.*
III p. 719. cum icone.

Asperula caerulea. *Dalech. Hist.* p. 870. cum icone.

Nasce nel Lido, nei Treporti e nel Cavallino; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è annuale.

ASPERULA. (Waldmeister) Asperola.

Cor. monopetala infundibuliforme. *Sem.* 2, globosi.

A. cynanchica. (Hügel W.) A. collina.

Foglie quaterne lineari, le superiori opposte, fusto

dritto, fiori quadrifidi. *Pers. Syn.* I p. 124. *Röhl.*

germ. II p. 149. *Schult. aust.* I p. 312.

Rubeola vulgaris quadrifolia, laevis, floribus purpurascensibus. *Zann. Ven. ic. t.* 81.

Rubia cynanchica. *Bauh. Hist.* III p. 723. cum icone.

Nasce nel Lido nei luoghi arenosi e secchi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

GALIUM: (Labkraut) Gaglio (Savi).

Cor. monopetala piana. *Sem.* 2, subrotondi.

Frutto glabro.

1. *G. palustre*. (Sumpf. L.) G. paludoso.

Foglie quaterne, ovate a rovescio, ineguali, fusti

giacenti. *Pers. Syn.* I p. 125. *Röhl. germ.* II

p. 146. *Schult. aust.* I p. 301.

Nasce intorno Malghera nei Paludi e Fossi; fiorisce nei mesi di Luglio e Agosto, ed è perenne.

2. *G. verum.* (Gelbes L.) G. giallo.

Foglie ottone, lineari solcate, fiori in pannochia, rami fioriferi brevi. *Pers. Syn.* I p. 127. *Röhl. germ.* II p. 147. *Schult. aust.* I p. 303. *Savi. Mat. Med. t.* 35.

Galium luteum. *Zann. Ven. ic. t.* 110. *f.* 1.

Galium verum. *Bauh. Hist.* III p. 720 cum icone.

Galium luteum matthioli. *Dalechamp. Hist.* p. 1088. cum icone.

Gallio. *Matth.* 1190. cum icone.

Nasce intorno Malghera nei luoghi erbosi ed umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

3. *G. mollugo.* (Weisses L.) G. bianco.

Nitido, foglie ottone ovato-lineari quasi seghettate, richinate, mucronate, fusto debole, rami patenti. *Pers. Syn.* I p. 127. *Röhl. germ.* II p. 147. *Schult. aust.* I p. 304.

G. album vulgare. *Zann. Ven.* p. 107.

G. album. *Bauh. Hist.* III p. 721. cum icone.

Nasce nei luoghi umidi intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

Frutto ispido.

4. *G. Aparine.* (Kletterndes L.) G. Appicamani.

Foglie ottone lanceolate, carene scabre, aculeate all'indietro, ginocchi villosi. *Pers. Syn.* I p. 128. *Röhl. germ.* II. p. 148. *Schult. aust.* I p. 308. *Savi. Mat. Med. t.* 35.

Aparine. *Bauh. Hist.* III p. 713. cum icone. *Dalechamp. Hist.* p. 1330. *Matth.* p. 852. cum icone.

- C. foemina*. *Dalech. Hist.* p. 197. cum icone.
Sanguina. *Matth.* p. 280 cum icone.
Nasce comunemente intorno Mestre vicino i Fossi;
fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno.

TETRAGYNIA

POTAMOGETON. (Saamkraut) Potamogeto.

Cal. o. Petali 4. Stilo o. Sem. 4.

1. *P. lucens*. (Leuchtender) *P. lucente*.
 Foglie lanceolate desinenti nel picciolo, opposte,
 piane, trinervate. *Pers. Syn.* p. 152. *Röhl.*
germ. II p. 154. chult. aust. I p. 326.
Fontinalis lucens major. Bauh. Hist. II p. 777. cum
icone.
Nasce intorno Campalto nei Fossi; fiorisce nei mesi
di Giugno e Luglio, ed è perenne.
2. *P. perfoliatum*. (Durchwachsenes S.) *P. perfoliato*.
 Foglie cuoriformi abbraccianti il fusto. *Pers. l. c.*
Röhl. germ. II p. 154. Schult. aust. I p. 325.
F. altera Dodonei. Bauh. Hist. III p. 778. cum i-
cone.
Nasce nei Fossi; fiorisce nei mesi di Luglio ed
Agosto, ed è perenne.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

MYOSOTIS. (Mausehr) Miosotide.

Cor. ipocrateriforme 5-fida, con lobi smarginati e fauce chiusa da squame. *Semi* lisci ovvero echinati.

Semi lisci.

1. *M. arvensis.* (Acker M.) M. dei campi.

Fusto ramosissimo alla base, peloso, foglie lingolate pelose, grappolo nudo, corolla connivente.

Pers. Syn. I p. 256. *Röhl. germ.* I p. 160. *Schult. aust.* I p. 366.

Lythospermum arvense minus. Zann. *Ven.* p. 170.

Echium scorpioides, solisequum, flore minore. Bauh.

Hist. III p. 589 cum icone.

Nasce nei Campi e negli Orti; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è annuale.

2. *M. palustris.* (Sumpf M.) M. dei paludi.

Fusto quasi semplice, foglie lanceolate ottuse. *Cal.*

e *Cor.* patenti. *Pers. Syn. l. c. Röhl. l. c. p. 160.*

Schult. l. c. p. 365.

Lythospermum palustre minus, flore caeruleo. Zann. *loc. cit.*

Lycopsis montana caerulea ec. ec. Barr. ic. t. 404.

Nasce intorno Malghera nei luoghi acquosi o umidi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

LITHOSPERMUM. (Steinsame) Litospermo.

Cor. infundibuliforme, *fauce* nuda. *Cal.* 5-partito.

Sem. ossei, nitidi.

L. arvense. (Acker S.) L. dei campi.

Semi rugosi neri, corolla appena più lunga del ca-

lice. *Pers. Syn.* I p. 158. *Röhl. germ.* II. p. 156.

Schult. aust. I p. 357.

Buglossum arvense, annuum, lithospermi folio.

Zann. Ven. p. 42. t. 169.

Lithospermum nigrum quibusdam, flore albo, semi-

ne Echii. *Bauh. l. c.* p. 592.

Nasce nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei me-
si di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

CYNOGLOSSUM. (Hundszunge) Cinoglossò.

Cor. infundibuliforme con *fauce* chiusa da squame
convesse conniventi. *Semi* depressi attaccati allo
stilo.

C. officinale. (Gemeine H.) C. comune.

Stami più brevi della corolla, foglie lanceolate to-

mentose, sessili, un poco conferte, semi tubercolo-

lati. *Schult. aust.* I p. 361. *Röhl. germ.* II

p. 158.

C. Staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceo-

latis tomentosis, sessilibus. *L. Pers. Syn.* I p. 159.

C. majus vulgare. *Zann. Ven. ic. t.* 219.

C. vulgare. *Bauh. Hist.* III p. 598 cum icone.

Cinoglossa volgare fiorita. *Matth.* 1250.

Nasce intorno il luogo detto Cavallino e Treporti

nei luoghi erbosi asciutti; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è biennale.

SYMPHITUM. (Beinwell) Sinfito.

Cor. col lembo tubuloso e ventricoso, chiusa da squame lesiniformi.

1. *S. officinale*. (Gemeine B.) *S. officinale*.

Foglie ovato-lanceolate scorrenti. *L. Pers. Syn.* I p. 161. *Röhl. germ.* II p. 157. *Schult. aust.* I p. 359.

S. magnum. *Bauh. Hist.* III p. 593. cum icone:

Consolida maggiore. *Math.* p. 1012. cum icone.

Nasce nei luoghi erbosi umidi intorno Malghera e Mestre; fiorisce nei mesi di Giugno sino Agosto, ed è perenne.

v. *S. tuberosum*. (Knollige B.) *S. tuberoso*.

Foglie ovate semiscorrenti, le inferiori picciolate, le superiori opposte, lacinie della corolla brevissime ottuse. *Schult. aust.* I p. 359.

S. foliis ovatis semidecurrentibus, summis oppositis. *Pers. Syn. l. c. Röhl. l. c.*

S. majus tuberosa radice. *Zann Ven.* p. 254. t. 218.

S. tuberosum. *Bauh. l. c.* p. 594. cum icone.

Nasce nei luoghi montuosi e ombrosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

BORRAGO. (Boretsche) Borrachine.

Cal. 5-partito. Cor. rotata, fauce chiusa da squame ottuse e smarginate.

B. officinalis. (Gemeine B.) B. volgare.

Foglie alterne, calici patenti. *Pers. Syn.* 7 p. 162.

Röhl. germ. II p. 158. *Schult. aust.* I p. 360

B. floribus caeruleis et albis. *Bauh Hist.* III p 574.
cum icone mala.

B. buglossum verum. *Dalech Hist.* p. 578. c. icone

Buglossa vera. *Matth* p. 1245 cum icone.

Nasce negli Orti e nei luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

ASPERUGO. (Scharfkraut) *Asperugine.*

Cor. infundibuliforme, *fauce* chiusa da squame convesse. *Cal.* fruttifero compresso, foglie piano. parallele sinuate.

A. procumbens. (Liegendes S.) A. giacente.

Pers. Syn. I p. 162. *Röhl. germ.* II p. 158. *Schult. aust.* I p. 361.

A. vulgaris. *Zann. Ven. ic. t.* 230.

Cynoglossa forte topiaria plinio sive echium lappulatum quibusdam. *Bauh. Hist.* III p. 590. cum icone.

Si trova benchè di raro intorno i terreni di S. Marta nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

ECHIUM. (Natterwurz) *Echio.*

Cal. 5-partito. *Cor.* monopetala campaniforme, 5-fida, con lacinie spesso ineguali, *fauce* nuda.

E. vulgare. (Gemeine N.) E. volgare.

Fusto tuberculato-ispido, foglie del fusto lanceolate ispide, fiori spicati laterali. *L. Pers. Syn. I. p. 164.*
Röhl. germ. II p. 156. Schult. aust. I p. 354.
 Echium majus vulgare. *Zann. Ven. ic. t. 128.*
 Echium vulgare. *Bauh. Hist. III p. 586. cum icone.*
 Echio. *Matth. p. 1049. cum icone.*
Nasce intorno Cortelazzo nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta biennale.

HOTTONIA. (Hottonie) Ottonia.

Cal. 5-partito. *Cor.* ipocrateriforme 5-fida, con lacinie smarginate. *Stim.* globoso. *Cass.* globosa acuminata di una sola cavità.

II. palustris. (Sumpf H.) O. dei paludi.

Fiori in verticilli, pedunculati. *Pers. Syn. I p. 171.*

Röhl. germ. I p. 164. Schult. aust. I p. 379.

Millefolium aquaticum dictum viola aquatica. *Bauh.*

Hist. III p. 783 cum icone.

Viola palustris. *Dalech. Hist. p. 1022. cum icone.*

Un altro miriophillo. *Matth. p. 1227. cum icone.*

Nasce in Campalto nei Fossi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

SAMOLUS. (Pungen) Samolo.

Cal. 5 partito. *Cor.* ipocrateriforme 5-fida. *Stami* inseriti nel tubo. *Cass.* di una sola cavità con cinque denti, e con molti seni.

S. Valerandi. (strand P.) S. di valerando.

Fusto dritto, foglie ottuse, grappolo con molti fiori. *Pers. Syn.* I p. 171. *Röhl. germ.* II p. 170. *Schult. aust.* I p. 396.

S. valerandi. *Zann. Ven. ic. tab.* 56. f. 2. *Bauh. Hist.* VII p. 791. cum icone.

Anagallis aquatica, altera *Lobellii*. *Dalechamp. Hist.* p. 1090. cum icone.

Nasce nei luoghi inondati dall'acqua salsa specialmente intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta biennale.

LYSIMACHIA. (Goldblume) *Lisimachia*.

Cal. 5-partito. *Cor.* rotata 5-partita. *Cass.* mucronata globosa di una sola cavità, e con dieci valve.

1. *L. vulgaris*. (Gemeine G.) *L. volgare*.

Foglie terne ovato-lanceolate, grappoli terminali. *Pers. Syn.* I p. 172. *Röhl. germ.* II p. 161. *Schult. aust.* I p. 370.

L. lutea quae dioscoridis. *Zann. Ven. ic. t.* 157. mal.

L. lutea. *Bauh. Hist.* II p. 901. cum icone mala.

L. matthioli. *Dalech. Hist.* p. 1059. cum icone.

Lisimachia. *Matth.* p. 999. cum icone.

Nasce nei Fossi, specialmente intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è perenne.

2. *L. Nummularia*. (Pfennigkraut) *Nummularia*.

Foglie cuoriformi, fiori solitarii ascellari, fusto serpeggiante. *Pers. Syn.* I p. 172. *Röhl. l. c.* *Schult. l. c.* p. 371.

Nummularia major lutea. *Zann. Ven. ic. t.* 297.

Nummularia sive centimorbia. *Bauh. Hist.* III p. 370: cum icone.

Nummularia. *Dalech. Hist.* p. 1062. cum icone.

Nummularia. *Matth.* p. 1067. cum icone.

Nasce intorno Malghera nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

ANAGALLIS. (Gauchheil) Anagallide.

Cal. 5-partito. *Cor.* rotata 5-partita. *Filam.* irsuti.

Cass. di una sola cavità coperchiata.

1. *A. phoenicea.* (Rothes G.) *A. feniceo.*

Fusto giacente, foglie ovato-lanceolate con tre nervi, lacinie del calice lanceolate. *Pers. Syn.* I p. 173. sub *A. arvensis.* *Röhl. germ.* II p. 160. *Schult. aust.* I p. 368.

A. phoeniceo flore. *Zann. Ven. ic. t.* 238.

A. phoenicea mas. *Bauh. Hist.* III p. 369.

Anagallide maschio. *Matth.* p. 656. cum icone.

Nasce nei Campi e negli Orti, e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Maggio sino Agosto, ed è pianta annuale.

2. *A. caerulea.* (Blaues G.) *A. celeste.*

Fusto giacente, foglie ovato-lanceolate spesso con cinque nervi, lacinie del calice lesiniformi. *Röhl. germ.* II p. 161. *Schult. aust.* I p. 369.

A. Caule erectiusculo, subalato, petalis dentatis, demum reflexis. *Pers. Syn.* I p. 173.

A. caeruleo flore. *Zann. Ven. p.* 15.

A. caerulea foemina. *Bauh. Hist.* III p. 369. cum ic.

Anagallide femmina . *Matth.* p. 657. cum icone.

Nasce come la precedente, ma si trova più di rado.

CONVOLVULUS . (Winde) Villuchio.

Cal. 5-partito . *Cor.* campaniforme pieghettata . *Stim.* due , semplici . *Cass.* di due o tre cavità , con *logge* disperme .

Fusto volubile?

1. *C. arvensis.* (Aker W.) V. dei campi .

Foglie saettiformi , acuminate da ambi le parti , peduncoli quasi con un solo fiore , brattee lontane dal fiore , lesiniformi . *Pers. Syn.* I p. 177. *Röhl. germ.* II p. 165. *Schult. aust.* I p. 380.

C. minor arvensis flore roseo. *Zann. Ven.* p. 72.

Helxine cyssampelos multis sive convolvulus minor.

Bauh. Hist. II p. 157 cum icone .

Helsine. *Matth.* p. 1065. cum icone .

Nasce nei Prati intorno Malghera, e comunemente negli Orti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *C. sepium.* (Zaun W.) V. delle siepi .

Foglie saettiformi , posteriormente troncate , peduncoli tetragoni , uniflori , brattee cuoriformi grandi .

Pers. Syn. l. c. *Röhl. l. c.* *Schult. l. c.* p. 381.

C. major albus. *Zann. Ven.* p. 72.

C. major. *Bauh. Hist.* II p. 154. cum icone .

Nasce lungo le Siepi e negli Orti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

Fusto giacente, non volubile.

3. *C. soldanella.* (Meerslands W.) V. marino .

Foglie reniformi, peduncoli uniflori. *Pers. Syn.* I p. 182. *Röhl. l.c.*

C. maritimus nostras rotundi folius. *Zann. Ven. ic. t. 6.*
Brassica marina sive soldanella. *Bauh. Hist.* II p. 166
 cum icone.

Brassica marina. *Matth. p. 497.* cum icone.

Nasce nel Lido, Malamocco e Treporti, nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

CAMPANULA. (Glokenblume) Campanula.

Cal. 5-partito. *Cor.* campaniforme. *Filam.* allargati alla base. *Cass.* subrotonda con 3-5 cavità, e con molti semi. (*Stimm.* 2-fido).

1. *C. Rapunculus.* (Rapunzel G.) Raperonzolo.

Radice fusiforme, foglie ondulate pelose, le radicali lanceolato-ovali, pannochia approssimata. *Pers. Syn.* I p. 189. *Röhl. germ.* II p. 173. *Schult. aust.* I p. 404.

C. Radice esculenta, flore caeruleo. *Zann. Ven. ic. t. 102 mal.*

Rapunculus vulgaris esculentus. *Bauh. Hist.* II p. 795. cum icone.

Nasce intorno Malghera nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è biennale.

2. *C. pyramidalis.* (Piramidenartige) *C.* piramidale.

Foglie lisce cuoriformi seghettate, quelle del fusto lanceolate, ombrelle laterali sessili, fusto jucci-forme. *Pers. Syn.* I p. 189. *Röhl. germ. Schult. aust.* I p. 405.

Pyramidalis laevis. *Bauh. Hist.* II p. 308. cum icone.

Pyramidalis rapunculi genus. *Dalech. Hist.* p. 612. cum icone; *et lactescens campanula major* p. 827. cum icone.

Nasce nei Muri antichi e luoghi sassosi; fiorisce nei mesi di Settembre ed Ottobre, ed è pianta biennale.

PRISMATOCARPOS. L'HERIT. (Venuspiegel) Specolo.

Cor. quasi ipocrateriforme. *Cass.* lunghissima prismatico-cilindrica di due ovvero tre cavità, e con molti semi.

P. arvensis. (Acker V.) S. dei campi.

Fusto ramosissimo, foglie bislunghe quasi intaccate, fiori solitarii. *Campanula speculum*. *L. Pers. Syn.* I p. 193. *Röhl. germ.* II p. 176. *Schult. aust.* I p. 414.

Auricularia sylvii quibusdam. *Bauh. Hist.* II p. 800. cum icone.

Nasce fra le Biade, specialmente in Campalto; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

LONICERA. (Lonicere) Lonicera.

Cal. 5-dentato. *Cor.* tubulosa 5-fida irregolare. *Bacca* inferiore di 2-3 cavità.

L. Caprifolium. (Durchwarsene L.) L. caprifoglio.

Fiori ringenti terminali sessili, foglie superiori con-
nato-perfogliate. *L. Pers. Syn. I p. 213. Schult.*
aust. I p. 414.

Caprifolium perfoliatum. *Röhl. germ. p. 175.*

Caprifolium italicum. *Zann. Ven. ic. t. 130.*

Peryclimen. perfoliatum. *Bauh. Hist. II p. 104. cum*
icone.

Nasce nel Cavallino; fiorisce nei mesi di Giugno
e Luglio, ed è pianta frutescente.

VERBASCUM. (Königskerze) Verbasco.

Cal. 5-partito. Cor. rotata quasi ineguale 5-partita.

Filam. barbati. Cass. subrotonda di due cavità e
con due valve.

1. *V. Thapsus.* (Gemeine K.) *V. comune.*

Foglie ovate a rovescio bislunghe acute tomentose,
fiori disposti in spighe lunghe quasi sessili. *Pers.*
Syn. I p. 214. Schult. aust. I p. 382.

V. mas latifolium luteum. Zannichel. Ven. ic.
t. 286.

V. vulgare flore luteo magno. Bauh. Hist. III p. 871.
cum icone.

Verbasco primo. Matth. p. 1202. cum icone.

Nasce negli Orti e in Fusina; fiorisce nei mesi di
Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

2. *V. blattaria.* (Motten K.) *V. blattaria.*

Fusto ramoso, foglie abbraccianti il fusto bislunghe
glabre, peduncoli solitarii. *L. Pers. Syn. I p. 215;*
Röhl. germ. p. 167. Schult. l. c. p. 388.

Blattaria lutea folio longo laciniato. *Zannich. Ven.*
p. 38.

Blattaria lutea. *Bauh. Hist.* III p. 874.

Blattaria. *Matth.* p. 1210. cum icone.

Nasce negli Orti; fiorisce nei mesi di Giugno sino
Agosto, ed è pianta biennale.

3. *V. sinuatum*. (Buchtige K.) *V. sinuato*.

Foglie radicali pennatofesse, repande tomentose,
quelle del fusto abbraccianti il fusto un poco
nude, quelle dei rami, prime, opposte. *L. Pers.*
loc. cit.

V. nigrum, foliis papaveris corniculati. *Zann. Ven.*
ic. t. 205.

V. crispum et sinuatum. *Bauh. Hist.* III p. 872.
cum icone.

Nasce nel Lido; fiorisce nei mesi di Giugno sino
Agosto, ed è pianta bienne.

DATURA. (Stechapfel) Stramonio.

Cal. tuboloso angolato 5-dentato caduco. *Cor.* infun-
dibuliforme, piegata. *Cass.* di due cavità, e con
quattro valve lisce ovvero spinose.

D. Stramonium. (Gemeiner S.) *S.* comune.

Frutti spinosi, eretti, ovati, foglie ovate sinuate
glabre. *L. Pers. Syn.* I p. 216. *Schult. aust.* p. 382.

Stramonium fructu spinoso, oblongo, flore albo.
Zann. Ven. ic. t. 84.

Stramon altera major s. datura quibusdam. *Bauh.*
Hist. III p. 624. cum icone.

Nasce nei luoghi coltivati, specialmente in Campalto; fiorisce nei mesi di Giugno sino Agosto, ed è pianta annuale.

HYOSCYAMUS. (Bilsenkraut) Giusquiamo.

Cal. tubuloso 5 fido. *Cor.* infundibuliforme ottusa irregolare. *Cass.* ottusa coperchiata, di due cavità, e con molti semi.

1. *H. niger.* (Schwarzes B.) G. nero.

Foglie abbraccianti il fusto, sinuate, fiori venosi, sessili. *L. Pers. Syn.* I p. 217. *Röhl. germ.* II p. 165. *Schult. l. c. Savi. Mat. Med. t. 4.*

H. vulgaris v. *niger.* *Zann. Ven. t. 255. mal.*

H. vulgaris. *Bauh. Hist.* III p. 627. cum icone.

Hioscyamo. *Matth. p. 1119. cum icone.*

Nasce negli Orti e nei luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Giugno sino Agosto, ed è pianta annuale e biennale.

2. *H. albus.* (weisses B.) G. bianco.

Foglie picciolate, sinuate, ottuse, fiori sessili. *Lin. Pers. l. c. Röhl. l. c. p. 166. Schult. l. c. p. 383. Savi l. c. t. 24.*

H. albus. *Bauh. l. c. p. 627. cum icone.*

Hiosciammo bianco. *Matth. p. 1220. cum icone.*

Nasce nei luoghi sassosi e muri, specialmente nei terreni intorno S. Marta; fiorisce nei mesi di Aprile sino Luglio, ed è pianta annuale.

PHYSALIS. (Schlutte) Fisalide.

Cal. ventricoso semicinquefido, pentagono. *Cor.* ruotata. *Stam.* conniventi. *Bacca* chiusa nel calice gonfio, di due cavità.

P. Alkekengi. (Gemeine S.) F. comune.

Foglie gemelle intere, fusto erbaceo inferiormente quasi ramoso. *L. Pers. Syn.* I p. 220. *Röhl. germ.* II p. 169. *Schult. aust.* I p. 395. *Savi. Mat. Med.* t. 59.

Alkekengi officinarum. *Zannich. Ven. ic. t.* 235.

Solanum halicacabum vulgare. *Bauh. Hist.* III p. 609 cum icone.

Solatro halicacabo. *Matth. p.* 1126. cum icone.

Nasce intorno S. Niccolò di Lido nei luoghi sassosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è perenne.

SOLANUM. (Nachtschatten) Solatro.

Cal. persistente. *Cor.* rotata, 5-loba piegata. *Antere* quasi attaccate insieme, aperte nella cima con due fiori. *Bacca* di due cavità con molti semi.

1. *S. Dulcamara.* (Kletternder N.) S. dolcamaro.

Fusto inerme, fruticoso, foglie superiori astate, grappoli cimiformi opposti alle foglie. *L. Röhl. germ.* II p. 169.

S. caule inerme fruticoso scandente, foliis cordatis glabris superioribus auriculatis, corymbis oppositifoliis. *Pers. Syn.* I p. 224. *Schult. aust.* I p. 392. *Savi. Mat. Med.* t. 14.

S. scandens seu dulcamara. *Zann. Ven. p.* 249.

Glycypheros s. amara dulcis. *Bauh. Hist.* II p. 109. cum icone.

Vite salvatica. *Matth.* p. 1345. cum icone.

Nasce comunemente nel Lido e Campalto nelle Siepi; fiorisce nei mesi di Giugno sino Ottobre, ed è frutescente.

3. *S. nigrum*. (Schwarzer N.) S. nero:

Fusto inerme erbaceo, foglie ovate dentato-angolate, ombrelle laterali nutanti. *Lin. Pers. Syn.* I p. 224. *Röhl. germ. l. c. Schult. l. c. p.* 393.

S. officinarum acinis nigricantibus. Zann. Ven. p. 248. t. 267.

S. hortense s. vulgare acinis nigris. Bauh. Hist. III p. 608.

β *S. villosum*. Fusto e foglie villose. *L. Pers. l. c. Röhl. l. c.*

S. officinarum acinis luteis. Zann. Ven. p. 249.

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati, specialmente nei Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Luglio sino Novembre, ed è pianta annuale.

RHAMNUS. (Wegdorn) Ramno.

Cal. campaniforme 4-5 fido. *Cor.* regolare di cinque petali paleiformi. *Stim.* 1-2-4-fido. *Bacca* con 3-4 semi.

R. Frangula. (Glatter W.) R. glabro.

Inerme, fiori monogini ermafroditi, foglie interissime glabre. *Pers. Syn.* I p. 239. *Röhl. germ. II p.* 177. *Schult. aust. I p.* 418.

Frangula. *Zann. Ven. ic. t. 1.*

Alnus nigra baccifera. *Bauh Hist. I p. 560.* cum icone.

Nasce nei luoghi umidi, specialmente intorno Cortelazzo; fiorisce, nei mesi di Giugno sino Agosto, ed è pianta frutescente.

EVONYMUS. (Spindelbaum) Fusano.

Cal. 5 partite con lacinie concave. *Cor.* di cinque petali. *Cass.* 5-gona di cinque cavità e con cinque valve colorata. *Semi* con arillo membranaceo.

E. europeus. (Gemeiner S.) F. comune.

Fiori, la maggior parte tetrandri 4-fidi, petali acuti, peduncoli compressi multiflori, stamma lesiniforme, foglie glabre. *Pers. Syn. 1 p. 243.* *Röhl. germ. II p. 178.* *Schult. aust. I p. 419.*

E. multus, aliis tetragonia. *Bauh Hist. I p. 201.* cum icone.

Nasce in Campalto nelle Siepi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è fruticosa.

HEDERA. (Epheu) Edera.

Petali 5-bislunghi, *bacca* con cinque semi cinta dal calice.

H. helix. (Gemeiner E.) E. volgare.

Foglie 3-5-lobe, le florali ovate, ombrella dritta.

L. Pers. Syn.

H. arborea. *Matth. p. 659.* cum icone.

Nasce in Campalto nei muri e sugli alberi; fiori-

sce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta fruticosa.

VITIS. (Wein) Vite:

Cal. piccolissimo 5-dentato. *Petali* quasi sempre aderenti fra loro per la cima e che si staccano dalla base. *Stinma* capitato. *Bacca* rotonda con cinque semi. (*Savi*).

V. vinifera. (Edler W.) V. comune.

Foglie lobate, sinuate, nude, ovvero tomentose
Pers. Syn. I p. 252.

V. vinifera. *Bauh. Hist.* II p. 67.

Vite vinifera. *Matth.* p. 1376. cum icone.

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi, e viene coltivata negli Orti; fiorisce il mese di Giugno, ed è fruticosa.

VIOLA. (Veilchen) Viola.

Cal. di cinque foglie. *Cor.* di cinque petali irregolari, uno dei quali posteriormente termina in un cornetto. *Antere* coerenti nella cima. *Cass.* superiore di una sola cavità, e con tre valve.

1. *V. odorata.* (Wohlriechendes V.) V. odorosa.

Senza fusto, foglie cuoriformi, stoloni serpeggianti.
L. Pers. Syn. I p. 254. *Röhl. germ.* II p. 179.
Schult. aust. I p. 422.

V. martia purpurea, flore semplici odoro. *Zannich.*
Ven. t. 270.

V. martia purpurea. *Bauh. Hist.* III p. 542 cum icone.

Viole porporee. *Matth.* p. 1239.

♁ *V. alba*. Floribus albis. *Schult. l. c.*

Nasce comunemente in Campalto appresso le Siepi, e nei luoghi ombrosi; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta perenne.

2. *V. tricolor*. (Dreifarbiges V.) *V. socera* e *Nora*.
(*Savi*)

Fusti angolati, glabri diffusi, foglie bislunghe intagliate, intaccate, stipole pennatofesse. *L. Pers. Syn.* I p. 255. *Röhl. germ.* II p. 180. *Schult. l. c.* p. 429. *Savi. Mat. Med. t.* 28.

Jacea bicolor, frugum et hortorum vitium trago:
Bauh. l. c. p. 548.

Viola flammea minor. *Dalech. Hist.* p. 800 cum icone:

Un' altra *jacea*. *Matth.* p. 1242.

Nasce intorno S. Marta, e comunemente negli Orti; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

VINCETOXICUM. (Schwalbenwurtz) Vincetossico
Cor. ruotata dritta 5-partita. *Nettar.* Cinque squame
o calli carnosì, retusi, *follicoli* 2, *semi* lanosi.

V. vulgare. (Gemeine S.) *V. volgare*.

Fusto eretto, foglie opposte cordato-ovate acute, un poco ciliate, ombrelle ascellari proliferare. *Schult. aust.* I p. 437.

Cynanchum (*Vincetoxicum*). *Caule* erecto, *folis* ovatis acuminatis tenuissime ciliatis. *Pers. Syn.*

Asclepias (*Vincetoxicum*). *Röhl. germ.* II p. 184.

Asclep. albo flore . *Zann. Ven. t. 5.*

Asc. s. vincetoxicum multis . *Bauh. Hist. II p. 138*
cum icone .

Vincetossico . *Matth. p. 855.* cum icone .

Nasce nei luoghi umidi, e nelle Siepi in Campalto;
fiorisce nei mesi di Maggio sino Settembre, ed è
pianta perenne .

APOCYNUM. (Hundswolle) Apocino.

Cor. campaniforme semi 5 fida , con lobi piegati in
fuori colla cima . *Stil.* quasi o . *Stim.* largo . Due
follicoli lunghi lineari .

A. venetum. (Venetianische H.) *A. veneto.*

Fusto dritto erbaceo , foglie ellittico-lanceolate mu-
cronate , dentellato-scabre nel margine . *Pers. Syn.*
I p. 274.

A. maritimum venetum. *Zann. Ven. ic. t. 76.*

Alypum quibusdam s. esula rara flore purpureo .
Bauh. Hist. I I p. 676. cum icone .

Nasce nei luoghi arenosi e secchi, specialmente nel
luogo detto gli Alberoni; fiorisce nei mesi di Lu-
glio ed Agosto, ed è pianta perenne .

ERYTHREA. (Tausendguldenkraut) Centauro .

Cal. stretto subpentagono 5 dentato . *Cor.* infundi-
buliforme col tubo lungo . *Antere* attorcigliate a
spira dopo la fecondazione . *Stim.* 1-2. approssima-
ti . *Cass.* sottile di una sola cavità .

E. centaurium. (Gemeines T.) *C. comune.*

Foglie ovali-bislunghe, fusto dicotomo, fiori fascicolato-panicolati con 1-2. squame alla base. *Pers. Syn.* I p. 283.

Gentiana centaurium. *L. Sp. pl.*

Chironia Centaurium. *Röhl. germ.* II p. 167.

Hippocentaurea centaurium. *Schult. aust.* I p. 388.

Centaurium minus. *Zann. Ven.* p. 55. t. 249.

Centaur. minus flore purpureo. *Bauh. Hist.* III p. 353. cum icone.

Centaurea minore. *Matth* p. 692. cum icone.

β floribus albis. *Pers. l. c.*

Nasce comunemente nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Giugno sino Agosto, ed è pianta annuale.

DYGYNIA

GENTIANA. (Entzian) Gentiana.

Cor. 1-petala. *Cass.* di una sola cavità, e con due valve. *Ricett.* due longitudinali.

1. *G. Pneumonanthe.* (Gemeiner F.) *G. volgare.*

Fiori 5-fidi campaniformi, ascellari pedunculati, foglie lineari-lanceolate ottuse. *Pers. Syn.* I p. 284.

Röhl. germ. II p. 186. *Schult. aust.* I p. 441.

G. angustifolia autumnalis major. *Zann. Ven.* t. 39. f. 1.

Gentiana species calathiana quibusdam radice perpetua. *Bauh. Hist.* III p. 524 cum icone.

Gentianella. *Barr. ic.* t. 52.

Calathiana viola et campanula pratensis. *Dalechamp.*

Hist. p. 824 cum icone.

Gentiana minima. *Matth.* p. 682. cum icone.

Nasce comunemente nei Treporti e nel Cavallino nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

2. *G. amarella*. (Amarellen E.) *G. amarella*.

Cor. ipocrateriformi 5-fide, colla fauce barbata, lacinie del calice eguali, foglie ovato-lanceolate. *Pers. Syn.* I p. 285. *Röhl. germ.* p. 187. *Schult. aust.* I p. 446.

G. autumnalis ramosa. *Zann. Ven.* p. 109. *tab.* 58. *fig.* 1.

G. pratensis flore lanuginoso. *Zann. Ven.* p. 110. *t.* 46. *fig.* 1.

Gentianellae species quibusdam. *Bauh. Hist.* III p. 525. cum icone.

Nasce come la precedente.

CUSCUTA. (Flachsseide) *Cuscuta*.

Cal. 4-5-fido. *Cor.* 4-5-fida. *Cass.* coperchiata di due cavità. *Stam.* 4 5.

C. vulgaris. (Gemeine F.) *C. volgare*.

Fiori quasi sessili, *stim.* acuti. *Pers. Syn.* I p. 289. *Röhl. germ.* *Schult. aust.*

C. major. *Zann. Ven. ic t.* 138. *fig.* 2.

Cassuta s cuscuta. *Bauh. Hist.* III p. 266. cum icone.

Nasce in Malghera e nel Cavallino sopra diverse piante; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

ULMUS : (Ruster) Olmo.

Cal campaniforme 5-fido. *Cor.* o. *Cass.* compressa membranaceo-alata.

U. campestris. (Gemeine R.) O. comune.

Foglie doppiamente seghettate, ineguali alla base, fiori quasi sessili conglomerati, con cinque stami, frutti glabri. *Pers. Syn.* I p. 291. *Röhl. germ.* II p. 196. *Schult. aust.* I p. 464.

U. campestris et Theophrasti. *Zannichel. Ven.* p. 279.

Ulmus. *Bauh. Hist.* I p. 139 cum icone.

Olmo. *Matth.* p. 161 cum icone.

Nasce intorno Fusina; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta arborea.

CHENOPODIUM. (Gänsefuss) Chenopodio.

Cal. di 5-foglie, 5-gono. *Sem.* 1 lenticolare superiore. *Cor.* o.

1. *C. urbicum.* (Stadt G.) C. cittadino.

Foglie triangolari, quasi dentate, grappoli conferti, drittissimi, approssimati al fusto, lunghissimi, quasi senza foglie. *Pers. Syn.* I p. 294. *Röhl. germ.* p. 189. *Schult. aust.* I p. 453.

Nasce nel luogo detto Aca bianca; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

2. *C. album.* (Weisser G.) C. bianco.

Foglie romboideo-ovate erose, posteriormente intere, le superiori bislunghe, grappoli dritti. *Pers. Syn.* I p. 294. *Röhl. l. c.* p. 190. *Schult. l. c.* p. 455.

Atriplex sylvestris. *Bauh. Hist.* I p. 972.

Nasce negli Orti; fiorisce nei mesi di Luglio sino Settembre, ed è pianta annuale.

3. *C. viride*. (Grüner G.) C. verde.

Foglie romboidali dentato-sinuate, grappoli ramosi quasi fogliosi. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

C. folio sinuato candicante. *Zann. Ven. p. 62.*

Atriplex sylvestris. *Bauh. Hist.* II p. 972 cum ic.

Atriplice salvatico 2. *Matth. p. 489.*

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati fiorisce nei mesi di Luglio sino Settembre, ed è pianta annuale.

4. *C. olidum*. (Stinkender G.) C. puzzolente.

Foglie interissime rombeo-ovate, fiori conglomerati ascellari, fusti diffusi. *Pers. Syn. l. c. Röhl. l. cit. p. 191. Schult. l. c. p. 457.*

C. foetidum. *Zann. Ven. t. 144. fig. 2.*

Atriplex foetida. *Bauh. Hist.* III p. 974 cum icone.

Nasce negli Orti appresso i muri; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

Foglie incane glauche.

5. *C. polyspermum*. (Vielsamiger G.) C. polispermo.

Foglie ovate interissime ottuse, cime dicotome senza foglie, ascellari, semi quasi nudi. *Pers. Syn.*

I p. 295. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 457.*

Nasce intorno Malghera nei luoghi erbosi e umidi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta annuale.

Fusto divergente, foglie rosse nel margine. *Schult. l. c. p. 458.*

6. *C. Scoparia*. (Besenartiger G.) C. Belvedere.
 Foglie piane lineari-lanceolate, ciliate nel margine.
Pers. l. c. Röhl. l. c.
 Linaria Belvedere dicta. *Bauh. Hist. III p. 462. cum icone.*
Nasce intorno il luogo detto S. Marta; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.
7. *C. maritimum*. (Strand G.) C. marino.
 Foglie lesiniformi carnose semitereti, fiori glomerati ascellari. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 458.*
 C. sedi folio minimo, Kali facie, semine splendente annum. *Zann. Ven. ic. t. 14.*
Nasce nei luoghi inondati dall'acqua salsa; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.
 Fusto eretto ramosissimo.

SALSOLA. (Salzkraut) Soda.

Cal. di cinque foglie. *Cor. o. Stil. 2-3-fido. Cass.* con un solo seme. *Sem.* attorcigliato a spira coperto dal calice.

1. *S. Soda*. (Langblättriges S.) S. volgare.
 Erbacea patula, foglie inermi succolente. *Pers. Syn. I p. 295. Röhl. germ. II p. 189.*
 Kali majus cochleato semine. *Zann. Ven. p. 153.*
 Cali vulgare. *Bauh. Hist. III p. 704.*
Nasce comunemente nei luoghi bagnati dall'acqua

salsa; *fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta annuale.*

S. Kali. (Gemeines S.) S. Cali.

Fusto giacente, foglie lesiniformi, spinose nella cima, calici marginati ascellari. *Pers. Syn.* I p. 295. *Röhl. l. c. p.* 188. *Schult. aust.* I p. 450.

Kali spinosum foliis crassioribus et brevioribus: *Zann. Ven. p.* 153.

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi appresso il mare; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

Fusto ramosissimo ispido, foglie scanalate patentissime scabre. *Stil.* 3.fido.

UMBELLATAE

ERYNGIUM. (Mannstreu) Eringio .

Fiori capitati. Invoglio di molte foglie. Cal. parziale di cinque foglie, superiore. Cor. di cinque petali. Ricett. paleaceo. Frutt. ovato, e coronato dal calice.

E. maritimum. (Meerstrands M.) E. marino.

Foglie radicali subrotonde, pieghettate, spinose, capolini peduncolati, palei tricuspidati. *Pers. Syn.* I p. 299. *Röhl. germ.* II p. 195.

E. maritimum. *Zann. Ven. t.* 94.

E. marinum. *Bauh. Hist.* III p. 86 cum icone.

Eringio marino. *Matth. p.* 717 cum icone.

Nasce abbondevolmente in tutte le spiagge arenose, specialmente in quella del Lido; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

ECHINOPHORA. (Stacheldolde) Echinofora.

Fiori del raggio maschi, fiore del disco ermafrodito, petali ineguali. Sem. ovato-bislungo involupato in una guaina fungosa ch'è la base dell'involucro parziale.

E. spinosa. (Dornige S.) *E. spinosa.*

Foglioline lesiniformi spinose interissimé e trifide.

Pers. Syn. I p. 301. Röhl. germ. II p. 216.

E. maritima spinosa. *Zann. Ven. p. 90. t. 15 mala.*

Pastinaca marina quibusdam. Bauh. Hist. III p. 196 cum icone.

Crithamo 2.^{do} Matth. p. 519 cum icone.

Nasce abbondevolmente nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

BUPLEURUM. (Durchwachs). Perfoliata.

Invoglio delle ombrellette maggiori di cinque foglie.

Petali involuti. Frutto subrotondo compresso striato.

B. rotundifolium. (Rundblättriger D.) *P. rotundifolia.*

Erbacea, invogli universali mancano, foglie perfoliate. *Pers. Syn. I p. 304. Röhl. germ. II p. 208.*

Schult. aust. I p. 490.

Perfoliata simpliciter dicta vulgaris annua. *Bauh. Hist.* III p. 198.

Perfoliata. *Matth.* p. 1215 cum icone.

Nasce fra le Biade, ed anche intorno S. Marta; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

Fusto eretto. Foglie rotundo-ovate acute un poco glauche. Invoglietti di 35 foglie ellittiche, qualche volta bifide. Fiori gialli.

CAUCALIS. (Haftdolde) Caucalide.

Petali del disco eguali, quelli della circonferenza ineguali. Frutto ovato-bislungo costato, coperto di punte. Invoglio di molte foglie intere, e in qualche specie o.

1. *C. grandiflora.* (Grossblüthige H.) *C. grandiflora.*

Invogli di cinque foglie, delle quali una o due molto più grandi delle altre; Petali esteriori grandissimi. L. Pers. Syn. I p. 306. Röhl. germ. II p. 214. Schult. l. c p 475.

C. arvensis echinata, magno flore. Zann. Ven. p. 54. t. 209.

Lappula canaria flore pulchro. Bauh. Hist. III p. 79 cum icone.

Caucalis Dodonaci. Dalech. Hist. p. 715 cum icone.

Nasce benchè di rado intorno Campalto nei luoghi sterili; fiorisce nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

Rami divergenti. Foglie arcicomposte. Foglioline piccole lanceolate, confluenti. Invoglietti per lo

più di 3-6 foglie. Fiori del disco per lo più sterili.

2. *C. Anthriscus*. (Wald II.) C. Antrisco.

Fusto prolungato, rami dritti, foglioline ovato-lanceolate pennatofesse, involglio universale quasi nessuno. *Pers. Syn. I p. 306. Röhl. germ. II p. 214. Schult. aust. p. 478.*

Tordylium Anthriscus. L. Sp. pl.

Anthriscus quorundam semine aspero: Bauh. Hist. II p. 83 cum icone.

Nasce nei luoghi sassosi, specialmente intorno i terreni di S. Marta; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta biennale.

Fusto solcato. Foglioline intagliato-seghettate. Antere violacee. *Schult. l. c.*

DAUCUS. (Mohrrübe) Carota.

Cor. subradiata. Fioretti del disco abortivi. Frutto striato, coperto di peli rigidi.

D. Carota. (Gemeine M.) C. comune.

Semi ispidi, piccioli nervosi alla base, lacinie delle foglie lineari acute. *Pers. Syn. I p. 307. Röhl. germ. II p. 413. Schult. aust. I p. 479.*

D. vulgaris. Zann. Ven. p. 85. t. 190.

Pastinaca sylvestris s. Staphylinus graccorum. Bauh. Hist. II p. 62 cum icone.

Pastin. sylvestris Matthioli. Dalechamp. Hist. p. 720 cum icone.

Pastinaca salvatica. Matth. p. 789.

Nasce comunemente nei luoghi erbosi intorno Malghera e Campalto; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta biennale.

CONIUM. (Schierling) Conio.

Invoglio parziale di tre foglie. Frutto subrotondo con cinque costole, tubercolate su ciascuna delle due superficie.

C. maculatum. (Gefleckter S.) C. macchiato.

Fusto ramosissimo macchiato, semi striati. Persoon Syn. I p. 308. Röhl. germ. p. 202. Schult. aust. I p. 202.

Cicuta major. Zann. Ven. p. 66. t. 284.

Cicuta. Bauh. Hist. III p. 175 cum icone.

Cicuta. Dalech. Hist. p. 788 cum icone. Matth. p. 1155 cum icone.

Nasce intorno Malghera e Mestre nei Fossi e luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta biennale.

Il fusto arriva all' altezza di 2-6 piedi, ed è leggermente striato, per lo più macchiato, superiormente ramosissimo, fistuloso. Foglioline patenti, nitide, ovate, acute, pennatofesse. Petali involuti cuoriformi.

CRITHMUM. (Meerfenchel) Critamo :

Invoglio di molte foglie. Frutto ovale compresso. Fioretti eguali.

C. maritimum. (Schmalblättriger M.) C. marino.

Foglioline lanceolate carnose. *Pers. Syn.* I p. 311.

Röhl. germ. I p. 311.

C. seu foeniculum marinum minus. *Zann. Ven.* p. 74. t. 9.

C. multis, s. foeniculum marinum. *Bauh. Hist.* III p. 194 cum icone.

C. Matthioli. *Dalech. Hist.* p. 768 cum icone.

Crithamo 1^{mo} *Matth.* p. 518 cum icone.

Nasce comunemente nei Muri antichi, e fra' sassi, specialmente al Porto di Malamocco; fiorisce nei mesi di Settembre ed Ottobre, ed è pianta perenne.

Pianta glabra glauca. Fusto giacente ramoso. Foglie bipennate. Foglioline lanceolate carnose intere, ovvero lobate.

ANGELICA. (Engelwurtz) Angelica:

Frutto subrotondo, alato nel margine, con tre scanellature elevate nel mezzo. Petali eguali incurvi.

A. sylvestris. (Wilde E.) *A. selvatica.*

Foglioline eguali, ovato-lanceolate seghettate. *Pers. Syn.* I p. 315.

Imperatoria sylvestris. *Röhl. germ.* II p. 198. *Schult. aust.* I p. 509.

A. sylvestris major. *Zann. Ven.* p. 16. t. 278.

A. sylvestris magna vulgatiore. *Bauh. Hist.* III p. 144 cum icone.

A. sylvestris Matthioli. *Dalech. Hist.* p. 725 cum icone.

A. salvatica. *Matth.* p. 1230 cum icone.

Nasce nei luoghi umidi in Malghera, Campalto e Fusina; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

Pianta glabra. Fusto superiormente un poco solcato. Guaine ovato ventricose. Invoglietti di 6-7 foglie. Schult. l. c.

Sium. (Merk) Sio.

Frutto quasi ovato, compresso, striato. Invoglio di molte foglie. Petali cordati.

S. sulcatum. (Gefurchter M.) S. solcato.

Fusto prolungato solcato angolato, foglie pennate, foglioline lanceolate, egualmente seghettate, ombrella terminale. Pers. Syn. I p. 316.

S. latifolium. L. Schult. aust.

Cicuta latifolia. Rühl. germ. II p. 204.

Sium medium. Bauh. Hist. III p. 174.

S. maximum latifolium. Ejusd. p. 175.

Nasce comunemente intorno Malghera nei Fossi e luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

OENANTHE. (Rebendolde) Enante.

Pet. del disco cordati quasi eguali. Pet. del raggio maggiori ed irregolari. Frutto striato retuso, coronato dal calice e dal pistillo.

O. fistulosa. (Röhrige R.) E. fistolosa.

Stolonifera, foglie del fusto pennate con foglioline filiformi fistolose, invoglio universale quasi nes-

suno. *Pers. Syn.* I p. 318. *Schult. aust.* I p. 474.
Nasce intorno Malghera nei Prati umidi e Fossi;
fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta
perenne.

2. *O. pimpinelloides.* (Bibernellartige R.) F. pimpinelloide.

Foglioline radicali cuneiformi, fesse, quelle del fusto, interissime, lineari, lunghissime, semplici.

Pers. l. c. Röhl. l. c. p. 208. Schult. l. c. p. 475.

O. seu Filipendula monspessulana, folio Apii. Bauh. Hist. III p. 190 cum icone.

Nasce come la precedente.

PELLANDRIUM. (Wasserfenchel) Felandrio.

Fioretti del disco minori. Frutto liscio ovato, coronato dal calice e dal pistillo.

P. aquaticum. (Gemeiner W.) F. acquatico.

Rami delle foglie divaricati. *Pers. Syn.* I p. 318.

Röhl. germ. II p. 203. Schult. aust. I p. 508.

Nasce intorno Campalto e Malghera nei Fossi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta biennale.

CORIANDRUM. (Koriander) Coriandro.

Petali eguali nel centro, ineguali nella circonferenza, plicato-cordati. Invoglio universale di una sola foglia, parziali smezzati. Frutto sferico.

C. sativum. (Gemeiner K) C. comune.

Frutti globosi. *L. Pers. Syn. I p. 319. Röhl. germ.*

II p. 196. *Schult. aust. I p. 502.*

Nasce nei luoghi sassosi e Rovinazzi, specialmente intorno i terreni di S. Marta; fiorisce nel mese di Giugno, ed è pianta annuale.

SCANDIX. (Körbel) Scandice.

Ombrella semplice. Fiori raggianti. Invoglio di molte foglie smarginate, ovvero pennato-intagliate. Frutto terminato da un rostro lunghissimo, quasi peloso.

S. Pecten. (Langschnabeliger K.) S. pettine di Venere.

Foglie molto fesse, semi maggiori, quasi glabri. Pers. Syn. I p. 319. Röhl. germ. II p. 214. Schult. aust. I p. 503.

Pecten Veneris. Bauh. Hist. III p. 71.

Nasce fra le Biade, ed anche intorno i terreni di S. Marta; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

PASTINACA. (Pastinak) Pastinaca.

Frutto ellittico compresso-piano. Petali involuti interi.

P. sativa. (Gemeiner P.) P. comune.

Foglie semplicemente pennate. L. Pers. Syn. I p. 322.

Röhl. germ. V p. 196. Schult. aust. p. 516.

P. sylvestris latifolia. Zann. Ven. p. 205. t. 298.

P. germanica. Bauh. Hist. III p. 149.

Nasce comunemente in Campalto nei Prati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta biennale.

PIMPINELLA. (Bibernell) Pimpinella.

Frutto ovato-bislungo. Petali incurvi. Stim. subgloboso. Ombrelle nutanti prima della fioritura.

P. magna. (Grosse B.) *P. grande.*

Foglie uniformi pennate, foglioline tutte lobate l'impare trilobo. Pers. Syn. I p. 323. Röhl. germ. II p. 204. Schult. aust. I p. 518.

Tragoselinum majus, umbella candida. Zann. Ven. p. 262. t. 306.

Saxifraga hircina major. Bauh. Hist. III p. 109 cum icone.

Nasce in Campalto e Malghera nei Prati e nei luoghi ombrosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

APIUM. (Eppich) Apio.

Frutto ovato striato. Invoglio monofillo. Petali eguali.

A. graveolens. (Sellerie E.) *A. Sedano.*

Fusto solcato, foglie del fusto cuneiformi trilobe. Pers. Syn. I p. 324. Röhl. germ. II p. 205. Schult. aust. I p. 517.

Nasce nei luoghi bagnati dall'acqua salsa, specialmente nel luogo detto Aca bianca; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta biennale.

TRIGYNIA

VIBURNUM. (Schneeball) Viburno.

Cal. 5-partito superiore. *Cor.* 5-fida. *Bacca* con un solo seme.

V. Lantana. (Wolliger S.) *V. Lantana*.

Foglie cuoriformi seghettate, inferiormente tomentose. *Lin. Pers. Syn.* I p. 327. *Röhl. germ.* II p. 216. *Schult. aust.* I p. 520.

Viburnum. *Zann. Ven.* p. 275. t. 310.

Lantana vulgo aliis *Viburnam*. *Bauh. Hist.* I p. 557.

Viburno *Matth.* p. 235 cum icone.

Nasce in Campalto *nei luoghi ombrosi ed umidi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta fruticosa.*

SAMBUCUS. (Hollunder) Sambuco.

Cal. 5-partito. *Cor.* 5-fida. *Bacca* con tre semi.

1. *S. Ebulus*. (Zwerg H.) S Ebolo.

Cime tripartite, stipole fogliacee ovate, fusto erbaceo. *Pers. Syn.* I p. 238. *Röhl. germ.* II p. 217. *Schult. aust.* I p. 520.

Ebulus. *Zann. Ven.* p. 89. t. 286.

Ebul. s. Sambucus herbacea. *Bauh. Hist.* I p. 546 cum icone.

Ebulo. *Matth.* p. 1333 cum icone.

Nasce comunemente intorno Campalto e Malghera,

e specialmente intorno Fusina; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

2. *S. nigra*. (Gemeiner H.) S. comune.

Cime 5-partite, foglioline ovate seghettate, fusto arboreo. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 521.*

S. vulgaris. Bauh. Hist. I p. 544.

Nasce intorno Fusina e fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno.

TAMARIX. (Tamariske) Tamarisco.

Cal. 5-partito. *Petali* 5 *Cass.* di una sola cavità, e con tre valve. *Semi* comosi.

T. gallica. (Französische T.) T. di Francia.

Fiori pentandri, spighe laterali. *Pers. Syn. I p. 328.*

Röhl. germ. II p. 220.

Tamariscus narbonensis. Zann. Ven. p. 255. t. 186.

Tamarix major arborea narbonensis. I. Bauh. Hist. I p. 350 cum icone.

Nasce nel Lido, e vicino a Malamocco nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta fruticosa.

ALSINE. (Vogelmiere) Alsine.

Cal. di cinque foglie. *Petali* cinque eguali bifidi.

Cass. superiore di una sola cavità, e di tre valve con molti semi. *Stami* 1-10.

A. media. (Gemeine V.) A. mezzana.

Foglie inferiori cordato ovate, le superiori ovate,

petali bipartiti, stami 3-10. *Pers. Syn.* I p. 330.

Röhl. germ. II p. 218. *Schult. aust.* I p. 523.

A. media . *Zann. Ven.* p. 9.

A. vulgaris, seu morsus gallinae . *Bauh. Hist.* III p. 363 cum icone .

*Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati ;
fiorisce nei mesi di febbrajo sino Dicembre , ed
è pianta annuale .*

TETRAGYNIA

PARNASSIA . (Parnassie) Parnassia .

Cal. 5-partito. *Petali* cinque. *Nettari* cuoriformi muniti di cigli glandolosi. *Cass.* di due cavità, e con quattro valve.

P. europaea . (Europäische P.) *P. europea* .

Foglie radicali cuoriformi , fusto semplice con un solo fiore . *Pers. Syn.* I p. 331.

P. palustris . *L. Sp.* *Röhl. germ.* II p. 218. *Schult. aust.* I p. 523.

P. palustris et vulgaris . *Zann. Ven.* p. 204. t. 51.

Gramen Parnassi Dodoneo . *Bauh. Hist.* III p. 537 cum icone .

Gram. Parnassi . *Dalech. Hist.* p. 1005.

Nasce comunemente nei luoghi arenosi ed umidi nei Treporti e nel Cavallino ; fiorisce nei mesi di Luglio sino Settembre , ed è pianta perenne .

PENTAGYNIA

STATICE. (Grasnelke) Limonio.

Cal. di due foglie intere, pieghettato, scarioso. *Petal.* cinque. *Seme* uno superiore.

1. *S. Limonium.* (Meerstrands G.) L. comune.

Scapo panicolato terete, foglie lisce, enervi, ondante, mucronate sotto la cima. *Pers. Syn.* I p. 333. *Rhöl. germ.* II p. 221.

Limonium maritimum majus. *Zannichel. Ven.* p. 164. *tab.* 31.

Lim. majus multis, aliis Behen rubrum. *Bauh. Hist.* III p. 876 cum icone.

Nasce comunemente nei luoghi bagnati dall'acqua salsa detti volgarmente Barene; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

2. *S. auriculaefolia.* (Aurikelblättrige G.) S. a foglie d'auricola.

Scapo panicolato terete, foglie spatolate acute, mucronate sotto la cima, piane, cartilagineo marginate, trinervi. *Nob.*

S. auriculaefolia. *Pers. Syn.?*

Nasce benchè di rado intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è perenne.

3. *S. reticulata.* (Netzartige G.) L. retiforme.

Scapo panicolato disteso, rami sterili, piegati, nudi, foglie cuneiformi mutiche. *Pers. l. c.*

Limonium minus angustifolium geniculatum ec. ec.

Zannich. Ven. p. 165. t. 232.

Nasce nei luoghi bagnati dall'acqua salsa; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

LINUM. (Lein) Lino.

Cal. di cinque foglie. Petali 5. Cass. di cinque valve e di dieci cavità. Semi solitarii.

1. *L. tenuifolium*. (Feinblättriger L.) L. a foglie sottili.

Foglie calicine acuminate, foglie sparse lineari setacee, scabre all'indietro. *Persoon Syn. I p. 335.*

Röhl. germ. II p. 219. Schult. aust. I p. 526.

L. sylvestre angustifolium. Zannicheli. Ven. p. 168.

L. sylvestre angustifolium album. Bauhin. Hist. III p. 453 cum icone.

Nasce comunemente nei Treporti; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è perenne.

2. *L. maritimum*. (Meerstrands L.) L. marino:

Foglie del calice ovate, acute, mutiche. Foglie lanceolate, le inferiori opposte. *Pers. Syn. I p. 335. Röhl. l. c. p. 220. Schult. aust. I p. 527.*

L. maritimum luteum. Zann. Ven. p. 168. t. 78.

L. luteum narbonense. Bauh. Hist. III p. 454 cum icone.

Nasce nei Treporti, Cavallino, Chioggia e Campalto nei Prati; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

3. *L. catharticum*. (Purgierender L.) L. purgante.
 Foglie opposte ovato-lanceolate, fusto superiormente
 dicotomo, corolle acute. *Pers. l. c. p. 336. Röhl.*
l. c. Schult. aust. I p. 528.
L. pratense floribus exiguis. Zannichel. Ven. p. 169.
t. 258.
 Alsine herba glabra flosculis albis, vel potius Li-
 num. *Bauh. Hist. III p. 455 cum icone.*
Nasce comunemente nei Prati erbosi; fiorisce nei
mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

- LEUCOJUM. (Knottenblume) Leucojo.
Cor. campaniforme 6-partita, con le divisioni in-
 grossate nella cima. *Stigma* semplice.
- L. aestivum*. (Sommer K.) L. d'estate.
 Spata con molti fiori, stilo clavato. *Pers. Syn. I*
p. 349. Röhl. germ. II p. 223. Schult. aust. I p. 540
Narcisso-leucojum pratense. Zannichel. Ven. p. 191.
t. 301.
Leucoj. bulbosum polyanthemum. Bauh. Hist. III
p. 592 cum icone.
Nasce intorno Campalto nei luoghi umidi; fiorisce
nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta pe-
renne.

NARCISSUS . (Narcisse) Narciso :

*Petali 6 eguali. Nettario infundibuliforme monofil-
lo. Stami dentro nel nettario.*

N. biflorus. (Zweiblumige N.) N. bifloro.

Spata con due fiori, nettario brevissimo scarioso.

Pers. Syn. I p. 350.

*Nasce nel Lido nei luoghi umidi, fiorisce nei mesi
di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.*

ALLIUM . (Lauch) Aglio :

*Cor. 6-partita patente. Spata con molti fiori. Om-
brella ammuchciata. Cass. superiore.*

1. *A. suaveolens.* (Wohlriechender L.) A. odoroso .

Scapo nudo un poco terete, foglie linearì carenate,
ombrella subrotonda, stami lesiniformi. *Persoon
Syn. I p. 355. Röhl. germ. II p. 223. Schult. aust.
I p. 542.*

*A. maritimum venetum autumnale angustioribus fo-
liis. Zann. Ven. p. 6. t. 191.*

*Nasce nei Treporti e nel Cavallino nei Prati umidi;
fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è
pianta perenne.*

2. *A. carinatum.* (Kielblättriger L.) A. carenato.

Fusto con foglie piane ombrellifero, stami lesiniformi,
spata acuta lunghissima. *Pers. Syn. I p. 456.
Röhl. germ. l. c. p. 224. Schult. l. c. p. 544.*

*A. sylvestre bicorne purpureum proliferum. Bauh.
Hist. II p. 561 cum icone.*

Nasce negli Orti nei luoghi sassosi e montuosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

3. *A. sphaerocephalon.* (Rundköpfliger L.) *A. sferocefalo.*

Fusto con foglie tereti, ombrellifero, foglie semitereti, stami tricuspидati più lunghi della corolla. *Pers. Syn. I p. 356. Röhl. l. c. Schult. loc. cit. p. 545.*

Alii genus, forte *Scorodoprasum alterum* Lobelio: *Bauh. Hist. II p. 564 cum icone.*

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce il mese di Agosto, ed è pianta perenne.

4. *A. angulosum.* (Eckiger L.) *A. angoloso.*

Scapo nudo a due tagli, foglie lineari scanalate inferiormente quasi angolate, ombrella fastigiata. *Pers. Syn. I p. 357. Röhl. germ. loc. cit. Schult. aust. I p. 548.*

A. petraeum umbelliferum: *Bauh. Hist. II p. 564 cum icone.*

A. saxatile, acori radice, flore purpureo. *Barr. ic. t. 1022*

Nasce in Campalto e Malghera nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

ORNITHOGALUM. (Vogelmilch) Ornitogalo.

Cor. di sei petali, eretta, connivente alla base, aperta in cima. *Filamenti* alternamente allargati.

Cass. subrotonda , angolata, di tre cavità. *Pers.*
Syn.

O. umbellatum . (Doldenförmige V.) *O.* ombrellato .
Fiori disposti in corimbo , peduncoli esterni più lunghi dello scapo . *Pers. Syn.* I p. 363. *Röhl. germ.* II p. 229. *Schult. aust.* I p. 559.

O. umbellatum medium . *Zannich. Ven.* p. 201.

O. vulgare . *Bauh. Hist.* II p. 630 cum icone .

Ornitogalo 2.^{do} *Matth.* p. 572 cum icone .

*Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati ;
fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta perenne .*

ANTHERICUM. (Zaunblume) Anterico.

Cor. di sei petali patenti. *Stami* glabri. *Stim.* ottuso triangolare. *Cass.* ovata. *Semi* angolosi.

A. ramosum . (Aestige Z.) *A.* ramoso .

Foglie piane , scapo ramoso , petali piani , stilo clavato . *Röhl. germ.* II p. 227. *Schult. aust.* I p. 556.

Phalangium ramosum . *Pers. Syn.*

Phal. parvo flore. *Zann. Ven.* p. 209. t. 20. f. 2.

Phal. quibusdam parvo flore. *Bauh. Hist.* II p. 635 cum icone .

*Nasce nel Cavallino e Cortelazzo nei luoghi arenosi ;
fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio , ed è pianta perenne .*

ASPARAGUS. (Spargel) Sparago.

Cor. sei partita , colle tre divisioni interne piegate

nella cima. *Bacca* superiore di tre cavità e con molti semi.

1. *A. officinalis*. (Gemeiner S.) A. comune.

Fusto erbaceo eretto panicolato glauco, foglie setacee glauche, peduncoli articolati nel mezzo. *Pers. Syn.* I p. 370. *Röhl. germ.* II p. 231. *Schult. aust.* I p. 566.

A. maritimus crassiore folio *Zann. Ven.* p. 24. t. 74.

A. marinus. *Bauh. Hist.* III p. 726.

Nasce nei luoghi bagnati dall'acqua salsa, specialmente intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

2. *A. acutifolius*. (Spitzblättriger S.) S. acuto.

Fusto inerme angolato fruticoso, foglie aciformi rigide, sempreverdi, mucronate, eguali. *Pers. Syn.* I p. 371. *Röhl. germ.* II p. 230.

A. foliis acutis. *Zann. Ven.* p. 24. t. 179.

Corruda. *Bauh. Hist.* III p. 726 cum icone.

Nasce nel Cavallino e Cortelazzo nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è fruticosa.

CONVALLARIA. (Maililie) Poligonato.

Cor. 6-fida. *Bacca* macchiata, superiore, di tre cavità.

C. Polygonatum. (Gemeine M.) P. volgare.

Cor. infundibuliforme, foglie alterne abbraccianti il fusto, fusto a due tagli, peduncoli ascellari, 1-3

flori. *Pers. Syn.* I p. 373. *Röhl. germ.* II p. 226.
Schult. aust. I p. 552.

Polygonat. latifolium vulgare. *Zannichel. Ven.* p. 215.
 t. 34.

Polyg. vulgo Sigillum Salomonis. *Bauhin. Hist.* III
 p. 529 cum icone.

Polyg. latifolium, flore albo major. *Barr. ic. t.* 711.
 fig. 1.

Poligonato. *Matth.* p. 1005 cum icone.

*Nasce in Campalto nei luoghi ombrosi; fiorisce nei
 mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.*

HYACINTHUS. (Hyacinthe) Giacinto.

*Cor. campaniforme ovvero subrotonda 6-fida ovvero
 6-partita, con lacinie eguali. Germie con tre po-
 ri sulla sommità.*

1. *H. comosus.* (Schopfbüthige H.) G. comoso.

Fiori angolato-cilindrici, quelli della sommità steri-
 li, lungamente peduncolati, dritti. *Pers. Syn.* I
 p. 375. *Röhl. germ.* II p. 226.

Muscari comosum. *Schult. aust.* I p. 553.

Musc. arvense latifolium. *Zann. Ven.* p. 187. t. 100.

Hyacinth. maximus botryoides coma caerulea. *Bauh.
 Hist.* II p. 574.

*Nasce a S. Niccolò di Lido nei luoghi erbosi; fio-
 risce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta
 perenne.*

2. *H. racemosus.* (Trauben H.) G. racemoso.

Fiori ovati uniformi conferti, quelli della sommità

sessili sterili, foglie deboli pendenti lineari. *Persoon. Syn. I p. 375. Röhl. l. c. p. 227.*

Muscari racemosum. Schult. l. c. p. 554.

Musc. arvense juncifolium. Zann. Ven. p. 188. t. 93.

Hyacinth. vernus botryoides minor caeruleus. Bauh.

Hist. II p. 571. cum icone.

Nasce come la precedente.

HEMEROCALLIS. (Tagblume) Emerocallide.

Cor. campaniforme, tubo cilindrico. *Stam.* declinati. *Stim.* piccolo, semplice, un poco villosa.

H. fulva. (Rothgelbe T.) E. rossastra.

Foglie lineari carenate, i tre petali interni ottusi undulati, i nervi dei petali esterni ramosi. *Pers. Syn. I p. 382.*

Lilium radice Asphodeli phoeniceum sive Lirioasphodelus quibusdam. Bauhin. Hist. II p. 701 cum icone.

Nasce in alcuni Fossi intorno Mestre; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

ACORUS. (Kalmus) Calamo.

Spadice cilindrico coperto da fioretti. *Corol.* di sei petali nuda. *Stilo* o. *Cass.* di tre cavità.

A. Calamus. (Gemeiner K.) C. comune.

Scapo con un mucrone lunghissimo foliaceo. *Pers. Syn. I p. 382. Röhl. germ. II p. 252. Schultes aust. I p. 565.*

Calamus aromaticus. Bauh. Hist. II p. 734 cum icone.

Nasce in Campalto e intorno Mestre; fiorisce nel mese di Giugno, ed è pianta perenne (nei Fossi).

JUNCUS. (Simse) Giunco.

Cal. di sei foglie persistenti. *Cor.* o. *Stimmi* 3.

Cass. di una sola cavità e di tre valve. *Semi* molti.

1. *J. acutus.* (Spitze) G. acuto.

Culmo nudo terete mucronato, pannochia terminale, invoglio di due foglie pungenti, casselle subrottonde mucronate. *Persoon. Syn.* I p. 373. *Röhl. germ.* II p. 233.

J. acutus capitulis sorghi. *Zann. Ven.* p. 150.

J. pungens seu Juncus acutus capitulis Sorghi. *Bauh. Hist.* II p. 520.

J. maritimus sorghi panicula utriculata. *Barr. ic. tab.* 203. *fig.* 2.

Nasce comunemente nei luoghi arenosi, umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *J. maritimus.* (Meerstrands S.) G. marino.

Culmo nudo terete, pannochia terminale prolifera invoglio di due foglie, spinoso eretto, casselle bislunghe. *Pers. l. c.*

Nasce comunemente nei luoghi umidi intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

3. *J. effusus.* (Flatter S.) G. effuso.

Culmo nudo drittissimo, pannochia laterale, fiori bislungi, cassella ottusa. *L. Pers. Syn. loc. cit. Röhl l. c. p. 232. Schult. aust. I p. 375.*

J. panicula arundinacea. Bauhin. Histor. II p. 520 cum icone.

Nasce abbondevolmente in Campalto e Malghera nei Fossi e nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

Fusto foglioso.

4. *J. bulbosus.* (Knollige S.) *G. bulboso.*

Culmo quasi compresso indiviso, foglie lineari, scanalate, corimbo terminale, petali ottusi più corti della cassella subrotonda ottusa. *Pers. Synops I p. 385. Röhl. germ. p. 234. Schult. l. c. p. 569.*

J. parvus cum pericarpis rotundis. Bauh. Hist. III p. 520 cum icone.

J. repens apocarpus minor botrioides. Barr. ic. t. 114. fig. 1.

Nasce intorno Malghera nei Prati umidi ed acquisi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

5. *J. pilosus.* (Haarige S.) *G. peloso.*

Foglie piane pelose, corimbo quasi semplice, peduncoli con un solo fiore nutanti, petali ovati acuti più corti della cassella. *Pers. Syn. I p. 385. Röhl. l. c. p. 234.*

Luzula pilosa. Schult. l. c. p. 570.

Gramen rore lucidum nemorense s Luzulae. Bauh. Hist. II p. 492.

Nasce nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nella Primavera, ed è perenne.

BERBERIS. (Sauerdorn) Berbero.

Cal. di sei foglie. *Petali* sei, dei quali ciascuno con due *glandole* alla base dell' unghia. *Stilo* o. *Bacca* di una sola cavità e con due semi.

B. vulgaris. (Gemeine S.) B. comune.

Grappoli semplici pendenti, foglie ovate a rovescio ciliate. *Lin. Pers. Syn.* I p. 387. *Röhl. germ.* I p. 222. *Schult. aust.* I p. 539.

B. dumetorum. *Zann. Ven.* p. 35. t. 18.

B. vulgo quae et. Oxiantha putata. *Bauh. Hist.* I p. 52.

Crespino. *Matth.* p. 183 cum icone.

Nasce nel Cavallino e Cortelazzo nei luoghi arenosi e nelle Siepi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è fruticoso.

TRIGYNIA

RUMEX. (Ampfer) Romice.

Cal. di tre foglie. *Petali* tre ovati conniventi. *Seme* uno triangolare.

1. *R. crispus.* (Krauser A.) R. crespo.

Valve intere tutte con grano, foglie lanceolate ondate acute. *Pers. Syn.* I p. 394. *Röhl. germ.* II p. 239. *Schult. aust.* I p. 577. *Savi Mat. med.* t. 59.

Lapathum acutum crispum. Bauh. Hist. II p. 988
sine icone.

Nasce nei luoghi umidi e negli Orti; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

2. *R. acutus.* (Spitzblättriger A.) *R. acuto.*

Valve dentate tutte con grano, foglie cordato-bislunghe acuminatae, grappoli foliosi. *Pers. l. c. p. 395.*

Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 578. Savi l. c. t. 44.

Lapathum folio acuto plano. Zannichel. Ven. p. 159.

Lapath. acutum sive Oxilapathum. Bauh. Hist. II p. 988 cum icone.

Nasce comunemente negli Orti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

TRIGLOCHIN. (Dreizack) Triglochide.

Cal. di tre foglie. *Petali* tre caliciformi. *Stilo* o

Cass. che si apre alla base.

T. palustre. (Sumpf D) *T. paludoso.*

Casselle di tre cavità lisce assottigliate alla base.

Pers. Syn. I p. 397. Röhl. germ. II p. 238. Schult. aust. I p. 575.

Juncago palustris. Zann. Ven. p. 149. t. 273. f. 2.

Nasce abbondevolmente nei luoghi umidi non lungi da Cortelazzo; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

POLYGYNIA

ALISMA: (Froschlöffel) Alismo.

Cal. di tre foglie. *Petali* tre. *Cass.* molte, delle quali ciascuna con un seme.

A. Plantago. (Gemeiner F.) A. comune.

Foglie ovate acute, frutti ottusamente trigoni. *Pers. Syn.* I p. 400. *Röhl. german.* II p. 240. *Schult. aust.* I p. 585.

Plantago aquatica. *Bauch. Hist.* III p. 787 cum iconone. *Dalech. Hist.* p. 1057 cum iconone.

Piantaggine acquatica. *Matth.* p. 510.

Nasce comunemente intorno Malghera nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è perenne.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

OENOTHERA. (Nachtkerze) Enotera.

Cal. tubuloso 4-do con lacinie richinate e caduche
Petali 4 inserti nel calice. *Stim.* 4-fido. *Cass.* di 4 cavità e con 4 valve.

O. biennis. (Gemeine N.) E. comune.

Foglie ovato-lanceolate piane, fusto muricato peloso, casselle prolungate sessili. *Persoon. Synopsis.* I

p. 407. *Röhl. german. II p. 244. Schult. aust. I p. 597.*

Onagra latifolia. Zann. Ven. p. 194. t. 112.

Nasce comunemente nel Cavallino e Cortelazzo nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta bienne.

EPILOBIUM. (Weidenrösslein) Epilobio.

Cal. 4-fido tubuloso. Petali 4. Cass. inferiore bislunga. Semi comosi.

1. *E. rosmarinifolium. Haenk. (Rosmarinblättriges W.)*

E. a foglie di Ramerino.

Fusto ramosissimo, foglie sparse sottili lineari senza vene, peduncoli unibratteati. Pers. Syn. I p. 409 sub E. angustifolium.

E. angustissimum. Röhl. germ. II p. 245. Schult. aust. I p. 593.

Nasce nel luogo detto Forte degli Alberoni appresso l'acqua; fiorisce nei mesi di Luglio sino Settembre, ed è perenne.

2. *E. pubescens. (Weichhaariger W.) E. pubescente.*

Foglie (di mezzo) opposte lanceolate quasi picciolate pubescenti, fusto villosissimo semplicissimo. Pers. Syn. I p. 410. Röhl. germ. II p. 245. Schult. l. c. p. 594.

Chamaenerion villosum. Zann. Ven. p. 60.

Lysimachia siliquosa hirsuta flore minor. Bauhin.

Hist. II p. 906 cum icone.

Nasce intorno gli Alberoni nei luoghi umidi ed

acquosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è perenne.

3. *E. tetragonum*. (Vierekiges W.) *E. tetragono*.

Foglie lanceolate dentellate, le inferiori opposte, fusto ramoso, stimma semplice. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p. 246. Schult. aust. p. 595.*

Nasce nei terreni di S. Marta; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

CHLORA. (Bitterling) Clora.

Cal. di 8-10 foglie. *Cor.* monopetala 8-fida. *Cass.* di una sola cavità con due valve e molti semi.

C. perfoliata, (Durchwachsenes B.) *C. perfogliata*.

Foglie perfogliate. *Pers. Syn. I p. 418. Röhl. germ.*

II p. 244. Schult. aust. I p. 597.

Centaurium luteum perfoliatum. Zann. Ven. p. 56. t. 20. f. 1.

Perfoliata Centaurium luteum. Bauh. Hist. III p. 355 cum icone.

β *Centaur. pusillum luteum. Bauh. Pin.*

Nasce intorno Malghera nei luoghi montuosi ed erbosi; β nei Treporti nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

ERICA. (Heide) Erica.

Cal. di quattro foglie persistenti. *Cor.* 4-fida persistente. *Antere* bifide. *Cass.* di 4-8 cavità.

E. herbacea. (Krautartige H.) *E. erbacea*.

Antere senza resta scoprite, fiori bislungli, stilo scoperto, foglie quaterne, fiori laterali. *Persoon. Syn.* I p. 423. *Schult. aust.* I p. 600.

E. procumbens herbacea. *Zann. Ven.* p. 94. t. 64.

E. parva foliis corios quaternis. *Bauhin. Histor.* I p. 358.

E. procumbens herbacea ternis foliis carnea. *Zann. Ven.* p. 94. t. 132.

E. parva pannonica foliis corios ternis. *Bauh. Hist.* I p. 358.

Nasce abbondevolmente nei Treporti e nel Cavallino; fiorisce nella Primavera e nell'Autunno, ed è fruticosa.

TRIGYNIA

POLYGONUM. (Knöterich) Poligono.

Calice o. Cor. 5-partita. *Sem.* 1 angolato, e coperto dalla corolla.

1. *P. aviculare.* (Vogel K.) *P. avicolare:*

Fusto giacente erbaceo. *Fiori* ottandri trigini ascellari. *Foglie* lanceolate scabre nel margine. *Nervi* delle stipole remoti. *Persoon. Syn.* I p. 439. *Röhl. germ.* II p. 249. *Schult. aust.* I p. 612.

P. latifolium. *Zann. Ven.* p. 216. t. 201.

P. sive centinodia. *Bauh. Hist.* III p. 374.

Nasce comunemente fra' Sassi e negli Orti; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

2. *P. Persicaria*. (Gemeiner K.) P. comune.

Fiori essandri digini, spighe ovato-bislunghe, foglie lanceolate, peduncoli lisci, stipole ciliate. *Pers. Syn.* I p. 440. *Röhl. loc. cit.* p. 249 *Schult. loc. cit.* p. 610.

P. mitis maculosa. *Zann. Ven.* p. 208. t. 133.

Pers. mitis. *Bauh. Hist.* p. 779 cum icone.

β floribus albis. *Röhl. l. c.*

Nasce comunemente intorno Malghera nelle Strade e nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

3. *P. amphibium*. β (Wechsel K.) P. amphibio.

Fusto irsuto, foglie irsute quasi sessili, spiga bislunga, stami più lunghi della corolla. *Pers. Syn.* I p. 440. *Röhl. l. c.* p. 248. *Schult. l. c.* p. 609.

Nasce in Campalto e Malghera nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

Fiori pentandri semidigini.

4. *P. Hydripiper*. (Wasserpfeffer K.) P. acquatico.

Fiori essandri semidigini, foglie lanceolate ondate, spighe filiformi nutanti, fusto dritto, stipole quasi mutiche. *Pers. Syn.* I p. 440. *Röhl. loc. cit.* *Schult. aust.* p. 611.

Persicaria urens sive Hydripiper. *Zann. Ven.* p. 209.

Pers. acris. *Bauh. Hist.* III p. 780 cum icone.

Nasce nei Fossi intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

5. *P. Convolvulus*. (Windenartiger K.) P. in forma di villuchio.

Foglie cordato-astate, fusto volubile angolato, fiori ottusati. *Pers. Syn.* I p. 441. *Röhl. l. c. p.* 249. *Schult. l. c. p.* 613.

Fagopyrum vulgare scandens. *Zann. Ven. p.* 99 t. 146.

Helxine semine triangulo. *Bauh. Histor.* II p. 157 cum icone.

Nasce comunemente negli Orti e nei Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Luglio sino Settembre, ed è pianta annuale.

ENNEANDRIA

HEXAGYNIA.

BUTOMUS. (Wasserviole) Butomo.

Cal. o. Petali 6. Cass. 6 polisperme.

B. umbellatus. (Doldenblüthige W.) B. ombrellato.

Pers. Syn. I p. 451. *Röhl. germ.* II p. 251. *Schult. aust.* I p. 622.

B. flore roseo. *Zann. Ven. p.* 283. t. 309.

Juncus floridus. *Bauh. Hist.* II p. 524. *Dalechamp:*

Hist. p. 989 cum icone.

Giucco florido. *Matth. p.* 1091 icone.

Nasce comunemente intorno Malghera nei Fossi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

DECANDRIA

MONOGYNIA:

TRIBULUS. (Burzeldorn) Tribolo.

Calice 5-partito. *Petali* 5 patenti. *Stilo* o. *Cass.* 5, gobbe, spinose, e con molti semi.

T. terrestris. (Gemeiner B.) T. comune.

Foglie 6-gioghe quasi eguali, semi con 4 corna.

Pers. Syn. I p. 462. *Röhl. germ.* II p. 252. *Schult. aust.* I p. 629.

T. terrestris. *Zann. Ven.* p. 263. t. 222. *Bauhin:*

Hist. II p. 352 cum icone. *Barr. ic. t.* 558.

Tribolo terrestre. *Matth.* p. 1026 cum icone.

Nasce non lungi da Malamocco nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è annuale.

DIGYNIA

SAXIFRAGA: (Steinbrech) Sassifragia.

Cal. 5-partito. *Cor.* di cinque petali. *Cass.* 2-rostrata di una sola cavità, e con molti semi.

S. tridactylites. (Dreitheliger S.) S. tripartito.

Foglie del fusto trifide, alterne, fusto dritto ramoso. *Pers. Syn.* I p. 490. *Röhl. germ.* II p. 257. *Schult. aust.* I p. 648.

S. verna annua. *Zann. Ven. p. 235. t. 226.*

Tridactylites tectorum flore albo. *Bauh. Histor. III p. 762.*

Nasce comunemente nei luoghi arenosi, secchi e fra Sassi; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta annuale.

GYPSOPHILA. (Gypskraut) Gipsosila.

Calice monofillo campaniforme, angolato. *Petali* cinque ovati sessili. *Cass. globosa*, di una sola cavità e con molti semi.

G. Saxifraga. (Steinbrechartiges G.) *G. sassifraga.* Foglie lineari, calici angolati con quattro squame alla base, petali smarginati. *Pers. Syn. I p. 493.*

Röhl. germ. II p. 259. Schult. aust. I p. 652.

Caryophyllus minimus muralis. *Zann. Ven. p. 53. t. 70.*

Betonica coronaria s. *Tunica minima.* *Bauh. Hist. III p. 337 cum icone.*

Lychnis pumila caryophyllata flore rubello, italis haemorrhoidalis aldrovando. *Barr. ic. t. 998.*

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

SAPONARIA. (Seifenkraut) Saponaria.

Calice tubuloso monofillo nudo. *Petali* cinque unguiculati. *Cass. bislunga* di una sola cavità.

S. officinalis. (Gemeines S.) *S. comune.*

Calici cilindrici , foglie ovato-lanceolate. *Pers. Syn.*

I p. 492. Röhl. german. II p. 259. Schult. aust. p. 652.

Lychnis sylvestris quae Saponaria vulgo. Zannichel. Ven. p. 172. t. 285.

Saponaria vulgaris. Bauh. Hist. p. 346 cum icone. Sapon. major. Dalech. Hist. I p. 822.

Nasce intorno S. Erasmo nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Luglio sino Settembre, ed è pianta perenne .

TRIGYNIA

CUCUBALUS. (Taubenkropf) Cucubalo .

Cal. gonfio , ovvero campaniforme. Petali cinque nudi o coronati alla fauce. Cass. di tre cavità.

C. Behen. (Aufgeblasener T. C.) gonfio .

Fusto dicotomo , foglie ovate , calici quasi globosi reticolato-venosi , corolle quasi nude. Pers. Syn. I p. 495. Röhl. german. II p. 262. Schult. aust. I p. 674.

Lychnis sylvestris quae Behen album vulgo. Zann. Ven. p. 173. t. 117.

Behen album officinarum . Bauh. Hist. III p. 356 cum icone .

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi ; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne .

SILENE. (Leimkraut) Silene.

Calice bislungo terete, cilindrico, ovvero conico.

Petali cinque unguiculati nudi, o coronati alla fauce. *Cassella* di tre cavità.

1. *S. Otites*. (Ohrhöffel L.) *S. dioica*.

Petali lineari indivisi ondati, glabri, fiori verticillato-capitati dioici, peduncoli glabri, fusto nudo.

Pers. l. c. p. 497.

Cucubalus otites. *Röhl. germ. Schult. aust. I p. 677.*

Lychuis viscosa, flore muscoso. *Zann. Ven. p. 174. t. 145.*

Muscipula muscoso flore. *Bauh. Hist. III p. 350. cum icone.*

Muscip. aitera, flore muscoso *Penae*. *Dalech. Hist. p. 674 cum icone.*

Nasce nel Cavallino nei Colli arenosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *S. sericea*. (Seidenartiges L.) *S. sericea*.

Fiori terminali quasi solitarii pedunculati, fusto ramoso alla base, foglie lineari-lanceolate sericee.

Pers. Syn. I p. 500.

Lychnis marina hirsuta purpurea, leucosi folio.

Zann. Ven. p. 164. t. 65. Barr. rar. ic. t. 1010.?

Nasce comunemente nel Lido nei tuoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

STELLARIA. (Sternmiere) *Stellaria*.

Calice di cinque foglie patenti. *Petali* cinque bi-

partiti. *Cassella* ovata, di una sola cavità e con molti semi, 6-dentata nella cima.

1. *S. aquatica*. (Wasser S.) *S. aquatica*.

Fusto giacente, foglie cuoriformi, fiori solitarii 4-5-gini, frutti pendenti. *Pers. Syn.* I p. 500.

Cerastium aquaticum. *L. Röhl. german.* II p. 274.
Schult. aust. I p. 695.

Nasce in Campalto e Chioggia nei luoghi ombrosi, ed umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *S. nemorum*. (Walde S.) *S. selvetica*.

Foglie cuoriformi picciolate, pannocchia dicotoma.

Linn. p. Spl. Gmel. Syst. nat. tom. II p. 717.

Persoon. Syn. I p. 500. *Röhl. germ.* II p. 265.

Schult. aust. Flora Lithuan.

Alsine altissima nemorum. *Zann. Ven.*

Alsine major repens perennis. *Bauh. Hist. tom.* III p. 362 cum icone.

Nasce in Campalto ed intorno Malghera nei luoghi ombrosi ed erbosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

Fusto fistuloso un poco terete ed un poco peloso.

Foglie succose fragili, un poco pelose. Pannocchia allargata. Petali patentissimi, bipartiti sino alla base. Peduncoli finalmente recurvati. *Cassella ovale.*

ARENARIA. (Sandkraut) *Arenaria*.

Calice di cinque foglie patenti. *Petali* cinque in-

tieri . *Cass.* di una sola cavità , e con molti semi .

1. *A. serpyllifolia* . (*Quendelblättriges S.*) a foglie di serpillio .

Foglie quasi ovate acute , sessili , liscie , corolla più corta del calice . *Pers. Syn.* I p. 502. *Röhl. germ.* II p. 267. *Schult. aust.* I p. 664.

Alsine minor multicaulis. *Zann. Ven.* p. 10.

Alsine minima. *Bauh. Hist.* III p. 364 cum icone .
Saponar. officinal.

Nasce comunemente nei luoghi asciutti ; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno , ed è pianta annuale .

2. *A. media* . (*Mittleres S.*) *A. mezzana* .

Fusti giacenti , foglie semicilindriche carnose eguali agl' internodj , semi compressi alati nel margine .
Pers. Syn. I p. 504. *Röhl. l. c.* p. 268.

Nasce comunemente nel luogo detto Monte dell' Oro nei luoghi bagnati dall' acqua salsa ; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno , ed è pianta annuale .

3. *A. rubra* . (*Rothes S.*) *A. rossa* .

Fusti prostrati , foglie lineari acute , stipole scariose abbraccianti il fusto , semi compressi angolati .
Pers. Syn. I p. 504. *Röhl. l. c.* *Schult. aust.* p. 665.

Alsine maritima flore rubente. *Zann. Ven.* p. 9.

Nasce nei luoghi arenosi ed asciutti ; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto , ed è pianta annuale .

4. *A. marina* . (*Strand S.*) *A. marina* .

Foglie semitereti carnose ottuse, stipole scariose abbraccianti il fusto, semi compressi, alati nel margine. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 665.*

Nasce comunemente nei luoghi umidi e salsi, specialmente intorno Malghera e Malamocco; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è annuale.

PENTAGYNIA

SEDUM. (Hauslaub) Sedo.

Calice 5-fido. Cor. di cinque petali, cinque squame nettarifere alla base del Germe. Cass. 5.

S. acre. (Scharfes H.) S. dei campi.

Foglie alterne quasi ovate accresciuto-sessili, gobbe erette, cima trifida. *Pers. Syn. I p. 412. Röhl. germ. II p. 271. Schult. aust. I p. 638.*

S. parvum acre flore luteo. Zann. Ven. p. 244. I. Bauh. Hist. III p. 694 cum icone.

Nasce comunemente non lungi da Campalto nei luoghi montuosi sterili; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

OXALIS. (Sauerklee) Ossalide.

Calice di cinque foglie. Petali connessi per le unghie. Stami alternamente più corti. Cass. 5-gona che apresi con elasticità negli angoli. Semi quasi arillati.

O. corniculata. (Gehörnter S.) O. cornicolata.

Fusto ramoso , cadente , radicante , peduncolo quasi ombrellato , foglioline cordate a rovescio , petali smarginati erosi. *Pers. Syn. p. 518. Röhl. germ. II p. 275. Schult. aust. p. 700.*

Oxis lutea. Bauh. Hist. II p. 388.

Nasce comunemente negli Orti nei luoghi ombrosi; fiorisce nei mesi di Aprile sino Settembre, ed è perenne.

2. *O. stricta. (Steifer S.) O. drittissima.*

Fusto dritto ramoso , peduncolo quasi ombrellato , foglioline cordate a rovescio , corolle ottuse. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 699.*

Nasce come la precedente.

GITHAGO. (Kornrade) Gitagine.

Calice coriaceo, di cinque foglie nella cima. Corolla con fauce nuda, di cinque petali unguiculati. Lembo ottuso indiviso. Cassella di una sola cavità.

G. segetum. Desf. (Gemeine K.) G. comune.

Irsuta , calici quasi eguali alla corolla. *Agrostemma Githago. L. Pers. Syn. I p. 519. Röhl. germ. II p. 274. Schult. aust. I p. 697.*

Lychnis segetum major. Zann. Ven. p. 176. t. 281.

Pseudo-melanthium. Bauhin. Hist. III p. 341 cum icone. Dalech. Hist. p. 438.

Pseudo-melanthio. Matth. p. 843 cum icone.

Nasce fra le Biade in Campalto e S. Marta; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

LYCHNIS. (Lichtnelke) Licnide.

Calice monofillo bislungo, liscio. *Petali* cinque unguiculati, col lembo bifido. *Cassella* 1-5 loculare.

1. *L. Flos cuculi.* (Gukuks L.) L. dei cucoli.

Petali laciniati, *cassella* di una sola cavità, subrotonda. *Pers. Syn.* I p. 520. *Schult. aust.* I p. 697. *Melandrium.* Röhl. germ. I p. 275.

Flos cuculi odontis quibusdam. Bauh. Hist. III p. 347. *Nasce comunemente intorno Malghera nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.*

2. *L. vespertina.* (Nacht L.) L. notturna.

Dioica, fusto e foglie villose glauche, molli, stilo un poco villosa, *cassella* ovata a rovescio, 10-valve nell'apice, denti dritti. *Schult. aust.* I p. 699.

Lychnis dioica. L. *Pers. l. c.*

Melandrium pratense. Röhl. l. c. p. 274.

Lychn. sylvestris alba simplex. Zann. Ven. p. 173. z. 282.

Ocymoides album multis. Bauh. Hist. III p. 342 cum icone.

Ocym. majus Matthioli. Dalech. Hist. p. 682 icon.

Ocimoide. Matth. p. 1051 icon.

Nasce comunemente negli Orti e nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Aprile sino Settembre, ed è perenne.

CERASTIUM. (Hornkraut) Cerastio.

Calice di cinque foglie. *Petali* bifidi o smarginati,

interi. *Cassella* di una sola cavità, che apresi nella cima.

C. ovale. (Gemeinstes H.) *C. ovale*.

Quasi viscoso-irsuto, fusto ramosissimo alla base, foglie elitiche, fiori glomerati. *Pers. Syn.* I p. 521.

C. vulgatum. *Röhl. germ.* II p. 272.

C. viscosum: *Schult. aust.* I p. 692.

Auricula muris quorundam. *Bauh. Hist.* III p. 359 cum icone.

Nasce comunemente negli Orti; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

DECAGYNIA

PHYTOLACCA. (Kermesbeere) Fitolachia.

Calice o. Petali cinque. Bacca superiore di dieci cavità, e con dieci semi.

P. decandra. (Gemeine K.) *F. comune.*

Fiori decandri decagini. *Pers. Syn.* I p. 523. *Schult. aust.* I p. 700.

Nasce intorno Fusina e S. Marta; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

DODECANDRIA

MONOGYNIA.

PORTULACA. (Portulack) Procachia.

Calice 2-fido. *Corolla* di cinque petali. *Cassella* di una sola cavità coperchiata. *Ricett.* 5 filiformi.

P. oleracea. (Gemeiner P.) P. volgare.

Foglie cuneiformi, fiori sessili. *Pers. Syn.* II p. 6. *Röhl. germ.* II p. 276. *Schult. aust.* I p. 4.

P. angustifolia sive *sylvestris*. *Zann. Ven.* p. 218. t. 252.

P. sylvestris minor. *Bauh. Hist.* p. 678.

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

LYTHRUM. (Weiderich) Litro.

Calice 6-12-dentato. *Petali* 5-6 attaccati al calice. *Cassella* coperta dal calice di due cavità, e con molti semi.

1. *L. Salicaria*. (Gemeiner W.) L. comune.

Foglie opposte cordato-lanceolate, fiori in spiga, dodecandri. *Pers. Syn.* II p. 7. *Röhl. germ.* II p. 276. *Schult. aust.* II p. 5. *Savi mat. med.* t. 29.

Salicaria vulgaris. *Zann. Ven.* p. 231. t. 58.

Lysimachia purpurea, quibusdam *spicata*. *Bauhin. Hist.* II p. 904 icone mala.

Lysim. altera Matthioli. *Dalech. Hist.* p. 1059 icon.

Un'altra *Lisimachia*. *Matth.* p. 1026 cum icon.

Nasce comunemente intorno Malghera nei Fossi e luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

2. *L. Hyssopifolium.* (Isopblättriger W.) L. a foglie d'issopo.

Foglie alterne lineari-lanceolate, fiori essandri. *Pers.*

l. c. p. 8. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 6.

Nasce intorno Malghera nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è annuale.

DIGYNIA

AGRIMONIA. (Odermennig) Agrimonia.

Calice 5-dentato, e calicolato da due piccole brattee. Petali cinque. Semi 1-2 chiusi nel calice.

A. Eupatoria. (Gemeiner O.) *A. Eupatoria.*

Foglie del fusto interrottamente pennate, frutti spinosi. *Pers. Syn.* II p. 9. *Röhl. germ.* II p. 277. *Schult. aust.* II p. 7.

A. officinarum. *Zann. Ven.* p. 5. t. 234.

A. s. Eupatorium. *Bauh. Hist.* III p. 398 icon.

Nasce non lungi da Malamocco nei luoghi ombrosi ed arenosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

TRIGYNIA

RESEDA. (Wau) Amorino.

Calice monofillo 4-6 partito. *Petali* laciniati. *Cassella* di una sola cavità, che apresi nella cima. *Semi* reniformi.

1. *R. alba*. (Weisser W.) A. bianco.

Foglie pennate, fiori 4-gini, calice 6-partito. *Pers. Syn.* II p. 10. *Röhl. germ.* II p. 277.

Nasce intorno S. Marta nei Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

2. *R. lutea*. (Gelber W.) A. giallo.

Foglie inferiori pennate, le superiori pennatofesse e trifide, lacinie lineari ondate, calice 6-fido. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. aust.* II p. 9.

R. lutea. Bauh. Hist. III p. 467 icon.

Nasce come la precedente.

EUPHORBIA. (Wolfsmilch) Euforbia:

Calice monofillo ventricoso. *Corolla* di 4-5 petali, attaccata sul calice. *Cassella* tricoeca.

1. *E. Chamaesice*. (Nidrige W.) E. bassa:

Dicotoma, foglie subrotonde un poco intaccate, glabre, fiori solitarii ascellari, fusti giacenti. *Pers. Syn.* II p. 14. *Röhl. german.* II p. 278. *Schultes aust.* II p. 10.

Tithymalus exiguus. Zann. Ven. p. 261.

Chamaesice. *Bauh. Hist.* III p. 667.

Nasce negli Orti nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

2. *E. Peplis.* (Strands W.) E. Peplide.

Dicotoma, foglie interissime semicuoriformi, fiori solitarii ascellari, fusti giacenti. *Pers. l. c. Röhl. l. c.*

Tithymalus maritimus. Zann. Ven. p. 260. t. 68.

Peplis. Bauh. Hist. III p. 668 sine icone.

Peplio. Matth. p. 1322 icone:

Nasce nel Lido, Malamocco e Chioggia nei luoghi arenosi appresso il mare; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

3. *E. Peplus.* (Garten W.) S. degli Orti.

Ombrella trifida, dicotoma, invoglietti ovati, foglie interissime, ovate a rovescio, picciolate. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. aust. II p. 10.*

Peplos sive Esula rotunda. Bauh. Hist. III p. 669 cum icone.

Nasce comunemente negli Orti, fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

4. *E. Paralias.* (Dickblättrige W.) E. marina.

Ombrella quasi 5-fida, 2-fida, invoglietti cordato-reniformi, foglie lineari imbricate verso l'alto.

Pers. l. c. Röhl. l. c. Savi Bot. Etrusc. p. 144.

Tithymalus paralias maritimus. Zann. Ven. p. 259. t. 40.

Tithym. Paralias. Bauh. Hist. III p. 674.

Tithimalo Paralio. Matth. p. 1313 icone.

Nasce comunemente nel Lido e Malamocco appresso il mare; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

5. *E. Helioscopia*. (Sonnenwendige W.) *E. elioscopia*.
 Ombrella 5-fida, bifida dicotoma, invoglietti ovati a rovescio, foglie cuneiformi, seghettate, glabre, cassette lisce. *Pers. l. c. p. 17. Röhl. l. c. p. 279. Schult. aust. II p. 16.*
Tithymalus Helioscopius. Bauhin. Histor. III p. 669
 icone.
Tithimalo helioscopio. Matth. p. 1314.
Nasce in Campalto e Sant' Erasmo nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Aprile sino Agosto, ed è pianta annuale.
6. *E. platyphyllos*. (Flachblättrige W.) *E. a foglie piane.*
 Ombrella 5-fida, 3-fida dicotoma, invogli pelosi nella carena, foglie seghettate lanceolate, cassette verrucose. *Pers. Syn. II p. 18. Röhl. l. c. p. 280. Schult. aust. l. c. p. 18.*
Tithymalus platyphyllos. Bauhin. Hist. III p. 670
 cum icone.
Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Luglio sino Settembre, ed è pianta annuale.
7. *E. Cyparissias*. (Cypressen W.) *E. cipressiforme.*
 Ombrelle moltifide, dicotome, invoglietti quasi cordati, rami sterili, foglie setacee, quelle del fusto

lanceolate. *Pers. Syn.* II p. 18. *Röhl. germ. l. c.*
p. 281. *Schult. l. c. p.* 20.

Tithymalus cyparissias. *Bauh. Hist.* III p. 663 icon.

Tithimalo cyparissio. *Matth. p.* 1315 icon.

Nasce comunemente intorno Campalto e Malghera nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

8. *E. palustris.* (Sumpf W.) E. dei paludi.

Ombrella multifida, ombrellette quasi trifide, bifide, invoglietti ovati, foglie lanceolate, rami sterili, casselle verrucose. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 21.

Tithymalus palustris fruticosus. *Zann. Ven. p.* 259
t. 217.

Tithym. magnus multicaulis. *Bauh. Hist.* III p. 671
absque icone.

Nasce abbondevolmente nei Fossi e appresso gli stessi in Campalto; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

PUNICA. (Granatbaum) Granato.

Calice superiore 5-fido. Petali cinque. Bacca [Pomo L] *di molte cavità, e con molti semi baccati.*

P. Granatum. (Gemeiner G.) G. comune.

Fusto arboreo, foglie lanceolate. *Pers. Syn.* II p. 33.

Röhl. germ. II p. 283.

Malus Punica. *Bauh. Hist.* I p. 76.

Melagrano. *Matth.* p. 246 icone.

Nasce comunemente intorno Sant'Erasino appresso il mare; fiorisce il mese di Luglio.

PRUNUS. (Pflaume) Pruno.

Calice inferiore 5-fido. Petali cinque. Drupa glabra, di cui il nocciuolo ha le suture prominenti.

1. *P. Mahaleb.* (Dintenkische) P. nero.

Fiori corimbose terminali, foglie cordato-ovate. *Pers. Syn.* II p. 34. *Röhl. germ.* II p. 285. *Schult. aust.* II p. 36.

Cerasus sylvestris amara. *Bauh. Hist.* I p. 227 icon.

Mahaleb Matthioli. *Dalech. Hist.* p. 154.

Mahaleb. *Matth.* p. 190 icon.

Nasce comunemente in Campalto; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è frutescente.

2. *P. spinosa.* (Dornige P.) P. spinoso.

Fruticosa, peduncoli solitarii, foglie ellittico-lanceolate, pagina inferiore pubescente, rami spinosi. *Pers. Syn.* II p. 35. *Röhl. germ.* *Schult. aust.*

P. Pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. *Lin. Sp. pl. Gmel. Syst. Nat. Gilib. Flora Lithuan.*

P. sylvestris. *Zann. Ven.* p. 219. *Bauh. Histor.* I p. 193. *Fuchs Hist.* p. 404.

Pruno salvatico. *Matth.* p. 286 cum icone.

Nasce in Campalto e intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta fruticosa.

DIGYNIA

CRATAEGUS. (Hagedorn) Ossiacanta.

Calice 5-fido. Petali cinque. Drupa inferiore con 2-5 semi. Semi ossei. Stili 1-5.

C. Oxiacantha. (Gemeiner H.) O. comune:

Foglie ottuse quasi trifide, seghettate, glabre, fiori digini, peduncoli e calici quasi glabri, segmenti del calice lanceolate acute. *Pers. Syn. II p. 38.*

Mespilus. Röhl. german. II p. 286. Schult. aust. II p. 59.

Oxiacantha vulgaris. Bauhin. Hist. I p. 44.

Oxiac. acuta spina Matthioli. Dalech. Hist. p. 136 icone.

Oxiacantha. Matth. p. 181 icone.

Nasce comunemente in Campalto; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta fruticosa.

PENTAGYNIA

MESPILUS. (Mispel) Nespolo.

Calice 5-fido con le lacinie per lo più foliacee e seghettate. Petali cinque. Drupa inferiore con cinque semi ossei.

M. germanica. (Gemeine M.) N. comune.

Inerme, foglie lanceolato-ovate inferiormente tomentose, fiori sessili solitarii. *Pers. Syn.* II p. 39.

Schult. aust. II p. 56. *Röhl. german.* II p. 286.

M. vulgaris. *Bauh. Hist.* I p. 59.

Nespolo secondo. *Matth.* p. 274 icone.

Nasce in Campalto nei luoghi ombrosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta fruticosa.

POLYGYNIA

ROSA: (Rose) Rosa:

Calice urceolato 5-fido, carnosio, ristretto al collo.

Petali cinque. *Semi* ispidi contenuti nel calice bacciforme.

R. canina. (Kund R.) *R. canina*.

Germi ovati glabri come i peduncoli, fusto e piccioli aculeati, foglie ovate glabre. *Pers. Syn.* II p. 50. *Schult. aust.* II p. 73. *Savi Mat. med.* t. 27.

R. sylvestris vulgaris. *Zann. Ven.* p. 226. t. 300.

R. sylvestris alba cum rubore, folio glabro. *Bauh. Hist.* II p. 43.

Nasce comunemente in Campalto nelle Siepi; fiorisce nei mesi di Maggio sino Luglio, ed è fruticosa.

RUBUS. (Brombeer) Rovo.

Calice 5-fido. *Petali* cinque. *Bacca* composta da acini monospermi

R. fruticosus. (Gemeine R.) R. comune.

Fusto fruticoso, foglie ternate o quinate, inferiormente bianco-tomentose, foglioline quasi picciolate, alcune quasi intagliate, fusto angolato, calice recurvato. *Pers. Syn.* II p. 51. *Röhl. germ.* II p. 297.

R. vulgaris. *Zann. Ven.* p. 128. t. 264.

R. major fructu nigro. *Bauh. Hist.* II p. 57 icone.

Rovo. *Matth.* p. 1063 icone.

Nasce comunemente in Campalto; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta frutescente.

FRAGARIA. (Erdbeere) Fragola.

Calice 10-fido. *Petali* cinque. *Ricett.* dei semi, ovato, baccato, caduco.

F. vesca. (Geniesbare E.) *F. domestica*.

Flagelli serpeggianti, calice del frutto richinato, pubescenza dei piccioli patentissima, quella dei peduncoli appoggiata. *Pers. Syn.* II p. 53. *Röhl. germ.* II p. 297. *Schult. aust.* II p. 82.

F. ferens fraga rubra. *Bauh. Hist.* II p. 394 icone.

Fragaria. *Matth.* p. 1075 icone.

Nasce nei luoghi montuosi in San Niccolò di Lido; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

POTENTILLA. (Fingerkraut) Potentilla.

Calice 10-fido. *Petali* cinque. *Semi* subrotondi nudi sopra un ricettacolo piccolo e secco.

1. *P. verna*. (Frühlings F.) *P.* di primavera.
 Foglie quinate, ovate a rovescio, dentate, pubescenti, petali cordati a rovescio maggiori del calice.
Pers. Syn. II p. 55. *Röhl. germ.* II p. 299. *Schult. aust.* II p. 88.
Quinquefolium minus repens lateum. *Zannich. Ven.* p. 221. t. 263.
Pentaphyllum parvum hirsutum. *Bauh. Histor.* II p. 398 icone.
Nasce in Campalto nei luoghi erbosi, asciutti; fiorisce nei mesi di Aprile sino Giugno, ed è pianta perenne.
2. *P. sylvestris*. (Wald F.) *P.* selvatica.
 Calice 8-fido, petali quattro, fusto ramoso, foglie sessili. *Neck. gallob.*
P. Tormentilla. *Savi Mat. med.* t. 29.
Tormentilla erecta. *L. Pers. l. c.* p. 56. *Röhl. germ.* II p. 297. *Schult. aust.* II p. 81.
Torment. sylvestris. *Zann. Ven.* p. 261. t. 87.
Tormentilla. *Bauh. Hist.* II p. 398 icone. *Matth.* p. 998 icone.
Nasce intorno Campalto e Malghera; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

CHELIDONIUM. (Schöllkraut) Chelidonia.

Calice di due foglie. *Corolla* di quattro petali. *Siliqua* lineare di una sola cavità. *Tramezzo* o. *Semi* crestati.

C. majus. (Grosses S.) C. maggiore.

Peduncoli disposti in ombrella. *Pers. Syn.* II p. 61.

Röhl. germ. II p. 302. *Schult. aust.* II p. 41.

C. majus vulgare. *Zann. Ven.* p. 61. t. 212.

Chelidonia. *Bauh. Hist.* III p. 482.

Chelidonia maggiore. *Matth.* p. 654.

Nasce comunemente nei Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Aprile sino Agosto, ed è pianta perenne.

GLAUCIUM. (Hornmohn) Glaucio.

Calice di due foglie. *Corolla* di quattro petali. *Siliqua* lineare di due cavità, e con due o tre valve. *Semi* puntati.

G. luteum. (Gelber H.) G. giallo.

Fusto glabro, foglie caulinari repande, siliqua tuberculata e un poco scabra. *Pers. Syn.* II p. 61.

Röhl. germ. II p. 302. *Schult. aust.* II p. 41.

G. flore luteo. *Zann. Ven.* p. 114. t. 166.

Papaver corniculatum luteum. *Bauh. Hist.* III p. 398. icone.

Papavero cornuto. *Matth.* p. 1116 icon.

Nasce intorno il Forte di Malamocco nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta annuale e biennale.

PAPAVERO. (Mohn) Papavero.

Calice di due foglie caduche. Corolla di quattro petali. Stigma persistente. Cassella di una sola cavità, che si apre per molti pori sotto la stigma.

1. *P. Rhoeas.* (Wilder M.) P. selvatico.

Casselle glabre quasi globose, fusto multifloro peloso, con peli patenti, foglie pennatofesse, intagliate. Pers. Syn. II p. 62. Röhl. germ. II p. 302. Schult. aust. II p. 39.

P. erraticum. Zann. Ven. p. 302. t. 261.

P. erraticum rubrum campestre. Bauhin. Hist. III p. 395 icon.

Papavero selvatico. Matth. p. 1112 icon.

Nasce negli Orti e intorno S. Marta; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

2. *P. somniferum.* (Garten M.) P. sonnifero:

Calice fusto e casselle glabre, foglie abbraccianti il fusto, incise glauche. Pers. Syn. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 40.

P. sativum. Bauh. Hist. III p. 390 icon.

Papavero domestico. Matth. p. 1113 icon.

Nasce nei Rovinazzi nei terreni di Santa Marta; il rimanente come nella precedente.

NYMPHAEA. (Seerose) Nimfea.

Calice di quattro o cinque foglie. *Corolla* di molti petali. *Stimma* raggiante sessile. *Bacca* di molte cavità e con molti semi.

1. *N. lutea*. (Gelbe S.) N. gialla.

Foglie cordato-ovate interissime, calice di cinque foglie maggiori dei petali. *Pers. Syn.* I p. 62. *Röhl. germ.* II p. 305. *Schult. aust.* III p. 45.

N. lutea. *Bauh. Hist.* II p. 771. *Dalechamp. Hist.* p. 1009 icon. *Matth.* p. 945 icon.

Nasce nei Fossi intorno Mestre; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *N. alba*. (Weisse S.) N. bianca.

Foglie cordato-orbicolate interissime, calice di quattro foglie. *Pers. Syn.* II p. 63. *Röhl. l. c. Schult. l. c.* p. 46.

N. alba. *Bauh. Hist.* III p. 770. *Dalechamp. Hist.* p. 1008.

N. alba. *Matth.* p. 944 icon.

Nasce comunemente in Campalto, Malghera e Mestre nei Fossi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

HELIANTHEMUM. (Sonnenröschen) Eliantemo.

Calice di cinque foglie, con le due foglie esterne minori. *Cassella* di una sola cavità, con tre valve.

1. *H. fumana*. (Heideblättriges S.) E. fumana.

Suffruticoso giacente, senza stipole, foglie alterne

lineari, scabre nel margine, peduncoli uniflori.
Pers. Syn. II p. 76. *Röhling german.* II p. 303.
Schult. aust. II p. 43.

H. tenuifolium glabro, luteo flore, per humum
 sparsum. *Zann. Ven.* p. 136. t. 116. *Bauh. Hist.*
 II p. 18.

*Nasce nel Lido, Chioggia e Treporti nei luoghi are-
 nosi e montuosi; fiorisce nei mesi di Giugno e
 Luglio.*

2. *H. vulgare.* (Gemeines S.) E. vulgare.

Suffruticosa giacente, stipole lanceolate, foglie bi-
 slunghe revolute quasi pelose, incane nella pagi-
 na inferiore. *Pers. l. c.* p. 79. *Röhl. l. c.* p. 304.
Schult. l. c. p. 44.

Cistus Helianthemum. *L. Sp. pl.*

Helianth. vulgare flore luteo. *Zann. Ven.* p. 135.
 t. 21. *Bauh. Hist.* II p. 15.

*Nasce comunemente nel Lido, Chioggia e Treporti
 ec. ec. nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di
 Maggio sino Settembre.*

TRIGYNIA

DELPHINIUM. (Rittesporn) Delfinio.

Calice 0. *Petali* cinque. *Nettario* bifido che termi-
 na posteriormente in un corno. *Siliqua* 1-3.

D. Consolida. (Feld R.) *D. campestre.*

Una sola cassella, nettario di un solo pezzo, fusto

quasi diviso. *Pers. Syn.* II p. 82. *Röhl germ.* II p. 307. *Schult. aust.* II p. 50.

Consolida regalis flore minore. *Bauhin. Histor.* III p. 210 icone.

Nasce in Campalto fra le Biade; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

PENTAGYNIA

HYPERICUM. (Hartheu) Iperico.

Calice 5-partito. Lacinie quasi ovate eguali. Petali cinque. Stami molti riuniti in 3-5 fascetti. Cassella di 3-5 cavità.

1. *H. perforatum.* (Gemeines H.) I. perforato.

Calice con foglie interissime lanceolate, fusto a due tagli, foglie ottuse con punti trasparenti. *Pers. Syn.* II p. 89. *Röhl. germ.* II p. 415.

H. vulgare. *Bauh. Hist.* III p. 381.

Nasce comunemente in San Niccolò di Lido nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *H. quadrangulare.* (Vierkantiges H.) I. quadrangolare.

Fusto erbaceo quadrangolare, foglie con punti trasparenti, foglioline del calice interissime lanceolate. *Pers. l.c. Röhl. l.c. p. 414. Schult. aust.* II p. 386.

H. asciron dictum caule quadrangulo, *Bauh. Hist.* III p. 382. icone.

Nasce nei luoghi acquosi in Cortelazzo ; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

POLYGYNIA

CLEMATIS. (Waldrebe) Clematide.

Calice o. Petali 4-5. Semi compressi terminati dal stilo persistente peloso.

1. *C. Fiticella.* (Blaue W.) *C. turchina*:

Foglie composte e ricomposte, foglioline ovali, quasi lobate, interissime, petali ovati a rovescio patenti. *Pers. Syn. p. 99. Röhl. germ. II p. 308.*

C. caerulea. *Zann. Ven. p. 69. t. 80.*

C. sive flammula flore caeruleo. *Bauhin. Histor. II p. 128 icone.*

Clematide seconda. *Matth. p. 1007.*

Nasce intorno Malghera e specialmente in Campalto appresso le Siepi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta frutescente.

2. *C. Vitalba.* (Gemeine W.) *C. comune*:

Foglie pennate, foglioline cuoriformi, con piccioli rampicanti. *Pers. Syn. II p. 100. Röhl. loc. cit. Schult. aust. II p. 95.*

C. sylvestris latifolia. *Zann. Ven. p. 69.*

C. latifolia integra. *Bauh. Hist. II p. 125 icone.*

Clematide terza. *Matth. p. 1008 icone.*

Nasce in Campalto nelle Siepi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta fruticosa.

3. *C. maritima*. (Straud W.) *C. marina*.

Fusto dritto, semplice, esagono, foglie pennate con foglioline lineari. *Pers. Syn. II p. 100.*

C. maritima. Zann. Ven. p. 68. t. 129.

Nasce comunemente nel Lido, Malinocco e Cavallino nei luoghi arenosi e nelle Siepi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

4. *C. erecta*. (Aufrechte W.) *C. erecta*.

Foglie pennate, con foglioline ovato-lanceolate, fusto dritto, corolla di 4-5 petali. *Pers. l.c. Röhl. l. c. p. 309. Schult. aust. II p. 95.*

C. s. flammula surrecta alba. Zannich. Ven. p. 69. t. 159. Bauh. Hist. II p. 127.

Flammola. Matth. p. 1009 icone.

Nasce nel luogo detto Aca bianca nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

THALICTRUM. (Wiesenraute) Talitro.

Calice 0. Petali 4-5. Filamenti lunghissimi. Semi striati, senza coda.

1. *T. angustifolium*. (Schmalblättrige W.) *T. angustifolium*.

Fusto solcato, foglie quasi bipennate lineari interissime, stipole aride, pannocchia ramosa. *Pers. Syn. II p. 101. Röhl. german. II p. 309. Schult. aust. II p. 98.*

T. pratense angustissimo folio. Zann. Ven. p. 258.

Nasce nei Prati e luoghi erbosi in Campalto e Mal-

ghera; *florisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.*

2. *T. flavum.* (Gelbe W.) T. giallo.

Fusto solcato, foglie bipennate, con foglione trilobe, pannocchia ramosissima conferta, fiori eretti.
Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.

T. majus siliqua angulosa seu striata. *Zann. Venet. p. 257. t. 311.*

T. nigrius caule et semine striato. *Bauh. Hist. III p. 486* icone.

Nasce nei Prati umidi in Malghera e Cortelazzo; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

RANUNCULUS. (Hahnenfuss) Ranuncolo.

Calice di cinque foglie. *Petali* cinque con unghie munite di una fossetta. *Semi* nudi.

1. *R. sceleratus.* (Giftiger H.) R. scellerato.

Foglie inferiori palmate, quelle della sommità ditate, frutti bislungi. *Pers. Syn. II p. 103. Röhl. germ. I p. 315. Schult. aust. II p. 114.*

Nasce intorno Malghera nei Fossi e nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

2. *R. bulbosus.* (Knolliger H.) R. bulboso.

Calice volto indietro, peduncoli solcati, fusto dritto multifloro, foglie ternate trifide, radice bulbosa. *Pers. Syn. II p. 104. Röhl. l. c. p. 315. Schult. l. c. p. 118.*

- R. pratensis, radice verticilli modo rotunda. *Zann. Ven. p. 224.*
- R. tuberosus major. *Bauh. Hist. III p. 417 icon.*
Nasce intorno Malghera nei Prati; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.
3. *R. repens.* (Kriechender H.) R. serpeggiante.
 Radice fascicolata, calici patenti pelosi, peduncoli solcati, polloni serpeggianti, foglie composte. *Pers. l. c. p. 105. Röhl. l. c. p. 316. Schult. l. c. p. 119.*
- R. pratensis repens hirsutus. *Zann. Ven. p. 224.*
- R. repens flore luteo simplici. *Bauh. Hist. III p. 419 icon.*
Nasce intorno Malghera nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.
4. *R. acris.* (Scharfer H.) R. aspro.
 Calici patenti, peduncoli tereti, peli appoggiati, foglie tripartite moltofesse, quelle della sommità lineari. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*
- R. pratensis erectus acris. *Zann. Ven. p. 223, t. 108 mal. ob. coroll. tetrapet.*
- R. rectus non repens, flore simplici luteo. *Bauhin. Hist. III p. 416 icone.*
Nasce comunemente in Campalto e Malghera; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

5. *R. heterophyllus*. (Verschiedenblättriger H.) *R. aquatico*.

Foglie sotto l'acqua capillari, quelle sopra l'acqua peltate. *Pers. l. c. p. 106*.

R. aquatilis. *Röhl. l. c. p. 318. Schult. l. c. p. 121*.

R. aquatilis albus tenuifolius. *Bauh. Hist. III p. 781 icon.*

R. aquaticus albus, lato et foeniculis folio. *Barr. ic. 565 bona.*

Nasce comunemente intorno Malghera nei Fossi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

CALTHA. (Dotterblume) Calta:

Calice o. Corolla di cinque petali. Nettario o. Molte casselle con molti semi.

C. palustris. (Sumpf D.) *C. paludosa*.

Fusto dritto, foglie cordato-reniformi. *Pers. Syn. II p. 107. Röhl. german. II p. 310. Schult. aust. II p. 103.*

C. palustris. *Bauh. Hist. III p. 470 icon. Dalech. Hist. p. 1049 icon.*

Farfarugio. *Matth. p. 895 icone.*

Nasce comunemente intorno Malghera e Campalto nei Fossi e nei Prati acquosi; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta perenne.

DIDYNAMIA

GYMNOSPERMIA.

AJUGA. (Ginsel) Bugola.

Corolla col labbro superiore piccolissimo, bidentato.

Stami più lunghi del labbro superiore.

A. reptans. (Kriechender G.) B. serpeggiante.

Stolloni serpeggianti. *Pers. Syn.* II p. 109. *Röhl.*

germ. II p. 319. *Schult. aust.* II p. 143.

Bugula. *Zann. Ven.* p. 43. t. 241.

Consolida media, quibusdam Bugula. *Bauh. Hist.*

III p. 430 icon.

Nasce comunemente in Campalto; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta perenne.

TEUCRIUM. (Gamander) Teucrio.

Corolla, il di cui tubo è senza labbro superiore ed aperto nel principio, per dove escono fuori li stami-

1. *T. Chamaedrys*. (Gemeiner G.) T. Querciola.

Foglie cuneiformi-ovate, intagliate, intaccate, picciolate, fiori ternati, fusti giacenti pelosi. *Pers.*

Syn. II p. 111. *Röhl. germ.* II p. 320. *Schult. aust.* II p. 141. *Savi mat. med.* t. 8.

Chamaedrys major repens. *Zann. Ven.* p. 58. t. 97.

Chamaed. vulgo vera existimata. *Bauh. Histor.* III p. 288.

Nasce abbondevolmente nei luoghi arenosi, nei Tre-

porti e nel Cavallino; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

2. *T. Polium*. (Poley G.) T. Polio.

Capolini subrotondi, pedunculati, foglie lanceolate ottuse, intaccate, rivolte in dietro nel margine, tomentose, fusto cadente. *Pers. l. c. p. 112. Röhl. l. c. Savi l. c. t. 5.*

T. montanum album. Zann. Ven. p. 213. t. 35.

T. montanum album serratum latifolium. Barrell. ic. 1074.

Nasce abbondevolmente nei luoghi arenosi, nei Treporti e nel Cavallino; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

3. *T. montanum*. (Berg G.) T. montano.

Corimbi terminali, denti del calice acuti, mutici, foglie lanceolate interissime, inferiormente tomentose. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. aust. II p. 141.*

Polium Lavandulae folio. Zannichel. Ven. p. 214. t. 150. f. 1.

Nasce come la precedente, ed è pianta fruticosa.

SATUREJA. (Pfefferkraut) Santoreggia.

Calice tubuloso striato. Corolla con lacinie quasi eguali. Stami distanti.

S. hortensis. (Garten P.) S. degli Orti.

Peduncoli ascellari quasi cimosi, foglie lanceolate interissime, fusto incrociato. Pers. Syn. II p. 113. Röhl. germ. II p. 327.

S. hortensis s. *Cunila sativa* Plinii. *Zannich. Ven.*
p. 235. t. 290.

S. sativa. *Bauh. Hist.* III p. 272 icon.

Nasce negli Orti nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta annuale.

MENTHA. (Münze) Menta.

Corolla quasi eguale 4-fida. *Lacinia* maggiore smarginata. *Stami* eretti distanti.

1. *M. sylvestris*. (Wald M.) M. selvatica.

Spighe bislunghe, foglie bislunghe, tomentose, sessili, inegualmente seghettate, con denti acuti, stami più lunghi della corolla. *Pers. Syn.* II p. 119. *Röhl. germ.* II p. 327. *Schult. aust.* II p. 134.

M. sylvestris longiore folio. *Zann. Ven.* p. 185. t. 95.

Menthastrum spicatum folio longiore candicante. *Bauh. Hist.* III p. 221.

Nasce intorno Mestre e Fusina; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

2. *M. aquatica*. (Wasser M.) M. acquatica.

Fiori in capolini, foglie ovate picciolate seghettate glabre, stami più lunghi della corolla. *L. Sp. pl.*

M. aquatica. *Bauh. Hist.* III p. 223.

Sisymbrium sylvestre. *Dalech. Hist.* p. 677 icon.

Nasce intorno Malghera nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è perenne.

3. *M. gentilis*. (Edel M.) M. gentile.

Fiori verticillati, foglie ovate picciolate, un poco

ottuse, fusto ramosissimo, patente, il calice alla base, ed i pedicelli glabri. *Pers. Syn.* II p. 119. *Röhl. germ.* II p. 328. *Schult. aust.* II p. 137.

M. verticillata minor, acuta, non crispa odore ocymi. *Bauh. Hist.* III p. 216 icon.

M. sativa quarta Dodonaei. *Dalechamp. Hist.* p. 673 icon.

Nasce in Malghera nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

4. *M. Pulegium.* (Poley M.) *M. Pulegio.*

Fiori verticillati, foglie ovate, fusto giacente, calice e pedicelli tomentosi, denti del calice ciliati. *Persoon l. c.* p. 120. *Röhl. germ.* p. 329. *Schult. l. c.* p. 139.

Pulegium. *Bauhin. Hist.* III p. 256 icon. *Dalech. Hist.* p. 891 icon.

Nasce nei luoghi inondati intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

GLECHOMA. (Gundelrebe) Glecoma.

Calice 5-fido. Ciascuna coppia delle *Antere* disposte in croce.

G. hederacea. (Gemeine G.) *G. ederacea.*

Foglie reniformi intaccate. *Pers. Syn.* II p. 121. *Röhl. germ.* II p. 324. *Schult. aust.* II p. 133. *Savi mat. med. t.* 20.

Hedera terrestris vulgaris. *Zannich. Venet.* p. 135. t. 253.

Hedera terrestris major. *Bauh. Hist.* III p. 855 icon.

Hedera terrestris. *Matth. p.* 662 icon.

Nasce comunemente in Campalto, dove si trova ancora la varietà, a fiori bianchi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

LAMIUM. (Taubnessel) Lamia.

Corolla col labbro superiore intero, l'inferiore 2-lobo. Fauce con un dente per parte.

1. *L. Orvala.* (Grossblumige T.) L. grandifloro.

Foglie cuoriformi, inegualmente seghettate, con denti acuti, corolla gonfia alla fauce, calice colorato.

Pers. Syn. II p. 121. *Röhl. germ.* p. 321. *Schult. aust.* II p. 147.

Galeopsis maxima flore magno rubro. *Bauh. Hist.* III p. 853 icon.

Nasce intorno Mestre, non lungi dal luogo detto: Quattro Cantoni, appresso i Fossi e luoghi ombrosi; fiorisce il mese di Giugno, ed è pianta perenne.

2. *L. album.* (Weisse T.) L. bianco.

Foglie cuoriformi acuminate seghettate picciolate, verticilli ventiflori. *Pers. Syn.* II p. 122. *Röhl.*

l. c. Schult. l. c. p. 149.

Galeopsis s. Urtica iners floribus albis. *Bauh. Hist.* III p. 322.

Nasce comunemente in Campalto; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

3. *L. purpureum*. (Rothe T.) *L. purpureo*.

Foglie cuoriformi ottuse, dentate, picciolate, quelle della sommità ammucciate, fusto, di sotto, quasi senza foglie. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p. 322. Schult. aust. l. c.*

L. purpureum foetidum, folio subrotundo. *Zann. Ven. p. 158.*

Galeopsis sive *Urtica iners*, folio et flore minore. *Bauh. Hist. III p. 323.*

Nasce nei luoghi coltivati e negli Orti; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta annuale.

4. *L. amplexicaule*. (Stängelumfassender T.) *L. abbracciafusto*.

Foglie florali sessili, abbraccianti il fusto, intagliate, le radicali picciolate. *Pers. Synops. II p. 122. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

L. folio caulem ambiente minus. Zann. Ven. p. 158.

Galeopsis s. *Urtica iners minor*, folio caulem ambiente. *Bauh. Hist. III p. 853.*

Nasce come la precedente; fiorisce nella Primavera, ed è pianta annuale.

GALEOPSIS. (Hohlzahn) Galeosside.

Corolla col labbro superiore concavo, intaccato, l'inferiore con due denti alla *fauce*.

G. grandiflora. (Grossblumiger H.) *G. a fiori grandi*.

Foglie ovato-lanceolate seghettate, fusto ispido, internodii superiormente un poco ingrassati, corol-

la tre volte maggiore del calice, labbro superiore intaccato-intagliato. *Schult. aust. II p. 152.*
Röhl. germ. II p. 322.

G. ochroleuca. *Pers. Syn.*

Nasce in Campalto ed in Cortelazzo nei luoghi umidi ed ombrosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

BETONICA. (Betonien) Betonica.

Calice restato. Corolla il labbro superiore ascendente, un poco piano. Tubo cilindrico.

B. officinalis. (Gemcine B.) B. officinale.

Spiga interrotta, corolla col labbro superiore intero, l'inferiore smarginato. Pers. Synops. p. 122.
Röhl. germ. II p. 326. Schult. aust. II p. 145.

B. purpurea spica longiori. Zannichel. Ven. p. 37. t. 240.

B. vulgaris purpurea. Bauh. Hist. III p. 301 cum icone.

Nasce nei Treporti e nel luogo detto Aca Bianca nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

STACHYS. (Ziest) Stachide.

Corolla col labbro superiore concavo, labbro inferiore, con le lacinie laterali richinate, trifido, con la lacinia di mezzo maggiore smarginata.

1. *S. sylvatica.* (Wald Z.) S. selvatica.

Verticilli di sei fiori, foglie cuoriformi picciolate. Pers.

Syn. II p. 123. *Röhl. germ.* II p. 323. *Schult. aust.* II p. 155.

Galeopsis s. *Urtica iners magna foetidissima*. *Bauh. Hist.* III p. 853.

Nasce appresso i muri non lungi dal luogo detto: Quattro Cantoni; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *St. palustris*. (Sumpf Z.) S. paludoso.

Verticilli di sei fiori, foglie lineari-lanceolate semiabbracciafusto sessili. *Pers. loc. cit.* *Röhl. loc. cit.* *Schult. loc. cit.*

Galeopsis palustris betonicae folio, flore variegato. *Zann. Ven.* p. 283.

Galeop. angustifolia foetida. *Bauh. Hist.* III p. 854.
Nasce in Malghera nei Fossi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

3. *St. germanica*. (Deutscher) S. di Germania.

Canescente, foglie ovato lanceolate ottusamente seghettate, verticilli con molti fiori, fusto lanato. *Pers. l. c.* *Röhl. l. c.* p. 324. *Schult. l. c.* p. 156.

St. Fuchsi. *Bauh. Hist.* III p. 319.

Nasce in Campalto nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

4. *St. recta*. (Weisser Z.) S. dritta.

Verticilli con 6-15 fiori, calici pungenti, foglie ovato-lanceolate seghettate, fusti ascendenti. *Persoon loc. cit.* *Rohling. loc. cit.* p. 224. *Schult. loc. cit.* p. 156.

Sideritis hirsuta procumbens. Zann. Venet. p. 247.
t. 200 mala.

Sid. vulgaris hirsuta. Bauh. Hist. III p. 425 icon.

Nasce comunemente nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

BALLOTA. (Ballote) Ballota.

Calice ipocrateriforme 5-dentato, 10-striato. Corolla col labbro superiore concavo, intaccato. Semi ovati triquetri.

B. nigra. (Schwarze B.) B. nera.

Foglie indivise, cuoriformi, seghettate, calici acuminati. Pers. Syn. I p. 125. Röhl. germ. II p. 323. Schult. aust. I p. 160.

Ballote. Zann. Ven. p. 34. t. 182. Matth. p. 872 icon.

Marrubium nigrum s. Ballote. Bauhin. Histor. III p. 318 icon.

Nasce comunemente nel Lido e Fusina; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

LEONURUS. (Löweschwanz) Leonuro.

Calice 5-gono, 5-dentato. Corolla col labbro superiore villosa, piano, intero, l'inferiore tripartito, con la lacinia di mezzo indivisa.

L. Cardiaca. (Gemeine L.) L. Cardiaca.

Foglie cuneiformi-ovate trilobe, le superiori lanceolate interissime, corolla maggiore dei calici pungenti. Pers. Syn. II p. 126. Röhl. germ. II p. 321. Schult. aust. I p. 145.

Cardiaca. *Zann. Ven. p. 49. t. 109. Bauh. Hist. III p. 320 sine icone. Matth. p. 1186.*

Nasce nel Lido appresso le Siepi; fiorisce nei mesi di Giugno sino Settembre, ed è pianta perenne.

CLINOPODIUM. (Wirbelborste) Clinopodio.

Invoglio di molte brattee setacee. Calice bilabbrato. Corolla col labbro superiore piano, cordato a rovescio, dritto.

C. vulgare. (Gemeine W.) *C. volgare.*

Capolini verticillati, brattee setacee ispide, foglie nella pagina superiore pelose, distantemente dentate, fusto semplice. *Persoon Synops. II p. 129. Röhl. germ. II p. 331. Schult. aust. II p. 173.*

C. origano simile. Zann. Ven. p. 70. t. 176.

C. quorundam origani facie. Bauh. Hist. III p. 250 sine icon.

Nasce in Campalto nei luoghi montuosi, ed appresso le Siepi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

ORIGANUM. (Dosten) Origano.

Strobilo tetragono spicato. Calice ineguale quasi bilabbrato cilindrico, internamente setoloso. Corolla col labbro superiore eretto, il labbro inferiore tripartito, con lacinie eguali.

O. vulgare. (Gemeiner D.) *O. volgare.*

Spighe subrotonde panicolate conglomerate, brattee ovate colorite più lunghe del calice. *Lin. Sp. pl.*

Pers. Syn. II p. 129. *Gmel. Syst. Nat.* II p. 912.
Röhl. german. II p. 331. *Schult. aust.* II p. 173.
Gilib. Lithuan.

- O. sylvestre. *Zann. Ven.* p. 200. t. 149.
 O. vulgare spontaneum. *I. Bauhin. Hist.* III p. 236
 cum icone.
 O. sylvestre s. vulgare. *Fuchs Hist.* p. 522.
 Origano volgare. *Matth.* p. 739 cum icone.
*Nasce non lungi da Cortelazzo nei luoghi erbosi;
 fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è piana
 ta perenne.*

THYMUS. (Thymian) Timo.

*Calice bilabbrato con la fauce chiusa da peli. Co-
 rolla col labbro superiore piano, smarginato.*

T. Serpyllum. (Feld T.) T. serpillo.

Fiori in capolini, fusti serpeggianti, foglie piane,
 ottuse, ciliate alla base. *Pers. Synops.* II p. 130.

Röhl. germ. II p. 330. *Schult. aust.* II p. 164.

Serpyllum vulgare minus. *Zannichel. Venet.* p. 246.
 t. 172.

Serpyllum vulgare. *Bauh. Hist.* III p. 268 icon.

Serpillo. *Matth.* p. 763 icon.

*Nasce intorno Malghera nei luoghi montuosi, asciut-
 ti; fiorisce nei mesi di Aprile sino Agosto, ed è
 pianta perenne.*

MELISSA. (Melissa) Melissa.

*Calice arido, un poco piano nel margine. Labbro
 superiore fastigiato. Corolla col labbro superiore*

concavo bifido. *Lobo* di mezzo del labbro inferiore cordato a rovescio.

1. *M. officinalis*. (Citronen M.) M. Cedroncella.
Verticilli smezzati quasi sessili, brattee bislunghe pedicellate, foglie ovate acute seghettate. *Pers. Syn.* II p. 132. *Röhl. german.* II p. 335. *Schult. aust.* II p. 174. *Savi mat. med.* t. 30.
M. vulgaris odore citri. *Bauh. Hist.* III p. 232 icon.
Melissa. *Matth.* p. 874 icon.
Nasce in Campalto appresso le Siepi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *M. Calamintha*. (Kalaminthen M.) M. Calaminta.
Peduncoli ascellari, con molti fiori, dicotomi, foglie ovate, ottuse, seghettate, macchiate, fusto irto. *Pers. l. c.* *Röhl. l. c.* p. 330 sub Thymo. *Schult. l. c.* p. 167.
Calamintha officinalis. *Savi l. c. t.* 42.
Calam. flore magno vulgaris. *Bauh. Hist.* III p. 218 icon.
Nasce in Brondolo e nell'Acqua Bianca nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

3. *M. Nepeta*. (Katzen M) M. Nepetella.
Peduncoli ascellari, multiflori, dicotomo-corimbose, foglie ovate ottuse quasi seghettate, fusto irsuto, denti calicini glabri, quasi eguali. *Pers. loc. cit.* *Röhl. germ. l. c.* p. 331 sub Thym. *Schult. l. c.*
Calamintha pulegii odore. *Zann. Ven.* p. 46. t. 187.

Calamintha flore minore, odore Pulegii. *Bauh. Hist.*

III p. 229.

Nasce comunemente nei luoghi montuosi e sassosi, specialmente in San Niccolò di Lido; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

SCUTELLARIA. (Helmkraut) Scodellaria.

Calice bilabbiato con labbri interi, chiuso dopo la fioriscenza da un coperchio elmiforme. Corolla con tubo prolungato.

S. galericulata. (Gemeines H.) S. volgare.

Foglie cordato-lanceolate intaccate, fiori ascellari.

Pers. Synops. II p. 136. Röhl. germ. II p. 329.

Schult. aust. II p. 162.

Tertionaria, aliis *Lysimachia galericulata*. *Bauhin.*

Hist. III p. 435 icon.

Lysimachia galericulata. *Dalechamp. Hist. p. 1060 icon.*

Nasce in Campalto, e intorno Malghera nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

PRUNELLA. (Braunheil) Brunella.

Corolla col labbro superiore dilatato. Filamenti forcati; in una punta delle quali è attaccata l'antera. Stigma bifido.

1. *P. vulgaris*. (Gemeines B.) B. volgare.

Foglie picciolate, bislungo-ovate, calice col labbro superiore troncato, trirestato, fusto ascendente,

spiga terete. *Pers. Syn.* II p. 137. *Röhl. germ.* II p. 333. *Schult. aust.* II p. 171.

Brunella major, folio non dissecto. *Zannich. Ven.* p. 40. t. 242.

Prun. flore minore, vulgaris. *Bauh. Hist.* III p. 418 icon.

Nasce comunemente in Campalto e Malghera nei luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *P. laciniata.* (*Gerissenes B.*) *B. laciniata.*

Fusto quasi semplice, foglie pennato-fesse, le inferiori bislunghe. *Pers. l. c.* p. 137. *Schult. l. c.*

Brunella minor alba laciniata. *Zann. Venet.* p. 40. t. 136.

Prun. flore magno albo, folio laciniato. *Bauh. Hist.* III p. 429 sine icon.

Nasce in Campalto e Malghera nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

ANGIOSPERMIA

VERBENA. (*Eisenhart*) *Verbena.*

Calice 5-fido. *Corolla* imbutiforme. *Tube* curvo.

Lembo ineguale 5-fido. Quattro stami fertili.

Frutto, quattro semi riuniti da un tessuto cellulare.

V. officinalis. (*Gemeiner E.*) *V. comune.*

Spighe filiformi ramoso, foglie molto-fesse intagliate, fusto ramoso. *Pers. Synops.* 3 p. 138. *Röhl. german.* II p. 329. *Schult. aust.* II p. 162. *Savi mat. med. t.* 52.

V. comunis. *Zann. Ven.* p. 173. t. 169.

V. vulgaris. *Bauh. Hist.* III p. 443.

Verbenaca. *Matth.* p. 1107 icon.

Nasce negli Orti e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

EUPHRASIA. (Augentrost) Eufragia.

Calice 4-fido. Corolla bilabbiata, col labbro superiore bifido, l'inferiore trilobo, con le lacinie bifide. Antere delli stami minori spinose alla base di uno dei loro lobi.

1. *E. officinalis.* (Gemeiner A.) E. officinale?

Foglie ovate ottusamente dentate, corolla, il labbro inferiore, con le lacinie smarginate. *Pers. Syn.* II p. 149. *Röhl. germ.* II p. 334. *Schult. aust.*

E. officinarum. *Zann. Ven.* p. 97. t. 246.

Euphrasia. *Bauh. Hist.* III p. 432.

Eufragia. *Matth.* p. 1076 icon.

*Nasce comunemente intorno Malghera e nei Trepor-
ti nei Prati e luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di
Giugno sino Agosto, ed è pianta annuale.*

2. *E. Odontites.* (Brauner A.) E. Odontide.

Fusto ramosissimo peloso-scabro, foglie lineari-lanceolate seghettate. *Pers. l. c.* p. 150. *Röhl. germ.* II p. 335. *Schult. l. c.* p. 179 sub *Bartsia.*

Pedicularis serotina purpurascens flore. *Zann. Ven.*
p. 206. t. 99.

Euphrasia parva purpurea. *Bauh. Hist.* III p. 433.
*Nasce nei Treporti nei luoghi umidi: fiorisce nei
mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.*

RHINANTHUS. (Hahnenkamm) Pignato.

Calice ventricoso 4-fido. *Corolla* ringhiosa col lab-
bro superiore compresso. *Cassella* ottusa, com-
pressa, di due cavità.

R. Crista Galli. (Gemeiner H.) R. comune.

Calice glabro, *corolla* col labbro superiore com-
presso 2-dentato, *lacinia* media del labbro infe-
riore brevissima, *fusto* macchiato. *Pers. Syn.* II
p. 151. *Röhl. german.* II p. 335. *Schult. aust.* II
p. 180.

Pedicularis pratensis lutea. *Zann. Ven.* p. 207.

Crista galli foemina. *Bauh. Hist.* III p. 436 icon.
*Nasce comunemente intorno Malghera nei luoghi er-
bosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed
è pianta annuale.*

MELAMPHYRUM. (Kuhweizen) Melampiro.

Calice 4-fido. *Corolla* col labbro superiore compres-
so, piegato nel margine. *Cassella* di due cavità,
e con due semi gobbi.

M. arvense. (Acker K.) M. dei campi.

Spighe coniche allargate, *brattee* dentato-setacee,
colorite, *denti* del calice scabri, *corolle* chiuse.

Pers. Syn. II p. 151. *Röhl. germ.* II p. 235. *Schult. aust.* II p. 181.

Nasce intorno Malghera nei Prati; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

LINARIA. (Leinkraut) *Linaria.*

Calice 5-partito. *Corolla* mascherata, con sprone.

Cassella ovata di due cavità, che si apre nella cima, in 3-5 lacinie richinate.

1. *L. Elatine.* (Spiesförmiges L.) *L. Elatine.*

Foglie astiformi alterne, fusti giacenti. *Pers. Syn.* II p. 155. [sub *Antirrhin.* uti sequent.] *Schult. aust.* p. 191.

Cymbalaria Elatine? *Röhl. germ.* II p. 343.

Lin. segetum nummulariae folio, villosa, aurita, flore luteo. *Zann. Ven.* p. 167.

Elatine foemina, folio anguloso. *Bauh. Histor.* III p. 372 icone.

Nasce in Campalto e Malghera nei luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

2. *L. muralis.* (Mauer L.) *L. murale.*

Foglie cuoriformi, alterne, lisce, 5-lobe, fusti giacenti. *Pers. l. c.* *Schult. l. c.* *Cymbalaria muralis.* *Röhl. l. c.*

Cymbalaria flosculus purpurascens. *Zann. Ven.* p. 77. tab. 252. *Bauh. Histor.* III p. 685 cum icone.

Nasce nei muri antichi e nei luoghi sterili in Sau-

ta Marta; *fiorisce nei mesi di Marzo sino Agosto, ed è pianta perenne.*

3. *L. minor.* (Kleines L.) L. minore.

Foglie per lo più alterne, lanceolate ottuse, fusto ramosissimo patente. *Pers. l. c. p. 157. Schultes l. c. p. 193. Röhl. l. c. p. 342.*

Antirrhinum minimum. *Bauh. Hist. III p. 465 icon.*

Antirrhino III. *Matth. p. 1257 icone.*

Nasce negli Orti e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Maggio sino Settembre, ed è pianta annuale.

4. *L. vulgaris.* (Gemeines L.) L. volgare.

Foglie lanceolato-lineari conferte, fusto eretto, spighe terminali sessili, fiori imbricati. *Pers. l. c. p. 158. Röhl. germ. II p. 342. Schult. l. c.*

L. vulgaris lutea, flore majore. *Zann. Ven. p. 167. t. 174.*

L. lutea vulgaris. *Bauh. Hist. III p. 456 icon.*

Osiride. *Matth. p. 1268 icon.*

Nasce in Malghera, nei terreni di Santa Marta e su' Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

ANTIRRHINUM. (Löwenmaul) Antirrhino.

Calice di cinque foglie. *Corolla* senza sprone, gobba alla base. *Labbro* superiore bifido richinato, l'inferiore trifido. *Fauce* chiusa dal palato. *Cassella* di due cavità, obliqua alla base che si apre nella cima con tre fori.

A. majus. (Grosses L.) A. maggiore.

Foglie lanceolate, opposte, fiori spicati, calice con lacinie rotondate glanduloso-pelose. *Pers. Syn.* II p. 158. [sub *Orontium*] *Röhl. germ.* II p. 341. *Schult. aust.* II p. 194.

A. vulgare. *Zann. Ven.* p. 18. *Bauhin. Histor.* III p. 462.

Antirrhino I. *Matth.* p. 1255 icon.

Nasce nei muri antichi e luoghi ombrosi; fiorisce nei mesi di Giugno sino Settembre, ed è pianta bienne.

SCROPHULARIA. (Braunwurz) Scrofolaria.

Calice 5-fido. Corolla arrovesciata globosa. Cassella di due cavità.

1. *S. nodosa.* (Knotige B.) *S. nodosa.*

Fusto con angoli ottusi, foglie cuoriformi, seghettate, glabre, trinervate. *Pers. Syn.* II p. 160. *Röhl. germ.* II p. 337. *Schult. aust.* II p. 185.

S. nodosa foetida. *Zann. Ven.* p. 242. t. 303.

S. vulgaris et major. *Bauh. Hist.* III p. 421 cum icone.

Nasce in Malghera e Santa Marta nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *S. canina.* (Hands B.) *S. canina.*

Foglie pennate, grappoli terminali nudi, peduncoli bifidi. *Pers. Syn. l.c.* *Röhl. germ. l.c.* *Schult. l.c.* p. 187.

S. Ruta canina dicta, vulgaris. Zann. Ven. p. 242. t. 221.

S. tertia Dodoneo ec. ec. Bauhin. Hist. III p. 423 cum icone.

Nasce in Chioggia nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

OROBANCHE. (Sommerwurz) Orobanche.

Calice di due foglie bipartite. Corolla ringhiosa.

Cassella di una sola cavità, con due valve e con molti semi. Glandola alla base del germe.

O. caryphyllacea. (Nelkenduftende S.) O. a odore di garofano.

Fusto semplice, corolla gonfia fimbriato-crespa, labbro inferiore con lacinie ottuse, eguali, stami dentro alla base pelosi. *Pers. Syn. II p. 180. Röhl. germ. II p. 333. Schult. aust. I p. 176.*

Nasce intorno Malghera nei luoghi montuosi ed erbosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

TETRADYNAMIA

SILICULOSAE.

MYAGRUM. (Dotter) Miagro.

Siliquetta sugherosa, senza valve, con le cavità inferiori con un solo seme, e le superiori sterili.

M. rugosum. (Ruuzeliges D.) *M. rugoso.*

Siliquette solcate, pelose, rugose ed aspre, foglie
bislunghe, ottuse, dentate. *Pers. Syn. II p. 183.*

Röhl. germ. I p. 355. Schult aust. II p. 210.

*Nasce nei terreni di Santa Marta; fiorisce nei mesi
di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.*

BUNIAS. (Zackenschote) Erucagine.

Siliquetta quasi tetragona, senza valve, di due o
quattro cavità, rugosa.

B Erucago. (Stachelsenf Z.) *E. volgare.*

Siliquette tetragone dentate, foglie radicali runcinate,
quelle del fusto lanceolate. *Pers. Syn. II p. 183.*

Schult. aust. II p. 211

Erucago glandulosa. Röhl. germ. II p. 335.

Sinapi echinatum. Bauh. Hist. II p. 858 cum icone.

*Nasce nei luoghi umidi a Santa Marta; fiorisce
nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.*

CAKILE. (Meersenf) Cachile.

Siliquetta lanceolata, quasi tetragona 2-articolata.
Articoli ovali monospermi.

C. maritima. (Gemeiner M.) *C. marino.*

Foglie pennate carnose. *Pers. Syn. II p. 184. Röhl.
germ. II p. 334.*

*Bunias [Cakile] Siliculis ovatis laevibus ancipitibus.
L. Spec.¹ Plant.*

*C. maritima, angustiore folio. Zann. Venet. p. 45.
t. 13. 177. 189 193.*

E. quibusdam, aliis *Eruca maritima*, et *Raphanus marinus*. *Bauh. Hist.* II p. 867.

Nasce in tutte le Spiagge arenose, specialmente in quella del Lido; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

COCHLEARIA. (Löffelkraut) Coclearia.

Siliquetta gonfia, rugosa con due valve e con molti semi. *Valve* gobbe ottuse. *Tramezzo* quasi parallelo.

C. Draba. (Doldentrages L.) *C. Draba*.

Foglie lanceolate, abbraccianti il fusto, dentate.

Pers. Syn. II p. 186. *Schult. aust.* II p. 214.

Lepidium Draba. *Röhl. germ.* II p. 350.

Lepid. humile incanum, arvense. *Zann. Ven.* p. 151. t. 148. f. 2.

Draba multis, flore albo. *Bauh. Hist.* II p. 939.

Nasce nel luogo detto: Lazzaretto-Nuovo appresso i Fossi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta pereune.

LEPIDIDIUM. (Kresse) Lepidio.

Corolla regolare. *Siliquetta* cuoriforme, smarginata, con molti semi. *Valve* carenate. *Tramezzo* contrario.

L. graminifolium. (Grasblättrige K.) *L. graminifolium*.

Foglie radicali lirato-pennatofesse, le inferiori del fusto lanceolate, seghettate, le superiori lineari

interissime, fiori con sei stami, siliquette ovate, acuminate. *Pers. Syn.* II p. 188. *Röhl. germ.* II p. 351 sub L. *Iber. Schult. aust.* II p. 216.

Iberis latiore folio. *Zann. Ven.* p. 147. t. 43.

Iberis. *Bauh. Hist.* II p. 918 icon bona.

Nasce abbondevolmente in Fnsina, a Santa Marta e nel Lido nei Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

THLASPI. (Täschelkraut) Tlaspide.

Siliquetta smarginata, cordata a rovescio, con molti semi. Valve navicolari marginato-carenate.

1. *T. campestre.* (Feld T.) T. dei campi.

Siliquette subrotonde glandoloso-puntate, foglie radicali ovate a rovescio, quelle del fusto saettiformi sessili dentate incane. *Pers. Syn.* II p. 189.

Röhl. germ. II p. 349. *Schult. aust.* II p. 219.

T. vulgatus. *Bauh. Hist.* II p. 921.

T. I. Matth. p. 597 icon.

Nasce comunemente in Santa Marta; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta biennale.

Fusto dritto. Foglie glauche, le radicali picciolate, ovate a rovescio, sinuato-lirate, ovvero interissime, quelle del fusto conferte sessili saettiformi, un poco dentate, col margine volto indietro. Fiori terminali. Petali interi spatolati, bianchi.

2. *T. Bursa pastoris.* (Hirtentasche T.) T. degli Orti.

Siliquette cordate a rovescio, foglie radicali penna-

to-fesse. *Pers. Syn. l. c. Röhl. l. c. p. 350* sub
Nasturt. Schult. aust. II p. 217 sub *Capsella*.

Bursa pastoris major folio sinuato. Zannich. Ven. p. 43. t. 244.

Bursa pastoria. Bauh. Hist. II p. 936.

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Giugno sino Settembre, ed è pianta annuale.

DRABA. (Hungerblümchen) *Draba*.

Siliquetta intera ovali-bislunga, con valve un poco
 piane. *Tramezzo* parallelo. *Stilo* quasi nessuno.

D. verna. (Frühlings H.) *D.* di primavera.

Fusto nudo, foglie bislunghe un poco acute, quasi
 seghettate irte, petali bifidi, stinmi sessili. *Pers.*
Syn. II p. 190. Röbling. germ. II p. 343. Schult.
aust. II p. 224.

Alysson vulgare, *Polygoni* folio, caule nudo. *Zann.*
Ven. p. 12.

Bursa pastoris minima. Bauh. Hist. II p. 937 cum
 icone.

Nasce nei luoghi arenosi ed asciutti nel Lido; fiorisce nei mesi di Febbrajo e Marzo, ed è pianta annuale.

CAMELINA. (Leindotter) *Camellina*.

Stami edentati. *Stilo* bislungo. *Siliquetta* membra-
 nacea ovata, ovvero rotonda, con due valve, e
 con molti semi bislunghi un poco striati, non mar-
 ginati.

C. sativa. (Gemeiner L.) *C. domestica*.

Siliquette ovate a rovescio peduncolate, foglie abbraccianti il fusto, interissime. *Pers. Synops.* II p. 191. *Röhl. german.* II p. 345. *Schult. aust.* II p. 231.

Myagrum sativum. *L. Spec. Plant.*

Alysson segetum, foliis auriculatis acutis. *Zamich. Ven.* p. 12.

Myagrum dictum Camellina. *Bauh. Hist.* II p. 892 cum icone.

Nasce fra le Biade e fra il Lino; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

SILIQUOSA

CARDAMINE. (Schaumkraut) *Cardaminae*.

Siliqua che si apre con elasticità in due *valve* che si avvoltano. *Stimma* intero.

1. *C. hirsuta*. (Beharrtes S.) *C. hirsuta*.

Foglie pennate senza stipole, foglioline rotondate repando-dentate picciolate, fiori con quattro stami. *Pers. Syn.* II p. 196. *Röhl. germ.* II p. 365. *Schult. aust.* II p. 261.

C. quarta Dalechampii. *Zann. Ven.* p. 49. t. 225. *Dalechamp. Hist.* p. 659 icon.

Sysimbrium cardamine hirsutum. *Bauh. Histor.* III p. 888 cum icone.

Cardam. sylvestris minor. *Barr. ic.* t. 455.

Nasce comunemente nei luoghi ombrosi e fra' Sassi; fiorisce nei mesi di Febbraro e Marzo, ed è pianta annuale.

2. *C. pratensis*. (Wiesen S.) C. dei prati.

Foglie pennate con foglioline radicali subrotonde, quelle del fusto lineari-lanceolate. *Pers. loc. cit. Röhl. l. c. p. 366. Schult. l. c. p. 263.*

Nasce in Malghera e Campalto nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta perenne.

Fusto semplice angolato. Foglioline inferiori subrotonde, quelle del fusto lanceolate. Fiori terminali in grappoli, grandi.

SISIMBRIUM. (Raucke) Sisembro.

Siliqua che si apre con valve dritte. Calice patente. Corolla patente.

1. *S. amphibium*. (Wasser R.) S. amfibio.

Silique declinate bislungo-ovate, foglie pennatofesse seghettate, petali più lunghi del calice. *Pers. Syn. II p. 196. Röhl. germ. II p. 361. Schult. aust. II p. 267.*

β *S. aquaticum* foglie pennatofesse. *Röhl. l. c.*

Nasce intorno Malghera e in Campalto nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

2. *S. tenuifolium*. (Dünblättrige R.) S. a foglie tenui.

Glabra, silique dritte, foglie inferiori tripennatofesse.

se, le superiori intere. *Persoon. Synops. II p. 197.*
Röhl. loc. cit. p. 362. Schult. loc. cit. p. 268.
Eruca tenuifolia perennis. Bauhin. Hist. II p. 861
cum icone.

Ruchetta selvatica. Matth. p. 560 icon.

Nasce nei luoghi asciutti, specialmente intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

3. *S. Sophia*. (Feinblättrige R.) *S. Sofia*.

Petali minori del calice, foglie arcicomposte con foglioline lineari. *Pers. l. c. p. 198. Schultes l. c. p. 270. Röhl. l. c.*

Sophia chirurgorum. Zann. Ven. p. 252. t. 305.

Seriphium germanicum s. Sophia quibusdam. Bauh. Hist. II p. 886.

Nasce nel luogo detto Aca Bianca nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

ERYSIMUM. (Hederich) *Erisimo*.

Calice chiuso. Siliqua tetragona.

E. officinale. (Gemeiner H.) *E. officinale*.

Foglie runcinate, silique appoggiate alla spiga. *Pers. Syn. II p. 199. Röhl. germ. II p. 362 sub Sisimbr. Schult. aust. II p. 236.*

E. vulgare. Zann. Ven. p. 96. t. 287.

E. Tragi, flosculis luteis ec. ec. Bauh. Hist. II p. 863.
Nasce nei Rovinazzi, e fra' Sassi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

Fusto terete ramoso, con rami patenti. Foglie pelose. Fiori in spighe lunghe, piccoli. Petali ottusi. Silique lesiniformi pelose.

CHEIRANTHUS. (Levkoje) Cheiranto.

Calice chiaso, con due foglioline gobbe alla base. Petali dilatati. Germe con un dente glandoloso per parte. Siliqua compressa, ovvero terete. Stimma bilobo. Semi piani, in qualche specie marginati.

C. Cheiri. (Gelbe L.) C. giallo.

Foglie lanceolate acute, glabre, rami angolati, fusto fruticoso. *Lin. Sp. pl. Gmel. Syst. Nat.* II p. 1193. *Pers. Syn.* II p. 200. *Röhl. germ.*

Leucojum luteum. *Bauh. Hist.* II p. 872.

Viola lutea. *Fuchs Hist.* p. 458.

Leucojo giallo. *Matth.* p. 925.

Nasce nella città sopra i muri e sopra i tetti; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta fruticosa.

ARABIS. (Gänsekrant) Arabide.

Glandole quattro, ognuna fra una fogliolina del calice eguale ad una squamma richinata. Silique compresse.

A. Thaliana. (Gemeines G.) A. comune.

Foglie irsute, le radicali bislunghe picciolate, quelle del fusto lanceolate sessili, interissime. *Pers. Syn.* II p. 204. *Röhl. germ.* II p. 306. *Schultes aust.* II p. 245.

Turritis vulgaris ramosa. *Zam. Ven. p. 267.*

Bursa Pastoria sive Pilosella siliquosa. *Bauh. Hist. p. 370 cum icone mediocri.*

Nasce negli Orti e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta annuale.

SINAPIS. (Senf) Senape.

Siliqua con rostro lungo. *Calice* patente, orizzontale. *Glandole* alla base degli stami.

S. Erucastrum. (Rauckenartiger S.) S. Erucastro.

Foglie runcinate, fusto ispido, silique lisce, stilo spadiforme. *Röhl. germ. II p. 360.*

Brassica Erucastrum *L. Pers. Synops. II p. 207. Schult. aust. II p. 255;*

Eruca inodora. *Bauh. Hist. II p. 862.*

Nasce abbondevolmente a Santa Marta nei Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

TURRITIS. (Thurmkraut) Turritide.

Siliqua lunghissima angolata, striata. *Calice* connivente dritto. *Corolla* dritta.

T. hirsuta. (Haariges T.) T. irsuta.

Foglie tutte ispide, le cauline abbraccianti il fusto, siliqua quadrangolare. *Pers. Syn. II p. 205. Röhl. germ. II p. 358. Schult. aust. II p. 250.*

T. minor. *Zam. Ven. p. 266. t. 170.*

Barbarea muralis. *Bauh. Hist. II p. 869.*

Nasce nel Lido nei Prati; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

MONADELPHIA

PENTANDRIA.

ERODIUM. (Reiherschnabel) Erodio.

Calice di cinque foglie. *Corolla* di cinque petali. *Nettario* cinque squamme alterne con i filamenti. *Germe* con cinque *glandole* mellifere alla base. *Arilli* cinque, monospermi, alla base del ricettacolo rostrato. *Reste* spirali, barbute nel lato interno.

1. *E. Cicutarium*. (Schierlingsblättriger R.) E. a foglie di cicuta.

Peduncoli con molti fiori, foglie pennate con foglioline sessili, pennatofesse, incise, corolla maggiore del calice, fusto giacente irto. *Pers. Synops.* II p. 224. *Röhl. germ.* II p. 370. *Schult. aust.* II p. 279.

Geranium cicutae folio, minus et supinum. *Zann. Ven.* p. 110. t. 215.

Geran. moschatum minus. *Bauh. Hist.* III p. 479 cum icone.

Nasce nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

2. *E. malacoides*. (Pappelartiger R.) E. a foglie di Altea.

Peduncoli con molti fiori, foglie cuoriformi, ottuse, quasi lobate, dentate, glabre, fusto e piccioli ir-
ti. *Pers. l. c. p. 225.*

Geran. malvaceum. *Bauhin. Hist. III p. 472* cum
icone mediocri.

*Nasce nel Lido nei muri antichi e luoghi sassosi;
fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pian-
ta annuale.*

DECANDRIA

GERANIUM. (Storchschnabel) Geranio.

Cal. di cinque foglie. *Cor.* regolare di cinque petali.
Nettari cinque alla base dei filamenti più lunghi.
Arilli cinque, monospermi restati, alla base del
ricettacolo rostrato. *Reste* nude dritte.

1. *G. molle*. (Weicher S.) *G. molle*.

Peduncoli con due fiori, foglie reniformi pelose, le
radicali 9-lobi, quelle del fusto 7-lobi, lobi trifi-
di, petali bifidi della lunghezza del calice muti-
co, arilli glabri rugosi, fusto dritto peloso. *Pers.*
Syn. II p. 236. Röhl. germ. II p. 372. Schultes
aust. II p. 286.

*Nasce in Campalto nei luoghi erbosi; fiorisce nei
mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.*

2. *G. dissectum*. (Zerschnittener S.) *G. tagliuzzato*.

Peduncoli con due fiori, foglie 5-partite con lobi trifidi lineari, petali smarginati, della lunghezza del calice restato, arilli pelosi, semi reticolati. *Pers. loc. cit. Röhl. loc. cit. p. 373. Schult. loc. cit. p. 287.*

Nasce in Chioggia e Malghera nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

3. *G. rotundifolium.* (Rundblättriger S.) *G.* a foglie rotonde.

Peduncoli con due fiori, foglie radicali reniformi 7-lobe, quelle del fusto subrotonde, troncati alla base, 5 lobe, con lobi trifidi, petali interi della lunghezza del calice restato, arilli irsuti, semi reticolati. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

G. folio malvae rotundo. Zann. Ven. p. 112. t. 291.

G. folio rotundo multum serrato. Bauh. Hist. III p. 473 cum icone.

Nasce negli Orti e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta annuale.

4. *G. pusillum.* (Nidriger S.) *G.* piccolo.

Peduncoli con due fiori, pentandri, foglie quasi 7-lobe, con lobi trifidi, petali smarginati, della lunghezza del calice mutico, arilli pubescenti. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. aust. II p. 288.*

G. columbinum majus flore minore caeruleo. Zann. Ven. p. 112.

Nasce nel Lido nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta annuale.

5. *G. Robertianum*. (Steudener S.) *G. Robertiano*.
 Peduncoli con due fiori, foglie 3-5 partite con lacie
 nie pennatefesse, petali doppiamente più lunghi
 del calice restato, 10-angolato, arilli rugosi, reti-
 colati, semi glabri. *Röhl. l. c. Schult. l. c.*
- G. Pedunculis bifloris*, calycibus pilosis decemangu-
 latis. *Pers. l. c.*
- G. Robertianum primum*. *Zann. Ven. p. 111. t. 228.*
- G. Robertianum murale*. *Bauh. Histor. III p. 480*
 cum icone.
- Geranio V. *Matth. p. 906 icon.*
- Nasce nei mari e nei luoghi sassosi; fiorisce nei*
mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

POLYANDRIA

ALTHEA. (Eibisch) Altea.

Calice doppio, l'esterno 6-fido. *Arilli* molti mono-
 spermi.

A. officinalis. (Gemeiner E.) *A. officinale*.

Foglie tomentose bislungo-ovate dentate. *Pers. Syn.*

II p. 248. *Röhl. germ. II p. 375. Schult. aust.*

II p. 292. *Savi mat. med. t. 3.*

A. Dioscoridis et Plinii. *Zann. Ven. p. 10. t. 236.*

A. s. Bismalva, *Bauh. Hist. II p. 954 icon.*

Althea. *Matth. p. 975 cum icone.*

Nasce nei luoghi umidi, specialmente intorno Mal-
ghera; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed
è pianta perenne.

MALVA. (Malve) Malva.

Calice doppio, l'esterno di tre foglie. Arilli molti monospermi.

1. *M. sylvestris.* (Wald M.) *M. selvetica.*

Fusto dritto erbaceo, foglie cuoriformi 5-7-lobi, con lobi seghettati acuti, peduncoli e piccioli pelosi. *Pers. Synops. II p. 254. Röhl. germ. II p. 374. Schult. aust. II p. 290.*

M. vulgaris, flore majore, folio sinuato. *Zannich. Ven. p. 179. t. 260. Bauh. Hist. II p. 949.*

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Maggio sino Dicembre, ed è pianta che vive uno, e qualche volta due anni.

2. *M. rotundifolia.* (Rundblättrige M.) *M. a foglie rotonde.*

Fusto giacente, foglie cordato-orbicolate 5-lobe, peduncoli fruttiferi declinati. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

M. vulgaris flore minore, folio rotundo. *Bauhinus Hist. II p. 949 cum icone.*

Trovati, benchè di rado; fra' Rovinazzi in Chioggia ed in Santa Marta; fiorisce nei mesi di Giugno ed Agosto, ed è pianta annuale, e qualche volta biennale.

È in tutte le sue parti minore della precedente.

Fusto un poco scabro peloso. Foglie 5-7-lobi, inegualmente dentate. Fiori piccioli, bianchi, ovvero rossigni. Arilli 10-15 un poco pelosi.

IBISCUS. (Ibisch) Ibisco.

Calice doppio, l'esteriore di molte foglie. *Stim.* 5.

Cassella di cinque cavità e con molti semi.

II. Trionum. (Stunden I.) I. orario.

Foglie dentate, le superiori tripartite, lobi lanceolati, quello di mezzo lunghissimo, calici gonfii membranacei nervosi. *Pers. Syn.* II p. 258. *Röhl. germ.* II p. 376. *Schult. aust.* II p. 291.

Ketmia vescicaria vulgaris. *Zann. Ven.* p. 156. t. 167.

Alcea solisequa multis, Veneta. *Bauh. Historia* III p. 1068 icon.

Alcea africana sive vescicaria trifoliae glabre. *Barr. icon.* t. 472.

Nasce negli Orti e nei luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

FUMARIA. (Erdranch) Fumosterno [Savi].

Calice di due foglie caduche. *Corolla* irregolare, spronata alla base. *Filamenti* 2 membranacei, ciascuno dei quali con tre antere. *Cassella* di una sola cavità, senza valve, con un solo seme.

1. *F. officinalis.* (Gemeiner E.) F. comune.

Fusto ramoso patente, frutti globosi retusi, foglie arcicomposte con foglioline cuneiformi-lanceolate

incise. *Pers. Synops.* II p. 278. *Röhl. german.* II p. 377. *Schult. aust.* II p. 306. *Savi mat. med. t. 1.* F. officinarum et Dioscoridis. *Zann. Ven.* p. 104. t. 247.

F. vulgaris. *Bauh. Hist.* III p. 201.

Famaria. *Matth.* p. 1217 cum icone.

Nasce comunemente negli Orti; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta annuale.

2. *F. parviflora.* (Kleinblüthiger E.) F. a fiori piccioli.

Fusto ramoso diffuso, frutti globosi acuti, foglie ar-
cicomposte, con foglioline tripartite lineari scana-
late. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

Nasce come la precedente.

OCTANDRIA

POLYGALA. (Kreutzblume) Poligallo.

Calice di cinque foglie, due delle quali in forma di *ale*, colorite. *Cassella* cordata a rovescio, di due cavità e con due *valve*.

1. *P. vulgaris.* (Gemeine H.) P. comune.

Fiori in grappoli crestati, ale calicine trinervi, ot-
tuse, della lunghezza della corolla, fusti giacenti,
foglie lineari lanceolate acute. *Pers. Synops.* II p. 271. *Röhl. german.* II p. 378. *Schult. aust.* II p. 307. *Savi mat. med. t. 23.*

P. latifolia ec. ec. *Zann. Ven.* p. 214. t. 38.

P. major. *Bauh. Hist.* III p. 387.

Onobrychis secunda. *Dalech. Hist.* p. 491 cum icone.
Nasce comunemente in Campalto e Malghera; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

2. *P. monspeliaca.* (Französischer K) *P. di monpellier.*

Fiori in grappoli, crestati, ale calicine reticolate acute, più lunghe della corolla, fusto dritto, foglie lineari-lanceolate acute. *Pers. l. c. Röhl. l. c.*

P. acutioribus foliis, monspeliaca. *Zann. Ven. p. 215. t. 85.*

P. vulgaris coloris obsoleti foliis angustissimis. *Bauh. Hist.* III p. 388.

Onobrychis tertia. *Dalech. Hist.* p. 491 cum icone.
Nasce nel Lido nei luoghi montuosi, sterili; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

DECANDRIA

GENISTA. (Ginster) Ginestra.

Calice bilabbrato, tubuloso, col labbro superiore bidentato, l' inferiore tridentato. Vessillo bislungo piegato indietro. Legume subrotondo, compresso.

1. *G. tinctoria.* (Färber G.) *G. dei tintori.*

Foglie lanceolato-ovate glabre, rami tereti, striati,

dritti, inermi, legumi glabri. *Pers. Syn.* II p. 287.

Röhl. germ. II p. 381. *Schult. aust.* II p. 312.

G. tinctoria. *Zann. Ven.* p. 108. t. 165.

Tinctorius flos. *Bauh. Hist.* I p. 391.

Nasce in Campalto e Malghera nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Giugno sino Settembre, ed è pianta fruticosa.

2 *G. germanica.* (Deutscher G.) *G. germanica.*

Spini composti, rami fioriferi inermi, foglie ovate irsute quasi picciolate, fiori in grappoli terminali, nudi, carena pubescente, legumi quasi falciiformi villosi. *Pers. l. c.* p. 288. *Röhl. l. c.* p. 382. *Schult. l. c.* p. 314.

G. spartium. *Zann. Ven.* p. 108. t. 92.

G. aculeata foliosa. *Bauh. Hist.* I p. 399.

Nasce nei Treporti nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta fruticosa.

ONONIS. (Hauchechel) Ononide.

Calice 5-partito con lacinie lineari. *Vessillo* striato.

Filamenti connati. *Legume* gonfio sessile.

O. spinosa. (Dornige H.) *O. spinoso.*

Fiori ascellari, quasi binati, foglie terne, le superiori solitarie ellittico-lanceolate seghettate, quasi glabre, rami spinosi, villosi. *Pers. Syn.* II p. 289. *Röhl. german.* II p. 382. *Schult. aust.* II p. 315. *Savi mat. med.* t. 9.

Anonis spinosa. *Zann. Ven.* p. 17. t. 210.

A. s. resta bovis vulgaris purpurea. Bauh. Hist. II p. 391 cum icone aliena.

β floribus albis.

Anon. flore albo. Zann. Ven. p. 17.

A. s. resta bovis vulgaris alba. Bauh. Hist. II p. 391.

Nasce comunemente nei luoghi montuosi ed erbosi, β in Chioggia; fiorisce nei mesi di Giugno sino Agosto, ed è pianta fruticosa.

ANTHYLLIS. (Wundklec) Antillide.

Calice gonfio. Legume subrotondo coperto dal calice con 1-3 semi.

A. Vulneraria. (Gemeines W.) A. da ferite.

Erbacea, foglie pennate ineguali, con foglioline lanceolate, capolino doppio. Pers. Syn. II p. 292.

Röhl. germ. II p. 382. Schult. aust. II p. 317.

Vulneraria rustica. Zann. Ven. p. 281. t. 59. Bauh. Hist. II p. 362 icone.

Nasce nel Cavallino, Treporti ed intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Aprile sino Agosto, ed è pianta perenne.

LATHYRUS. (Platterbse) Latiro.

Stilo piano, peloso di sopra, allargato in cima. Calice con le due lacinie superiori più corte.

1. *L. pratensis.* (Wiesen P.) L. dei prati.

Riccio semplicissimo con due foglie lanceolate, stipole saettiformi, peduncoli multiflori. Pers. Syn.

II p. 305. Röhl. germ. II p. 388. Schult. aust. II p. 323.

L. Inteus sylvestris dumetorum. *Bauhin. Histor. II*
p. 304 cum icone.

Nasce nel luogo detto Aea bianca nei Prati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

Radice serpeggiante. Fusto rampicante, ramoso, con angoli scabri. Foglioline ellittico-lanceolate. Peduncoli con 8-12 fiori gialli. Vessillo con stria nere. Legumi dritti. Schult. l. c.

2. *L. Aphaca.* (Blattlose P.) L. senza foglie.

Ricci senza foglie, stipole grandissime saettiformi-cordate, peduncoli con un solo fiore. *Pers. l. c.*
p. 304. *Röhl. l. c. p. 386. Schult. l. c. p. 322.*

Aphaca. *Zann. Ven. p. 19.*

Vicia quae Pitine anguillarae. *Bauh. Hist II p. 316*
icon. p. 317.

Nasce negli Orti e nei luoghi coltivati, specialmente nell' Isola detta S. Giacomo del Paludo; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

VICIA. (Wicke) Veccia.

Stimma trasversalmente peloso. Calice di sopra smarginato bidentato, dalla parte inferiore con tre denti retti lunghi. Vessillo smarginato.

1. *V. polyphylla.* (Vielblättrige W.) V. a molte foglie.

Peduncoli con molti fiori, più lunghi delle foglie, fiori imbricati, foglioline lineari-lanceolate acute, pelose, stipole semisaettiformi lanceolate, interis-

sime: *Persoon Synops. II p. 306. Schult. aust. II p. 326.*

Nasce in Chioggia nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

Fusti giacenti tetragono-ancipiti. Piccioli con 6-10 paja di foglioline patenti lineari. Peduncoli eretti con fiori unilaterali nutanti. Calice violaceo obliquamente 5-dentato, con denti lesiniformi, con li due superiori più corti. Vessillo violaceo profondamente smarginato. Carena smarginata nella cima, lateralmente con una macchia violacea. Ale quasi della lunghezza del vessillo, celesti. Legumi bislungo-ovati nitidi nudi con 3-6 semi. Schult. l. c.

2. *V. Cracca.* (Vogel W.) *V. ucellaria.*

Peduncoli con molti fiori più lunghi delle foglie, fiori imbricati, foglioline lanceolate ottuse. Stipole semisaettiformi lineari-lesiniformi interissime. Pers. Syn. l. c. Röhl. germ. II p. 390. Schult. l. c. V. multiflora. Zann. Ven. p. 276.

V. multiflora perennis nemorensis s. dumetorum: Bauh. Hist. II p. 314.

Nasce nei Prati ed appresso le Siepi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

3. *V. sativa.* (Futter W.) *V. coltivata.*

Legumi quasi sessili e quasi binati dritti, foglie cuneiformi retuse, stipole incisodentate macchiate: Pers. Syn.

V. vulgaris sativa. Bauh. Hist. III p. 310.

Nasce fra le Biade in Campalto e nel luogo detto Monte dell'Oro; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

4. *V. angustifolia.* (Schmalblättrige W.) V. a foglie anguste.

Legumi sessili quasi solitarii patenti glabri, foglioline inferiori ovate, retuse, smarginate, le superiori lineari, interissime nella cima, stipole dentate, semi globosi. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 331.*

Nasce come la precedente.

CYTISUS. (Geisklee) Citiso.

Calice bilabbiato, col labbro superiore bidentato. Carena eretta. Legume assottigliato alla base, compresso.

C. purpureus. (Rother G.) C. purpureo.

Fiori ascellari solitarii pedunculati, fusti giacenti, foglioline ovate a rovescio repande, legumi lineari un poco repandi. *Pers. Syn. II p. 310. Röhling germ. II p. 394. Schult. aust. II p. 381.*

C. praecox spicatus rubello flore. Zann. Ven. p. 83. t. 10. fig. 2.

Nasce nel luogo detto Cortelazzo; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta fruticosa.

LIQUIRITIA. (Süssholtz) Regolizia.

Calice tubuloso eguale 5-partito. Vessillo eretto piegato. Ale patenti. Carena bifida. Legume bislungo glabro con 3-4 semi.

L. officinalis. (Gemcines S.) R. comune.

L. fogliol. impari petiolate. *Pers. Syn.* II p. 313.

Glycirhyza glabra. *L. Röhl.germ.* II p.397. *Schult. aust.* II p. 366.

Glyc. siliquosa sive germanica. *Zaun. Ven.* p. 115. t. 160.

Gl. repente radice. *Bauh. Hist.* II p. 328.

Glicirrhiza. *Matth.* p. 688 icone.

Nasce comunemente nel luogo detto San Giuliano vicino Malghera, e non lungi da Malamocco nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

CORONILLA. (Peltschen) Coronilla.

Calice bilabbiato. Petali unguiculati. Lomento terete articolato.

C. varia. (Bunte P.) *C. varia*.

Erbacea, foglioline molte, ovate a rovescio, lanceolate glabre, lomenti dritti eretti. *Pers. Syn.* II p. 314. *Röhl.germ.* II p. 412. *Schult. aust.* II p. 370.

Nasce nel Cavallino nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

Fusto tubuloso angolato striato giacente. Piccioli con 15-21 foglie ellittiche, ovate a rovescio, ottuse mucronate. Ombrelle con peduncoli lunghissimi, con 13-30 fiori rossastri.

HIPPOCREPIS. (Pferdehuf) Sferracavallo:

Lomento compresso, con una sutura più volte smarginata, curvo.

H. comosa. (Zopfförmiger P.) *S.* comune.

Legumi pedunculati conferti arcuati, con il margine esterno repando. *Pers. Syn.* II p. 315. *Röhl. germ.* II p. 411. *Schult. aust.* p. 371.

Ferum equinum germanicum Siliquis in summitate. *Zann. Ven.* p. 100. t. 72.

Ornithopodio affinis vel potius Solacee vel ferro equino herbae. *Bauhin. Hist.* II p. 348.

Nasce abbondevolmente nei luoghi arenosi nei Treporti; fiorisce nei mesi di Giugno sino Agosto, ed è pianta perenne.

GALEGA. (Geisraute) Galega.

Calice 5-dentato con denti quasi eguali lesiniformi. Legumi lunghi tereti torulosi.

G. officinalis. (Gemeine G.) *G.* officinale.

Foglie inegualmente pennate, con foglioline lanceolate mucronate glabre, stipole saettiformi. *Pers. Syn.* II p. 330. *Schult. aust.* II p. 383.

G. vulgaris. *Zann. Ven.* p. 106. t. 248.

Galega. *Bauh. Hist.* II p. 342 icon.

G. ovvero Capraria. *Matth.* p. 779 icon.

Nasce intorno Malghera nei Prati umidi ed appresso i Fossi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

ASTRAGALUS. (Traganth) Astragalo.

Carena ottusa. Legume di due cavità con la sutura inferiore piegata in dentro.

A. glycyphyllos. (Süsshholzblättriger T.) A. a foglie di Regolizia.

Fusto giacente, foglioline glabre ovate, mucronate, ottuse, stipole ovato-lanceolate, grappoli peduncolati più brevi delle foglie, legumi arcuati quasi triquetri. *Pers. Syn.* II p. 338. *Röhl. german.* II p. 398. *Schult. aust.* II p. 337.

Astragalus luteus perennis. *Zann. Ven.* p. 31.

Foenum graecum sylvestre. *Bauh. Hist.* p. 330.

Nasce nel Lido, Campalto e Malamocco nei luoghi secchi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

MELILOTUS. (Steinklee) Meliloto.

Calice tubuloso 5-dentato. *Carena* semplice più corta delle ale e del vessillo. *Legume* più lungo del calice, rugoso. *Fiori* in grappoli.

1. *M. officinalis*. (Meliloten S.) M. officinale.

Legumi nudi con due semi nudi, un poco rugosi, ovati, un poco compressi acuti. Stipole lesiniformi. Fusto dritto, carena ed ale della lunghezza del vessillo. *Pers. Syn.* II p. 348. *Röhl. germ.* II p. 402. *Schult. aust.* II p. 345.

Trifol. odoratum s. melilotus. *Bauh. Hist.* II p. 370.

Nasce comunemente in Campalto ed intorno Malghera nei Prati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta biennale.

2. *M. vulgaris*. (Gemeiner S.) M. volgare.

Legumi nudi, con un solo seme, rugosi, ovati a

rovescio, acuti, stipole setacee, fusto dritto. Ale più lunghe della carena e più corte del vessillo.

Röhl. l. c. Schult. l. c.

M. officinalis β. *L. Pers. l. c.*

M. alba maritima. Zann. Ven. p. 183 t. 104.

Nasce come la precedente.

3. *M. Kochiana*. (Kochs S.) *M. Cochiano*.

Legumi nudi, con due semi, quasi glabri, compressi, acuti, stipole dentate, fusto ascendente, ale della lunghezza della carena e più corte del vessillo. *Röhl. l. c. p. 405. Schult. l. c. p. 346.*

Nasce nei luoghi umidi, specialmente intorno Bron-dolo; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta biennale.

TRIFOLIUM. (Klee) Trifoglio.

Fiori in capolini. Legume coperto dal calice, evaluate, con 2-4 semi.

Calice glabro.

1. *T. hybridum*. (Bastard K.) *T. ibrido*.

Fiori in capolini umbellati, legumi con 2-4 semi, denti calicini quasi eguali, foglioline ovato-bislunghie, smarginate, seghettate, fusto ascendente. Pers. Syn. II p. 348. Röhl. germ. II p. 405. Schult. aust. II p. 349.

T. elegans. Savi obs. p. 92. [Schult.]

Nasce nel Lido, e specialmente in Chioggia nei luoghi erbosi e nei Prati; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

2. *T. repens*. (Kriechender K.) T. serpeggiante.
 Fiori in capolini umbellati, legumi con 3-4 semi,
 denti superiori del calice più corti, foglioline o-
 vato bislunghe, smarginate, seghettate, fusto ser-
 peggiante. *Pers. Syn. l. c. p. 349. Schult. loc. cit.*
p. 350. Röhl. l. c. p. 404. Savi obs. p. 86.
 T. pratense album. *Zann. Ven. p. 265.*
 T. pratense flore albo minus, et foemina glabrum.
Bauh. Hist. II p. 380.
Nasce comunemente nei luoghi erbosi; fiorisce nei
mesi di Maggio sino Settembre, ed è pianta pe-
renne.

Calici villosi.

3. *T. pratense*. (Wiesen K.) T. dei prati.
 Spighe unite ovate, quasi doppie, cinte da due sti-
 pole opposte membranacee, calice col dente infi-
 mo, più corto del tubo della corolla monopetala,
 ineguale, stipole restate, foglioline ovali-smargi-
 nate interissime macchiate, fusto ascendente. *Per-*
soon l. c. p. 350. Röhl. l. c. p. 405. Schult. l. c.
p. 352. Savi obs. p. 49.
 T. pratense flore monopetalo. *Zann. Ven. p. 264.*
t. 185.
 T. purpureum vulgare. *Bauh. Hist. II p. 374.*
 Trifoglio dei prati. *Matth. p. 883 icone.*
Nasce come la precedente.
4. *T. angustifolium*. (Schmalblättriger K.) T. a foglie
 sottili.

Spighe villose conico-bislunghe, calice con denti setacei, quasi eguali, foglioline lineari-lanceolate acute, fusto dritto. *Pers.Syn. p. 351. Röhl. germ. II p. 406. Schult. aust. II p. 357. Savi obs. p. 58.*

T. alopecurum angustifolium elatum. Barrel. icon. t. 699.

Nasce in Chioggia nei luoghi erbosi ed asciutti; fiorisce il mese di Giugno, ed è pianta annuale.

5. *T. arvensis.* (Acker K.) *T. arvense:*

Spighe villosissime quasi cilindriche, calice con denti setacei più lunghi della corolla, foglioline ovate a rovescio-lineari. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 358. Savi obs. p. 17.*

T. arvense humile spicatum. Zann. Venet. p. 264. t. 147.

Lagopus vulgaris trifolius quorumdam; Bauh. Hist. II p. 377.

Lagop. vulgaris Fuchsi. Dalech. Hist. Lugd. p. 444.

Lagop. angustifolia minor erectior. Barrel. ic. t. 901.

Lagopo. Matth. p. 1036 icone.

Nasce come la precedente; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

Calici gonfi ventricosi,

6. *T. fragiferum.* (Erdbeeren K.) *T. fragifero:*

Capolini subrotondi, calici gonfi bidentati, richinati, fusti serpeggianti, foglioline ovate a rovescio, retuse. *Pers. l. c. Schult. l. c. p. 361. Röhl. l. c. p. 408. Savi obs. p. 76.*

T. fragiferum nostras, purpureum, folio oblongo.
Zann. Ven. p. 266.

T. caule nudo glomerulis glabris. I. Bauhin. Histor.
p. 379.

T. fragiferum minus oblongo capite italicum. Barr.
ic. t. 851, et 852.

Nasce abbondevolmente intorno Malghera nei Prati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

Vessilli piegati in dentro.

7. *T. campestre*: (Feld K.) *T. campestre.*

Spighe ovate imbricate, vessillo persistente declinato, foglioline, ovate a rovescio, ottuse, quella di mezzo picciolata, fusto diffuso. *Persoon loc. cit. Röhl. l. c.*

T. procumbens. Schult. l. c. p. 364.

T. agrarium. Savi obs. p. 103.

Nasce in Chioggia nei Prati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

8. *T. agrarium.* (Goldfarbener K.) *T. agrario:*

Spighe ovali imbricate, vessilli persistenti piegati in dietro, calice con denti glabri, ineguali, foglioline lanceolate cuneate, con quella di mezzo sessile, stipole lanceolate, fusto dritto semplice. *Persoon l. c. Röhl. l. c. p. 405. Schult. aust. p. 362. Savi obs. p. 108.*

T. pratense luteum foemina, flore pulchriore s. lupulino? Bauh. Hist. II p. 381. (Savi)

Nasce in Campalto nei Prati; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

LOTUS. (Schotenklee) Loto.

Calice tubuloso. Ale conniventi longitudinalmente dal lato superiore. Filamenti cuneiformi. Legume bislungo terete, dritto.

1. *L. siliquosus*. (Wiesen S.) L. dei prati.

Legumi solitarii membranaceo-quadrangoli, fusti giacenti, foglie nella pagina inferiore pubescenti.

Pers. Syn. II p. 353. Röhl. germ. p. 396.

L. pratensis ec. ec. *Zann. Ven. p. 171. t. 164.*

L. siliquosa lutea mouspeliensis. Bauhin. Histor. II p. 359.

β *L. maritimus*. Foglie glabre. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Nasce nei luoghi umidi, β salsi; fiorisce nei mesi di Maggio sino Agosto, ed è pianta perenne.*

2. *L. corniculatus*. (Gemeiner S.) L. comune.

Capolini depressi, fusti giacenti, legumi cilindrici patenti. *Pers. l. c. p. 354. Röhl. l. c. p. 395. Schult. l. c. p. 384.*

L. s. Melilotus pentaphyllos. Zann. Venet. p. 170. t. 280.

L. corniculata glabra major. Bauh. Hist. II p. 356.

Nasce nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

DORYCNIUM. (Halbklee) Doricnio.

Calice 5-dentato bilabbiato. Filamenti lesiniformi.

Stimma capitato. Legume un poco maggiore del calice, gonfio, con 1-2 semi.

D. fruticosum. (Strauchartiger H.) D. fruticoso.
Foglioline lineari lanceolate acute. *Pers. Synops.* II
p. 354.

Lotus Dorycnium. *L. Sp. pl.*

Nasce in Campalto e non lungi da Cortelazzo nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta fruticosa.

MEDICAGO. (Schneckenklee) Medica.

Legume compresso avvolto in spira. *Carena* discosta dal vessillo.

1. *M. sativa*. (Luzerner S.) M. coltivata.

Peduncoli racemosi, legumi liscii spiralmemente contorti, stipole interissime, foglie bislunghe dentate. *Pers. Syn.* II p. 356. *Röhl. germ.* II p. 414. *Schult. aust.* II p. 371.

Medica major erectior floribus purpurascens. *I. Bauh. Hist.* II p. 382. *Zann. Ven.* p. 181. t. 124.
Nasce comunemente nei Prati, specialmente in San Niccolò di Lido; fiorisce nei mesi di Giugno sino Ottobre, ed è pianta perenne.

2. *M. falcata*. (Sichel S.) M. falciforme.

Peduncoli racemosi, legumi contorto-falciformi pubescenti, foglioline cuneiformi smarginate, seghettate nella cima, fusto giacente. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.* p. 372.

Nasce intorno Malghera e Campalto nei Prati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

3. *M. Lupulina.* (Hopfenartiger S.) *M. Lupulina*:
Spighe ovali, legumi reniformi monospermi, fusti giacenti. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 373.*
β foglie e fusto pubescenti.

Nasce comunemente in Campalto e negli Orti; β intorno Malghera nei Prati; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta biennale.

4. *M. maculata.* (Gefleckter S.) *M. macchiata.*
Peduncoli 2-4 fiori, legumi spirali compressi, aculei curvi, arcuati, foglie ovate a rovescio, dentate nella cima. *Pers. l. c. p. 357.*

Nasce nei luoghi montuosi nel Lido ed in Chioggia; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

Fusti giacenti, alla base ramosi, angolati, villosi: Piccioli lunghissimi, superiormente scanalati. Foglioline cordate a rovescio, glabre, con una macchia nera nel mezzo. Stipole dentate acuminate con denti acuti ineguali. Peduncoli ascellari con 2-6 fiori aurei.

5. *M. coronata*: (Geckrönter S.) *M. coronata.*
Peduncoli con molti fiori, legumi spirali cilindrici, piani nelle due parti, pubescenti, aculei distichi, strettamente appoggiati lesiniformi, stipole dentate alla base, foglioline cordate a rovescio, dentate, *Pers. l. c.*

Medica coronata Cherleri parva. *Bauhin. Hist.* II
p. 386 icon.

*Nasce nel Lido ed in Chioggia nei luoghi asciutti;
fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta
annuale.*

6. *M. marina*. (Meerstrands S.) *M. marino*:

Tomentosa, peduncoli con molti fiori, legumi spirali subrotondi muricati, stipole indivise, foglie ovate a rovescio, interissime. *Pers. l. c. Röbling. germ.* II p. 413.

M. lutea gnaphalitea ec. ec. *Zann. Ven.* p. 181. t. 62.

Trifol. cochleatum marinum ec. ec. *Bauhin. Hist.* II
p. 383.

Nasce abbondevolmente nei luoghi arenosi, specialmente nel Lido; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

7. *M. rigidula*. (Steifer S.) *M. rigida*.

Peduncoli con molti fiori, legumi spirali cilindrici, con spini conici dritti patenti, stipole dentate, foglioline ovate a rovescio, dentate. *Pers. loc. cit.*
p. 358. *Röhl. germ.* II p. 413.

Medica hirsuta echinis rigidioribus. *Bauhin. Hist.* II
p. 385. *Zann. Ven.* p. 182.

*Nasce nel Lido e nei Treporti nei luoghi arenosi;
fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta
annuale.*

M. minima β (Kleinster S.) *M. minima*.

M. (polymorpha λ hirsuta) Peduncoli con molti fio-

ri, legumi spirali con spini oncinati, stipole interissime, foglioline ovate a rovescio, dentate nella cima. *L. Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. aust. II p. 375.*

Medica echinata hirsuta. *Bauh. Hist. II p. 386.*
Nasce come la precedente.

POLYADELPHIA vedi POLYANDRIA

SYNGENESIA

AEQUALIS.

† *Semiflosculosi s. ligulati.*

TRAGOPOGON. (Bocksbart) Tragopogo,
Ricett. nudo. Calice semplice di molte foglie. Pappo
piumoso stipitato.

T. pratense. (Wiesen B.) T. dei prati.
 Calici eguali al raggio della corolla, foglie intere
 drittissime. *Pers. Syn. II p. 359. Röhl. german. II*
p. 431. Schult. aust. II p. 402.

T. flore luteo. *Bauh. Hist. II p. 1058.*
Nasce comunemente intorno Malghera nei luoghi
montuosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio,
ed è pianta biennale.

SONCHUS. (Gänsedistel) Sonco.

Calice imbricato ventricoso. Ricett. nudo. Pappo peloso sessile,

1. *S. maritimus*. (Seerstrands G.) S. marino.

Peduncoli quasi solitarii terminali nudi, foglie lanceolate abbraccianti il fusto indivise, seghettate all'indietro con denti acuti. *Persoon. Synops. II p. 362.*

Nasce nei luoghi umidi in Campalto, Malghera, e Treporti: ed in Malamocco appresso il mare; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *S. oleraceus*. (Gemüseartige G.) S. oleraceo.

Peduncoli quasi tomentosi umbellati, calice glabro, foglie dentate abbraccianti il fusto, intere e runcinate pennatofesse, semi dentellati nel margine. *Pers. Syn. II p. 363. Röhl.germ. II p. 425. Schult. aust. II p. 451.*

S. laevis minor, paucioribus laciniis. Zann. Venet. p. 250.

Nasce negli Orti; fiorisce nei mesi di Giugno sino Dicembre, ed è annuale.

3. *S. asper*. (Scharfe G.) S. aspro.

Peduncoli quasi tomentosi umbellati, calice glabro, foglie dentate abbraccianti il fusto intere e runcinate, pennatofesse, semi striati glabri. *Röhl.germ.*

S. asper laciniatus et non laciniatus. Zann. Ven. p. 250. t. 196.

Nasce come la precedente.

LACTUCA. (Sallat) Lattuca:

Calice imbricato cilindrico, membranaceo nel margine. Ricett. nudo. Pappo semplice stipitato.

1. *L. Scariola.* (Wilder S.) *L. selvatica*:

Foglie verticali, con la carena aculeata, acute, saettiformi alla base, runcinato-pennatofesse. *Pers. Syn.*

II p. 364. Röhl. germ. II p. 425. Schult. aust. II p. 424. Endivia major ec. ec. Barrell. ic. t. 135.

L. sylvestris s. *Endivia multis dicta* folio laciniato, dorso spinoso. *Bauh. Hist. II p. 1003 icon.*

Nasce abbondevolmente nei terreni di Santa Marta; fiorisce nei mesi di Giugno sino Agosto, ed è pianta annuale.

2. *L. saligna.* (Weidenblättriger S.) *L. a foglie di salice.*

Foglie con carena più o meno aculeata, le radicali lanceolate pennatofesse, quelle del fusto lineari, interissime, saettiformi. *Pers. Syn. l. c. p. 365. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 425.*

Endivia minor lactucina spinosa. Barr. icon. t. 136.

Nasce intorno Malghera nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

CHONDRILLA. (Knorpelsalat) Condrilla:

Calice calicolato. Ricett. nudo. Pappo stipitato peloso. Semi muricati.

C. juncea. (Binsenartiger K.) *C. giunciforme*.

Foglie radicali runcinate, quelle del fusto lineari interissime. *Pers. Syn.* II p. 365. *Röhl. germ.* II p. 427. *Schult. aust.* III p. 421.

Ch. viminea. *Bauh. Hist.* II p. 1021 icon.

Nasce nel lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

LEONTODON. (Löwenzahn) Dente di leone:

Calice doppio. Ricettacolo nudo. Pappo stipitato piumoso.

1. *L. Taraxacum*. (Gemeiner L.) *D. comune*.

Calice con le squamme esterne richinate, scapo con un solo fiore, foglie runcinate glabre, con lacinie lanceolate dentate. Pers. Syn. II p. 367. *Röhling germ.* II p. 428. *Schult. aust.* II p. 405.

Dens leonis latiore folio. Zann. Ven. p. 85.

Hedypnois sive Dens Leonis Fuchsi. Bauh. Hist. II p. 1035.

Hedypnois. Fuchs Hist. p. 681.

Nasce comunemente nei Prati e fra Sassi; fiorisce nei mesi di Marzo sino Novembre, ed è pianta perenne.

2. *L. palustre*. (Sumpf L.) *D. paludoso*.

Calice con le squamme esterne appoggiate, ovate, scapo con un solo fiore, foglie lanceolate sinuato-dentate, glabre. Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 406 sub L. livid.

Nasce in Campalto nei luoghi erbosi ed umidi; fio-

risce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

APARGIA. (Pfaffenröhrlein) Apargia.

Calice imbricato. Ricettacolo nudo. Pappo sessile piumoso.

A. hastilis. (Glattes P.) *A. glabra.*

Scapo nudo con un solo fiore, glabro, striato, foglie lanceolate runcinato-dentate glabre. *Pers. Syn.* II p. 367. *Röhl. german.* II p. 429. *Schult. aust.* II p. 468.

Dens Leonis glaber angustiore et longiore folio flore minore. *Zann. Ven.* p. 87.

Nasce nel Cavallino e Treporti nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Giugno sino Ottobre, ed è pianta perenne.

PICRIS. (Bitterkraut) Amaria:

Calice calicolato. Ricettacolo nudo. Pappo piumoso quasi sessile. Semi striati trasversalmente.

P. hieracioides. (Habichtskrautartiges B.) *A. commun.*

Fusto dritto scabro, foglie lanceolate, dentate, abbraccianti il fusto, fiori corimbose, peduncoli squammosi. *Pers. Syn.* II p. 370. *Röhl. germ.* II p. 430.

Hieracium asperum majore flore in agrorum limitibus. *Bauhinus Hist.* II p. 1029.

Nasce comunemente in Campalto, Fusina e Malghe-

ra nei luoghi montuosi ed asciutti; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

HIERACIUM. (Habichtskraut) Ieracio.

Calice ovato imbricato. Ricettacolo nudo. Pappo semplice sessile.

1. *H. Pilosella.* (Gemeines H.) I. Pelosella.

Scapo nudo peloso, con un solo fiore, foglie ovate interissime, nella pagina inferiore tomentose, stoloni serpeggianti. *Pers. Syn.* II p. 371. *Röhl. germ.* II p. 418. *Schult. aust.* II p. 428.

Pilosella majori flore sive vulgaris repens. *Bauhin. Historia* II p. 1039 cum icone.

Nasce intorno Malghera nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *H. florentinum.* (Florentiner H.) I. fiorentino.

Scapo folioso, un poco glabro, con molti fiori corimbose, peduncoli proprj divaricati, calici irti, foglie lanceolato-lineari interissime. *Pers. loc. cit.* *Röhl. l. c.* p. 419. *Schult. l. c.* p. 432.

Nasce come la precedente.

3. *H. cymosum.* (Vielblumis H.) I. cimoso.

Scapo quasi nudo, peloso alla base, multifloro, fiori quasi umbellati, foglie bislunghe, lanceolate intere. *Pers. l. c.* *Röhl. l. c.* *Schult. l. c.*

H. Pilosellae folio erectum majus, Zann. Ven. p. 130.
t. 150. fig. 2.

Pilosella mineri flore, hirsutior et elatior non repens. Bauh. Hist. II p. 1040.

Nasce nel Cavallino nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

CREPIS. (Pippau) Crepide.

Calice calicolato con squamme caduche. Ricettacolo nudo. Pappo peloso stipitato.

1. *C. pulchra*: (Schöner P.) *C. glutinosa*. Savi.

Foglie radicali runcinate, quelle del fusto ovato-lanceolate saettiformi alla base, pannocchia corimbosa divaricata nuda: *Prenanthes hieracifolia*. Pers. Syn.

Hieracium pulchrum. Bauh. Hist. II p. 1024 cum icone.

Nasce, benchè di rado, intorno Malghera; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

2. *C. foetida*: (Stinkender P.) *C. fetida*:

Foglie runcinato-pennatofesse irte, piccioli dentati, quelle della sommità alla base profondamente intagliate, calici ovati pelosi angolati. Pers. Syn. II p. 376. Röhl. germ. II p. 427 sub *Wibelia*. Schult. aust. II p. 416.

Nasce non lungi dagli Alboroni nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Giugno sino Agosto, ed è pianta annuale.

3. *C. virens*. (Grüner P.) C. verdastro.

Foglie glabre, le inferiori dentate, con denti distanti, le superiori quasi interissime, quasi saettiformi, fusto ramoso alla base, diffuso, calici pubescenti. *Pers. l. c. Röhl. l. c. sub C. pinuatifida. Schult. aust. II p. 420.*

Hierac. luteum hirsutum. Bauh. Hist. II p. 1024 cum icone.

Nasce in Campalto e Malghera nei Prati e luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

HYPOCHAERIS. (Ferkelkraut) Ipocheride.

Calice quasi imbricato. Ricettacolo paleaceo. Pappo piumoso.

H. radicata. (Aestiger F.) I. ramosa.

Fusto ramoso liscio, foglie runcinate ottuse scabre, peduncoli squammosi. *Pers. Syn. II p. 348. Röhl. germ. II p. 434. Schult. aust. II p. 401.*

Hieracium dentis leonis folio. Zann. Ven. p. 141. t. 121.

Hier. macrocaulon junceum sive miuus primum. Bauh. Hist. II p. 1031 icone.

Nasce nei Prati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

LAPSANA. (Rainkohl) Lassana.

Calice quasi calicolato, con ciascuna squamma interna, scanalata. Ricettacolo nudo. Pappo nessuno.

L. communis. (Gemeiner R.) L. comune.

Foglie ovate picciolate angolato-dentate, peduncoli tenui ramosissimi. *Pers. Syn.* II p. 348. *Röhl. germ.* II p. 416. *Schult. aust.* II p. 454.

Lampsana. *Zann. Ven.* p. 159.

Lapsana Dodonaei. *Bauh. Hist.* II p. 1028.

Nasce negli Orti e nei luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

CICHORIUM. (Wegwarte) Cicorea.

Calice calicolato. Ricettacolo quasi paleaceo. Pappo polifillo paleaceo.

C. Intybus. (Gemeine W.) C. comune.

Fiori ascellari gemelli, quasi sessili, foglie runcinate. *L. Pers. Syn.* II p. 379. *Röhl. germ.* II p. 434. *Schult. aust.* II p. 399.

C. sylvestre s. officinarum. *Zann. Ven.* p. 65.

C. sylvestre et sativum. *Bauhin. Hist.* II p. 1007 cum icone.

Cichorea selvetica. *Matth.* p. 532 icon.

β *C. alba.* Fiori bianchi. *Pers. l. c.*

Nasce comunemente nei luoghi montuosi e sassosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

SCOLYMUS. (Golddistel) Scolimo.

Calice imbricato spinoso, circondato da foglioline spinose. Ricettacolo paleaceo. Pappo o.

S. aggregatus. (Gehäufter G.) S. ammuchciato.

Fiori ammucchiati, semi papposi.

S. hispanicus. *Pers. Syn.* II p. 380. *Savi Bo. Etrusc.*

S. chrysanthemos. *Zann. Ven.* p. 240. t. 175.

Spina lutea. *Bauh. Hist.* II p. 84.

Nasce in tutte le Spiagge arenose, e specialmente in quella del Lido; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

†† *Floribus flosculosis*.

CARTHAMUS. (Saffor) Cartamo.

Calice imbricato con squamme subovato-fogliacee.

Ricettacolo paleaceo-setoso. Pappo paleaceo.

C. lanatus. (Wolliger S.) *C. lanuto*.

Fusto lanoso, foglie inferiori pennatofesse, dentate, quelle della sommità abbraccianti il fusto pennatofesso-dentate spinose. Pers. Syn. II p. 380. Röhl. germ. II p. 435.

Trovasi, benchè di rado, in Campalto nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

ARCTIUM. (Klette) Personata.

Calice globoso con squamme uncinatoe. Ricettacolo paleaceo. Pappo setoso-paleaceo.

A. glabrum. (Glatte K.) *P. glabra*,

Foglie del fusto cuoriformi picciolate, dentellate, calici glabri. A. Lappa. L. Pers. Syn. II p. 383.

Röhl. germ. II p. 456. Schult. aust. II p. 457.

Lappa major s. Arctium Dioscoridis. Zann. Venet. p. 160. t. 257.

Personata s. Lappa major aut Bardana: *Bauh. Hist.*
II p. 570 icon.

Personata maggiore. *Matth.* p. 1213.

Nasce in Campalto e Malghera nei luoghi asciutti ed umidi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta biennale.

CARDIUS. (Distel) Cardo.

Calice imbricato, ventricoso, con squamme spinose.

Ricettacolo villosa. Pappo capillare.

1. *C. nutans.* (Hängende D.) *C. pendente.*

Foglie scorrenti lanceolate sinuate spinose, fiori solitarii richinati, calice con squamme patenti.

Pers. Synops. II p. 384. *Röhl. germ.* II p. 437.

Schult. aust. II p. 467.

C. nutans. *Bauh. Hist.* III p. 57. ic. *Zann. Ven.* p. 50. t. 162.

Nasce nei Rovinazzi, specialmente nel Lido ed in Fusina; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta biennale.

2. *C. acanthoides.* (Krebsdistelartige D.) *C. acanthoide.*

Foglie scorrenti sinuato-spinose, calici globosi quasi pedunculati, squamme lineari ritorte. *Pers. l. c.*

p. 385.

C. acanthoides. *Bauh. Histor.* III p. 56.

Nasce nel Lido nei luoghi arenosi ed asciutti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale e biennale.

3. *C. Marianus*. (Marien D.) *C. macchiato*.

Foglie sessili abbraccianti il fusto, astato-pennatofesse spinose, calici affili, con spini scanalati, raddoppiato-spinosi. *Pers. l. c. p. 386. Röhl. l. c. p. 439. Schult. l. c. p. 474.*

C. albis maculis notatus vulgaris. Zann. Ven. p. 51.

C. marianus sive lacteis maculis notatus. Bauhinus Hist. III p. 52 cum icone.

Nasce nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

CNICUS. (Kratzkraut) Cnico.

Calice imbricato ventricoso, con squamme spinose.

Ricettacolo villosa. Pappo piumoso.

1. *C. lanceolatus*. (Lanzettblättriges K.) *C. lanceolato*.

Foglie scorrenti ispide pennatofasse, con lacinie bilobe divaricate spinose, calici ovati aranoideo-pubescenti, squamme lanceolate, spinose patenti. *Pers. Syn. II p. 387. Röhl. germ. II p. 439. Schult. aust. II p. 459.*

C. lanceatus latifolius. Zann. Ven. p. 50.

C. lanceolatus s. sylvestris Dodonaei. Bauh. Hist. III p. 58 cum icone.

Nasce nei Rovinazzi e nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta biennale.

2. *C. arvensis*. (Acker K.) *C. dei campi*.

Foglie sessili pennatofesse spinose, fusto panicolato,

calici ovati spinosi. *Pers. Syn.* II p. 388. *Röhl. l. c. p.* 442. *Schult. l. c. p.* 467.

Carduus serpens laevicaulis. *Bauh. Hist.* III p. 59 cum icone.

Nasce come la precedente, e specialmente nei terreni di Santa Marta; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

SERRATULA. (Scharte) Serratola.

Calice imbricato cilindrico inerme. Ricettacolo paleaceo o peloso. Pappo peloso rigido, persistente.

S. tinctoria. (Färber S.) S. dei tintori.

Foglie lirato-pennatofesse, colla pennola terminale granda, acutamente seghettate, fiori in corimbi fastigiati. *Pers. Syn.* II p. 118. *Röhl. l. c. p.* 435. *Schult. aust.* II p. 454.

Serratula. *Bauh. Hist.* III p. 23 icon.

Nasce abbondevolmente nei luoghi umidi nei Treporti e nel Cavallino; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

BIDENS. (Zweizahn) Bidente.

Calice quasi eguale calicolato, qualche volta pochi semiflosculi nel raggio. Ricettacolo paleaceo piano. Pappo con due reste scabre. Semi tetragoni.

B. tripartita. (Dreitheiliger Z.) B. tripartito.

Fiori discoidei, calice esterno maggiore dei fiori, semi dritti, foglie tripartite, con lacinie lanceolate,

dentate. *Pers. Syn.* II p. 393. *Röhl. german.* II p. 443. *Schult. aust.* II p. 476.

B. foliis tripartito divisis. *Zann. Ven.* p. 38.

Verbesina s. Cannabina aquatica, flore minus pulchro elatior ac magis frequens. *Bauh. Hist.* II p. 1073.

Nasce comunemente intorno Malghera nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta annuale.

EUPATORIUM. (Wasserdost) Eupatorio.

Calice imbricato bislungo. Stilo lungo semibifido.

Ricettacolo nudo. Pappo peloso o scabro.

1. *E. cannabinum.* (Hanfartiger W.) E. canapino.

Foglie picciolate tripartite, con lacinie lanceolate seghettate, delle quali quella di mezzo più lunga, calice con 5-6 fiori. *Pers. Synops.* II p. 400.

Röhl. germ. II p. 443. *Schult. aust.* II p. 477.

E. cannabinum. *Zann. Ven.* p. 97. t. 7.

E. adulterium. *Bauh. Hist.* II p. 1065.

Eupatorio comune. *Matth.* p. 1069.

Nasce nei luoghi acquosi ed umidi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

CHRYSOCOMA. (Goldhaar) Comaurea.

Calice imbricato emisferico. Stilo appena più lungo dei fioretti. Ricettacolo nudo. Pappo semplice.

C. Lynosiris. (Deutsches G.) C. a foglie di lino.

Erbacea, foglie lineari glabre, calici lassi. *Pers. Syn.* II p. 405. *Röhl. germ.* II p. 443. *Schult. aust.* II p. 477.

Conyza linariaefolia ec. ec. *Zann. Ven. p. 73. t. 71.*
Heliochrysos Tragi sive Linaria tertia. Bauh. Hist.
 III p. 151 cum icone.

Nasce nei Treporti nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne. Fusto alto 2-3 piedi, dritto, duro, un poco scabro, quasi semplice. Foglie patenti un poco scabre. Fiori terminali corimbose aurei. Peduncoli laterali, più alti del fusto, fogliosi, ingrossati in cima. Calice con foglioline lineari-setacee.

SUPERFLUA

TANACETUM. (Rheinfarn) Tanaceto.

Calice imbricato emisferico con squamme acuminatè. Corollette del raggio obsoletamente trifide. Ricettacolo nudo. Pappo quasi marginato.

1. *T. vulgare.* (Gemeiner R.) T. volgare.
 Foglie bipennate, con foglioline intagliate seghettate. *Pers. Syn. II p. 409. Röhl. germ. II p. 444. Schult. aust. II p. 487.*
T. vulgare luteum. Zann. Ven. p. 257. t. 283.
T. vulgare flore luteo. Bauh. Hist. III p. 131.
Nasce in Cortelazzo ed in Chioggia nelle Strade; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

ARTEMISIA. (Beyfuss) Artemisia.

Calice imbricato, con squamme rotodate conni-

venti. *Corolla* del raggio o. *Piccattacolo* quasi nudo. *Pappo* nessuno.

A. Abrotanum. (Stabwurz B.) *A. abrotano.*

Fruticosa, fusto drittissimo, foglie inferiori bipennate, le superiori pennate sottili, calici pubescenti emisferici. *Pers. Syn.* II p. 409.

Trovasi, benchè di rado, nei Treporti e nel Cavalino nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta fruticosa.

2. *A. paniculata.* (Rispenartiger B.) *A. paucolata.*

Fusti numerosi suffruticosi dritti, foglie moltosesse setacee, calici glabri emisferici. *Pers. Syn.* l. c.

Ab. mas angustifolium majus. Zannich. Ven. p. 1. tab. 30.

Ab. vulgare. Bauh. Hist. III p. 192 cum icone.

♂ *Ab. mas angustifolium minus. Zann. Ven. p. 2.*

Abrot. cum pulchris corimbis. Bauh. Hist. III p. 194.

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta fruticosa.

3. *A. campestris.* (Feld B.) *A. dei campi.*

Foglie del fusto setacee, pennate glabre, le radicali pennate, con lacinie trifide incane, fusto giacente vergato ramoso, fiori ovati pedunculati. *Pers. loc. cit.* p. 410. *Röhl. germ.* II p. 448. *Schult. aust.* II p. 482.

Abr. campestre caulibus rubentibus. Zannich. Ven. p. 3.

Nasce non lungi da Brondolo nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

Ricettacolo nudo. *Pers. l. c.*

4. *A. vulgaris.* (Gemeiner B.) *A. volgare.*

Foglie pennatofesse piane intagliate. con la pagina inferiore tomentosa, grappoli semplici ritorti, calici tomentosi, raggio dei fiori 5-floro. *Pers. l. c. p. 413. Röhl. loc. cit. p. 449. Schult. aust. II p. 485.*

A. caulae et flore purpurascens. Zann. Ven. p. 21. t. 237.

A. vulgaris. Bauh. Hist. III p. 184.

Nasce comunemente nei Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

5. *A. caerulea.* (Bläulicher B.) *A. cerulea.*

Foglie incane lanceolate interissime, le radicali intagliate, fiori bislungi pedunculati nutanti. *Pers. l. c. Röhl. l. c.*

Scriphium marinum lavendulae folio. Zann. Ven. p. 245. t. 156.

Absinthium marinum latifolium Mathioli. Bauhin. Hist. III p. 174 icon.

Assenzo marino. *Matth. p. 725 icon.*

β Più cerulea, con rami richinati. *Nob.*

Nasce comunemente nei terreni salsi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

GNAPHALIUM. (Ruhrkraut) Gnafalio.

Calice imbricato, con le squamme marginali roton-

date, scariose, nitide, colorate. *Ricettacolo* nudo.
Pappo peloso o piumoso.

G. luteo-album. (Gelblichweisses R.) G. giallo-bianco.
 Erbacea, foglie abbraccianti mezzo fusto lineari-lanceolate, quasi ondate come il fusto, tomentose.
Pers. Syn. II p. 420. *Röhl. germ.* II p. 445. *Schult. aust.* p. 488.

Chrisocome citrina latifolia italica: *Barrel. ic.* p. 88.
 t. 367.

Gnaphal. ad stoechadem citrinam accedens. *Bauhin. Hist.* III p. 160.

Nasce intorno Chioggia nei luoghi arenosi; fiorisce il mese di Luglio, ed è pianta annuale.

CONYZA. (Dürrwurz) Conisa.

Calice imbricato con squamme patenti. *Corolle* del raggio trifide. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* semplice capillare.

C. squarrosa. (Gemeine D.) C. volgare.

Calici squarrosi, fusto erbaceo corimbo, foglie lanceolate acute seghettate scabre. *Pers. Syn.* II p. 426. *Röhl. german.* II p. 444. *Schult. aust.* II p. 487.

Conyza major vulgaris. *Zann. Ven.* p. 72. t. 245.

C. major Matthioli, *Baccharis quibusdam*. *Bauhin. Hist.* II p. 1050.

Nasce nei luoghi asciutti e nei muri; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta biennale.

ERIGERON. (Berufkraut) Erigero.

Corolla con li fioretti del raggio lineari sottilissimi.

Ricettacolo nudo. *Pappo* peloso.

1. *E. canadense*. (Gemeines B.) E. di canadà.

Fusto ramosissimo irto, fiori in pannocchia, foglie lineari-lanceolate ciliate. *Pers. Synops.* II p. 430.

Röhl. germ. II p. 454. *Schult. aust.* II p. 510.

Virga aurea virginiana annua. *Zann. Ven.* p. 279.

Nasce in ogni luogo nella città; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta annuale.

2. *E. diversifolium*. (Verschiedenblättriges B.) E. diversifoglio.

Foglie inferiori ovate seghettate, le superiori lanceolate un poco pelose, calici emisferici, con lacinie quasi eguali strigose. E. annuum. *Pers. l. c.* p. 431.

Aster annuus. *Röhl. germ. Schult. aust.*

Nasce intorno Malghera e nell' Aca bianca; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale e biennale.

3. *E. acre*. (Scharfes B.) E. scabro.

Peduncoli alterni uniflori, foglie lineari-lanceolate, fusto ramoso peloso. *Pers. loc. cit. Röhl. loc. cit. Schult. l. c.*

Aster arvensis caeruleus acris. *Zann. Venet.* p. 27. t. 10. f. 1.

Senecio s. Erigeron caeruleus, aliis. Conyza caerulea. *Bauh. Hist.* II p. 104.

Nasce in Cortelazzo nei luoghi erbosi: fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è annuale e perenne.

SENECIO. (Kreutzkraut) Senecio.

Calice cilindrico calicolato, con squamme sfaccellate nella cima. Ricettacolo nudo. Pappo semplice.

1. *S. vulgaris*. (Gemeines K.) S. comune.

Corollette nude, foglie abbraccianti il fusto pennatofesse, dentate, fiori in pannocchie corimbose. Pers. Syn. II p. 433. Röhl. germ. II p. 456. Schult. aust. II p. 518.

S. minor vulgaris. Zann. Ven. p. 244.

S. vulgaris sive Erigeron. Bauh. Hist. II p. 1041 sine icone.

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Gennaio sino Dicembre, ed è pianta annuale.

2. *S. Jacobaea*. (Jacobs K.) S. giacomeo;

Raggio patente, foglie lirato-bipennatofesse divaricate, dentate glabre, fusto dritto. Pers. l. c. p. 435. Röhl. l. c. p. 458. Schult. aust. p. 523.

Jacobaea vulgaris. Bauh. Hist. II p. 1057.

Nasce comunemente intorno Malghera nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

3. *S. aquaticus*. (Wasser K.) S. acquatico.

Raggio patente, fioretti ellittici, foglie inferiori ova-

te a rovescio intere, quelle del fusto lirate seghettate, semi glabri. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult; loc. cit.*

Jacobaea latifolia. *Bauh. Hist. II p. 1057:*

Nasce intorno Malghera nei Prati acquosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

4. *S. paludosus.* (Sumpf K.) S. dei paludi:

Corollette raggianti, foglie abbraccianti mezzo fusto, lanceolate, acutamente seghettate, con la pagina inferiore villosa, corimbo terminale divaricato, fusto drittissimo. *Pers. l. c. p. 436. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

Jacobaea palustris altissima, foliis serratis. *Zannich. Ven. p. 146. t. 131.*

Virgae auraeae sive Solidagini angustifoliae affinis, Lingua avis Dalechampii. *Bauh. Hist. II p. 1063 cum icone.*

Nasce comunemente intorno Mestre nei Fossi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

ASTER. (Sternblume) Astro.

Calice imbricato con le squamme inferiori patentì.

Corolla raggi più di dieci. Ricettacolo nudo scrobiculato. Pappo semplice.

A. Tripolium. (Meerstrands S.) A: marino:

Foglie lineari-lanceolate carnose triplinervi, le inferiori quasi seghettate nella cima, fusto glabro co-

rimboso, calici eguali. *Pers. Syn.* II p. 445. *Röhl. germ.* II p. 462. *Schult. aust.* II p. 532.

A. maritimus palustris caeruleus salicis folio. *Zann. Ven.* p. 26. t. 2.

Tripolium majus. *Bauh. Hist.* II p. 1064.

Nasce comunemente nei luoghi inondati dall'acqua salsa; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

INULA. (Alant) Enola:

Calice squarroso ovvero imbricato: Corolla con raggi numerosi. Antere finite inferiormente in due sete. Ricettacolo nudo. Pappo semplice.

1. *I. Helenium.* (Wahrer A.) E. Elenio.

Foglie abbraccianti il fusto rugose, nella pagina inferiore tomentose, calice con squamme ovate. *Pers. Syn.* I p. 450. *Röhl. germ.* II p. 463. *Schult. aust.* I p. 504. *Savi mat. med.* t. 6.

Elenio. *Matth.* p. 79.

Nasce in San Niccolò di Lido nei Prati; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

2. *I. britannica.* (Wiesen A.) E. dei prati:

Foglie abbraccianti il fusto lanceolate, seghettate alla base, nella pagina inferiore pelose, fusto corimboso villosa, rami laterali più lunghi del fusto. *Pers. l.c.* p. 450. *Röhl. l.c.* *Schult. l.c.* p. 507:

Aster palustris luteus, folio longiori lanuginoso. *Zann. Ven.* p. 28. t. 155. f. 2.

Ast. tertius panonicus clusii, luteus, folio hirsuto salicis. *Bauh. Hist.* II p. 1047.

Brittanica vera. *Dalech. Hist.* p. 1082.

Nasce intorno Malghera nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

3. *I. dysenterica.* (Ruhr A.) E. disenterica:

Foglie abbraccianti il fusto cordato-bislunghe quasi tomentose, fusto villosa panicolato, calice con squamme setacee. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 506.*

Aster pratensis autumnalis conyze folio. Zannichel. Ven. p. 29. t. 141.

Conyza media Matthioli, flore magno luteo, humidis locis proveniens. Bauh. Hist. II p. 1050 cam icone.

Conyza mezzana. Matth. p. 920 icon.

Nasce come la precedente.

4. *I. salicina.* (Weidenblattriger A.) E. a foglie di salice.

Foglie lanceolate ritorte seghettato-scabre, rami angolati, fiori inferiori più alti. *Pers. l. c. p. 451. Röhl. l. c. p. 464. Schult. l. c. p. 507.*

Nasce in Campalto nei luoghi montuosi ed erbosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

5. *I. ensifolia.* (Nervigter A.) E. nervosa:

Foglie sessili lineari acuminate nervose, glabre,

sperso, fusto semplicissimo unifloro. *Pers. loc. cit.*
Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 509.

Aster luteus linearie rigido, glabro folio. *Zannich.*
Ven. p. 28. t. 27.

Nasce nel Cavallino e Cortelazzo nei luoghi arenosi ed asciutti; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

6. *I. crithmifolia.* (Dichblättriger A.) E. a foglie crasse. Foglie lineari carnosè tricuspidate. *Pers. l. c. Röhl. loc. cit.*

Aster maritimus, folio tereti, crasso, tridentato.
Zann. Ven. p. 29. t. 23.

Critmum marinum tertium Matthioli, flore luteo Buphtalmi. *Bauh. Hist. III p. 106 cum icone.*

Critamo III. Matth. p. 520 cum icone.

Nasce nei luoghi inondati dall'acqua salsa detti volgarmente Barene, ed appresso il mare nei luoghi sassosi non lungi da Malamocco; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta fruticosa.

7. *I. viscosa.* (Klebriger A.) E. vischiosa.

Foglie sessili, richinate alla base lanceolate lunghe, fusto vergato, peloso, vischioso, peduncoli ascellari uniflori foliosi. *Pers. l. c. p. 452. Schult. l. c. p. 507.*

Erigeron viscosum. L. Röhl. germ. II p. 454.

Virga aurea major, foliis glutinosis, graveolentibus.
Zann. Ven. p. 278. t. 103.

Conyza major monspeliensis odorata. Bauh. Hist. II p. 1053 cum fig. mala.

Nasce nei Treporti e nel Cavallino nei luoghi arenosi ed asciutti; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

TUSSILAGO. (Huslattig-) Farfara:

Calice semplice con squamme eguali, quasi membranacee. Ricettacolo nudo. Pappo semplice sessile.

T. Farfara. (Gemeiner H.) F. comune.

Scapo unifloro, quasi nudo, bratteato, corollette raggianti, foglie cuoriformi angolate, dentate, pagina inferiore tomentosa. *Pers. Synops. II p. 455. Röhl. germ. II p. 459. Schult. aust. II p. 528.*

T. vulgaris. *Zann. Ven. p. 267. t. 266.*

Tussilago. *Bauh. Hist. III p. 563.*

Nasce intorno Malghera nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta perenne.

BELLIS. (Massliebe) Bellide:

Calice emisferico con squamme eguali. Semi ovati a rovescio. Ricettacolo nudo conico. Pappo nessuno.

B. perennis. (Gemeine M.) B. perenne.

Scapo nudo con un solo fiore, foglie ovate a rovescio, intaccate, venose. *Pers. Syn. I p. 459. Röhl. germ. I p. 451. Schult. aust. I p. 495.*

B. sylvestris minor. *Zann. Ven. p. 35 t. 206 f. 1.*

B. minor sylvestris-spontanea. *Bauh. Hist. III p. 113.*

Nasce comunemente nei Prati e luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

CHRYSANTHEMUM. (Goldblume) Crisantemo:

Calice emisferico imbricato, con le squamme marginali membranacee. Ricettacolo nudo. Pappo nessuno o marginato.

C. Leucanthemum. (Weisse G.) C. bianco:

Foglie abbraccianti il fusto, lanceolate seghettate, alla base intagliato-dentate, fusto dritto quasi ramoso. *Pers. Syn.* II p. 460. *Röhl. germ.* II p. 452. *Schult. aust.* II p. 496.

Leucanthemum vulgare. *Zann. Ven.* p. 161: t. 184.

Bellis major. *Bauh. Hist.* III p. 114 icon.

Nasce comunemente intorno Malghera nei Prati e luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

MATRICARIA. (Mutterkraut) Matricale:

Calice piano con squamme scariose nel margine. Ricettacolo nudo cilindrico-conico. Pappo nessuno.

M. Chamomilla. (Gemeines M.) M. Camomilla.

Foglie bipennate, squamme del calice ottuse. *Pers. Syn.* II p. 463. *Röhl. germ.* II p. 451. *Schult. aust.* II p. 495.

Chamaenelum vulgare Leucanthemum. *Zann. Ven.* p. 58.

C. vulgare. *Bauh. Hist.* III p. 116 icon.

Nasce negli Orti e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

ANTHEMIS. (Kamille) Antemide.

Calice emisferico quasi eguale con più di 5 raggi.

Ricettacolo paleaceo con palei piani, acuminati in cima, rigidi. Pappo nessuno o con margine membranaceo.

A. Cota. (Italiänische K.) *A. italiana.*

Foglie bipennatofesse con lacinie lineari lesiniformi-dentate, palei tereti pungenti e dilatati alla base. Pers. Syn. II p. 465. Willd. Sp. p. 2174.

Nasce nei terreni di Santa Marta; fiorisce il mese di Giugno, ed è pianta annuale.

ACHILLEA. (Garbe) Millefoglio.

Calice ovato imbricato. Fioretti del raggio circa 4.

Ricettacolo paleaceo. Pappo nessuno.

1. *A. Millefolium.* (Gemeine G.) *M. volgare.*

Foglie bipennate un poco glabre, pennole con lacinie lineari, dentate. Pers. Syn. II p. 469. Röhlings germ. II p. 466. Schult. aust. II p. 542. Savi mat. med. t. 26.

M. volgare album. Zann. Ven. p. 187. t. 143.

Mill. Stratiotes pennatum. Bauhin. Hist. III p. 136: icon.

Nasce comunemente nei Prati e nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Luglio sino Novembre, ed è pianta perenne.

Trovasi ancora una varietà a fiori porporci.

2. *A. magna*. (Grosse G.) M. grande:

Foglie bipennate quasi pelose, con lacinie lineari, dentate, orecchie incrociate. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

Nasce intorno Malghera e Campalto nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

FRUSTRANEA

CENTAUREA. (Flockenblume) Centaurea:

Calice vario. Corolle, quelle del raggio imbutiformi bislunghe, irregolari. Ricettacolo setoloso. Pappo semplice vario.

1. *C. Cyanus*. (Korn F.) C. Ciano.

Calici seghettati, foglie lineari sessili interissime, le inferiori alla base pennatofesse. *Pers. Synops. II p. 483. Röhl. german. II p. 469. Schult. aust. II p. 551.*

Cyanus segetum flore caeruleo. Zann. Ven. p. 77. t. 289.

Cyanus. Bauh. Hist. III p. 21 icon.

Ciano minore. Matth. p. 537 icon.

Nasce fra le Biade; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

2. *C. paniculata*; (Rispenartige F.) C. panicolata:

Calici ciliati, con squamme ovate appoggiate, foglie inferiori bipennate, le superiori pennatofesse, fusto panicolato. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p. 470. Schult. loc. cit.*

Jacea foliis candicantibus laciniatis calyculis non splendidibus. *Zann. Ven. p. 145. t. 8.*

Centaurie majoris species tenuifolia. Bauh. Hist. III p. 31.

Nasce abbondevolmente nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

3. *C. Jacea.* (Gemeine F.) *C. comune:*

Calici scariosi, con squamme ovate, laere nella cima, foglie lanceolate interissime, le radicali quasi dentate, rami angolati. *Pers. l. c. p. 485. Röhl. l. c. Schult. l. c. p. 554.*

Jacea nigra pratensis latifolia. Zann. Venet. p. 144. t. 206. f. 2.

Jacea nigra vulgaris capitata et squamata. Bauhin. Hist. III p. 27.

Nasce comunemente intorno Malghera nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

4. *C. Calcitrapa:* (Stendinstel F.) *C. stellata.*

Calici quasi raddoppiato-spinosi sessili, foglie pennatofesse lineari dentate, fusto peloso. *Pers. loc. cit. p. 486. Röhl. l. c. p. 471. Schult. l. c. p. 555.*

Cyanoides stellata spinosa flore purpureo. Zannich. Ven. p. 76. t. 152.

Carduus stellatus sive *Calcitrapa*: *Bauh. Histor.* III
p. 89.

Nasce nei luoghi asciutti; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta annuale.

GYNANDRIA

DIANDRIA;

ORCHIS. (Knabenkraut) Orchide:

Calice ringhioso, con la fogliolina superiore concava. *Labello* dilatato terminato posteriormente in uno sprone lungo. *Antera* accresciuta nella cima dello stilo.

Radici testicolate indivise.

1. *O. pyramidalis*. (Piramiden K.) *O.* piramidale.

Labello trifido quasi eguale alla base bitubercolato, con la lacinia di mezzo smarginata, sprone più lungo del germe, foglioline del calice ovato-lanceolate, spiga unita. *Pers. Syn.* II p. 503. *Röhl. germ.* II p. 476. *Schult. aust.* I p. 42.

O. spica purpurea congesta pyramidali. *Zann. Ven.* p. 196. t. 4.

Nasce comunemente intorno Malghera nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

2. *O. coriophora*. (Stinkendes K.) *O.* puzzante.

Labello trilobo, con la lacinia di mezzo più sottile

e più lunga, le laterali richinate dentellate, sprone più breve del germe, foglioline del calice conniventi. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p. 473. Schult. l. c. p. 43.*

Nasce intorno Malghera e Campalto nei Prati; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

3. *O. Morio.* (Triften K.) O. delle pasture.

Labello largo trilobo, con il lobo di mezzo smarginato e con i lobi laterali intaccati richinati, sprone bifido nella cima, ascendente, foglioline del calice ovali, ottuse, conniventi. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p. 474. Schult. l. c.*

O. Morio foemina. Zann. Ven. p. 195. t. 28.

O. minor purpurea, et aliorum colorum, cum alis virentibus. Bauh. Hist. II p. 761 cum icone.

Nasce in San Niccolò di Lido, nei Treporti e nel Cavallino; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

4. *O. Mascula.* (Männliches K.) O. maschio.

Labello 3-fido intaccato, con la licinia di mezzo più lunga biloba, sprone quasi ritorto ottuso, calice con le foglioline esterne quasi faleiformi, acute richinate. *Pers. l. c. p. 504. Röhl. l. c. p. 477. Schult. loc. cit.*

Trovati, benchè di rado, nei Prati ai Treporti; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

Radici palmate?

5: *O. conopsea*. (Fliegenartiges K.) *O. moschiforme*.

Labello trifido quasi eguale, quasi intero, sprone setaceo più lungo del germe, calice con le foglioline esterne patentissime, spiga cilindrica, fiori sparsi. *Pers. Syn. II p. 505. Röhl. germ. I p. 479. Schult. aust. II p. 52.*

Nasce intorno Campalto e Malghera nei Prati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

OPHRIS. (Ragwurz) Ofride?

Calice di cinque foglie, delle quali le tre esterne ovato-lanceolate, le due interne [*Petali*] piccole quasi lineari. *Labello* dalla base dello stilo, senza sprone, grande quasi lobato, pendente. *Ginostemio incurvo.*

O. arachnites. (Spinnenblumige R.) *O. a fiori in forma di ragno.*

Labello villosa trilobo, col lobo di mezzo ovato a rovescio, e brevissimamente trilobo, petali patenti, dei quali li tre esterni bislunghi ottusi, i due interni lineari-lanceolati brevissimi. *Pers. Syn. II p. 510. Röhl. germ. II p. 480. Schult. aust. I p. 56.*

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

HELLEBORINE. (Stendelwurz) Elleborine.

Calice ringhioso di cinque foglie, delle quali le tre esterne più sottili delle due interne, conniventi.

Labello senza sprone concavo, con le lamine richinate un poco piane. *Antera* accresciuta allo stilo prolungato. *Stimma* concavo.

H. cordigera. (Rauhlippige S.) E. *irsuta*:

Labello trilobo, col lobo di mezzo dilatato quasi cordato acuminato, prolungato e barbato alla base. *Pers. Syn.* II p. 512.

Nasce in Campalto nei Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

SERAPIAS. (Sumpfwurz) Serapiade.

Calice eretto-patente. *Labello* senza sprone interissimo, concavo alla base. *Antera* persistente che cuopre lo stimma.

S. palustris. (Sumpf S.) S. dei paludi.

Foglie del fusto lanceolate, fiori nutanti, labello ottuso intaccato, eguale al calice. *Pers. Synops.* II p. 513.

Epipactis palustris. *Schult. aust.*

Helleborine palustris nostras. *Zannich. Ven.* p. 137. t. 58. fig. 2.

Nasce nei Treporti nei luoghi umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

HEXANDRIA

ARISTOLOCHIA. (Osterluzei) Aristolochia.

Calice o. *Corolla* monopetala ligolata, ventricosa alla base. *Cassella* inferiore di sei cavità e con molti semi.

Fusto eretto:

1. *A. rotunda*. (Runde O.) *A. rotunda*:

Foglie cuoriformi quasi sessili ottuse, fusto un poco dritto quasi semplice, fiori solitarii dritti, labbro bislungo retuso. *Pers. Syn.* II p. 527. *Röhl. germ.* II p. 484. *Schult. aust.* I p. 584.

A. rotunda. *Bauh. Hist.* III p. 559:

Nasce nel Lido ed in Campalto nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *A. Clematitis*. (Gemeine O.) *A. comune*:

Foglie subrotondo-cordate, picciolate, ottuse, peduncoli uniflori ammuchciati, corolle dritte, labbro bislungo. *Pers. l.c.* *Röhl. l.c.* *Schult. l.c.*

A. Clematitis recta. *Zann. Ven.* p. 20. t. 180:

A. Clematitis vulgaris. *Bauh. Hist.* III p. 560 cum icone.

Nasce a San Niccolò di Lido appresso le Siepi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

MONOECIA

MONANDRIA.

ZOSTERA. (Wasserriemen) Zostera.

MASC. *Calice* o. *Corolla* o. *Antera* ovata piantata sulla parte superiore di uno spadice unilaterale.

FEMM. *Calice* o. *Corolla* o. *Germi* ovati sulla parte inferiore dello spadice unilaterale. *Stilo* bifido. *Cassella* con un solo seme.

Z. marina. (Gemeine W.) Z. comune.

Foglie interissime quasi trinervi, fusto un poco terete. *Pers. Syn.* II p. 528. *Röhl. germ.* II p. 79. *Nasce comunemente nelle Lagune e nel Mare; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.*

DIANDRIA

LEMNA. (Wasserlinse) Lenticola.

MASC. *Calice* di una sola foglia. *Corolla* o.

FEMM. *Calice* di una sola foglia. *Corolla* o. *Stilo* 17. *Cassella* di una sola cavità con due semi.

L. minor. (Kleine W.) L. minore.

Foglie ellittiche sotto e sopra piane, unite alla base, radici solitarie. *Pers. Syn.* II p. 532. *Röhl. germ.* II p. 90. *Schult. aust.* I p. 64.

Nasce nelle acque quiete; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

TRIANDRIA

TYPHA. (Kolben) Tifa.

MASC. *Amento* cilindrico. *Calice* obsoleto, di tre foglie. *Corolla* o.

FEMM. *Amento* cilindrico sotto il maschio. *Cal.* o. *Corolla* o. Un solo seme pedicellato, col pedicello circondato da peli lunghi.

T. latifolia. (Breitblättrige K.) T. a foglie larghe: Foglie quasi ensiformi, spiga maschia e femmina approssimate, l'una e l'altra cilindriche. *Pers. Syn.* II p. 532. *Willd. Spec.* IV p. 197. *Röhl. germ.* II p. 520. *Schult. aust.* I p. 163.

T. palustris major. *Bauh. Hist.* II p. 539.

Typha. *Matth.* p. 911.

Nasce comunemente intorno Malghera nei luoghi inondati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

SPARGANIUM. (Igelskopf) Sparganio:

MASC. *Amento* subrotondo. *Calice* di tre foglie. *Corolla* o.

FEMM. *Amento* subrotondo. *Calice* di tre foglie. *Corolla* o. *Stigma* bifido. *Drupa* secca con un solo seme.

S. ramosum. (Aestiger I.) *S. ramoso*:

Foglie triquetre alla base, con lati concavi, fusto ramoso, stimmi lineari. *Pers. Syn.* II p. 533. *Röhl. germ.* II p. 510.

S. quibusdam. *Bauh. Hist.* II p. 541.

Sparganio. *Matth.* p. 1043 cum icone.

Nasce intorno Malghera nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

CAREX. (Segge) Carice.

MASC. *Amento* imbricato. *Calice* squamma solitaria. *Corolla* 0.

FEMM. *Calice* squamma solitaria. *Corolla* ventricosa monopetala, 2-dentata nella cima. *Stimma* 2-3. *Noce* triquetra chiusa dalla corolla persistente.

1. *Spighe androgine sessili alterne.*

1. *C. vulpina.* (Fuchs S.) *C. volpina.*

Spiga androgina composta, spiglette numerose, ternate e quinate, ammuechiate, bislunghe, conferte, di sopra maschi, stimma due, frutti ovati 2-dentati compresso-triquetri patenti, brattee setacee. *Pers. Syn.* II p. 537. *Schkur. Caric. t. C. f.* 10. *Röhl. germ.* II p. 490. *Schult. aust.* I p. 132.

Nasce in Campalto, Chioggia e nel Lido; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

2. *C. muricata.* (Stechende S.) *C. muricata.*

Spiga androgina composta, spiglette ovate, di sopra maschie, approssimate, stimma due, frutti

orizzontali piano-convessi 2-dentati, marginati alla base, nel margine ciliato seghettati. *Pers. loc. cit.* p. 538. *Schkur. Caric. t. F Dd f. 22. Röhl. germ. II p. 491. Schult. l. c. p. 133.*

Nasce nel luogo detto Aca bianca nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Aprile sino Luglio, ed è pianta perenne.

2. Spighe monoiche ovvero con sessi distinti:

Stimmi per lo più tre.

3. *C. pilulifera.* (Pillen S.) *C. pilulifera.*

Spiga maschia solitaria, femmine quasi terne approssimate ellittico-subrotonde sessili, stimmi tre, frutti subrotondi brevemente rostrati pubescenti più brevi della squamma bislunga, acuta, fusto decumbente. *Pers. l. c. p. 540. Schkur. Caric. t. I f. 39. Röhl. l. c. p. 496. Schult. l. c. p. 140.*

Nasce in Campalto nei Prati; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

4. *C. tomentosa.* (Filzige S.) *C. tomentosa.*

Spiga maschia solitaria, femmine geminate cilindriche quasi approssimate sessili, stimmi tre, frutti subrotondi tomentosi maggiori della squamma ovata acuminata. *Pers. l. c. p. 541. Schkur. Caric. t. F f. 28. Röhl. l. c. p. 497. Schult. l. c. p. 142.*

Nasce in Campalto ed intorno Malghera nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

5. *C. extensa.* (Ausdehnte S.) *C. steso.*

Spiga maschia solitaria quasi sessile, femmine ellitti-

co subrotende rinchiuse peduncolate, quasi terne, quasi approssimate, brattee fogliacee lunghissime, stimmi tre, frutti ellittici bidentati nervosi maggiori della squamma ovata mucronata. *Pers. l. c. p. 542. Schkur. Caric. t. V et XX f. 72. Röhl. l. c. p. 498.*

Nasce intorno Malghera e Campalto nei Paludi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

3. Spighe con sessi distinti, maschia solitaria, femmine, le superiori sessili ovvero rinchiuse peduncolate, le inferiori peduncolate.

6. *C. panicea.* (Fennichartige S.) *C. paucea.*

Spiga maschia solitaria, femmine quasi due remote, quella di sopra quasi rinchiuso-peduncolata, quella di sotto lungamente peduncolata, stimmi tre, frutti ovati ottusi, maggiori della squamma ovata. *Pers. l. c. p. 544. Schkur. Caric. t. LI f. 100. Röhl. l. c. p. 502. Schult. l. c. p. 149.*

Nasce in Campalto nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

7. *C. nitida?* (Glänzende S.) *C. splendente.*

Spiga maschia solitaria, femmine due bislunghe approssimate, la inferiore delle quali peduncolata, stimmi tre, frutti ellittico-globosi nitido-glabri, coll'apertura bifida, maggiori della squamma ovata. *Pers. l. c. p. 543. Röhl. l. c. p. 503. Schultes l. c. p. 150.*

Nasce in Campalto nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

8. *C. caespitosa*. (Rasca S.) *C. caespitosa*.

Spiga maschia solitaria, femmine cilindriche ottuse quasi terne distanti, delle quali quella di sotto lungamente pedunculata, stimmi due, frutti ovati ottusi con l'apertura pertugiata, maggiore della squamma bislunga ottusa, foglie patenti. *Pers. l. c. p. 546. Schkur. Caric. A et Bbf. 85. Röhl. l. c. p. 504. Schult l. c. p. 152.*

Nasce in Campalto nei Fossi e nei Paludi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

Spighe maschie anche 2-3.

4. Spighe con sessi distinti, maschie molte.

9. *C. recurva*. (Graublättrige S.) *C. ritorta*.

Spighe maschie geminate, femmine cilindriche quasi ternate peduncolate pendenti, stimmi tre, frutti ellittici ottusi un poco scabri, eguali alla squamma ovata cuspidata. *Röhl. l. c. p. 507. Schult. l. c. p. 157.*

C. (glauca) Spicis masculis geminatis foeminis cylindricis pedunculatis maturis pendulis, fructibus ovatis obtusis. *Pers. l. c. p. 545.*

C. (flacca) Vaginis brevissimis vel nullis, spicis cylindricis, foemineis laxis, fructiferis pendulis, capsulis obtuso ovatis apice integris. *Schkur. Carices. p. 117. t. Of. 57.*

Nasce in Campalto nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

10. *C. paludosa*. (Morast S.) *C. paludoso*.

Spighe maschie due, femmine terne dritte cilindri-

che assottigliate, le inferiori peduncolate, stimmi tre, frutti ovati nervosi bidentati più larghi della squamma lanceolata restata. *Pers. loc. cit. p. 546. Schkur. Caric. p. 121. t. Oo et Vv f. 102. Röhl. l. c. p. 508. Schult. l. c. p. 156.*

Nasce in Campalto nei Paludi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

11. *C. hirta.* (Haarfrüchtige S.) *C. irta.*

Spighe maschie due, femmine tre bislunghe rimote, le inferiori brevemente peduncolate, stimmi tre, frutti bislunghi acuminati irti 2-cuspidati maggiori della squamma bislunga restata, vagine e foglie quasi irte. *Röhl. l. c. p. 510. Schult. l. c. p. 161.*

C. Pilosa, spicis omnibus oblongis, faemineis remotis vaginatis, vaginis lanato-villosis, capsulis hirtis. *Pers. l. c. p. 547. Schkur. p. 127. t. Uu f. 108.*

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.

TETRANDRIA

ALNUS. (Else) Ontano.

MASC. *Amento* composto da ricettacoli cuneiformi, troncati, triflori. *Calice* una squamma. *Corolla* quadripartita.

FEMM. *Amento*. *Calice* con squamme biflore. *Corolla* o. *Semi* compressi, ovati, nudi.

A. glutinosa. (Gemeine F.) O. comune.

Foglie subrotundo-cuneiformi, quasi retuse glutinose, vene inferiormente con ascelle villose. *Pers. Syn. II p. 550. Röhl. germ. II p. 512. Schult. aust. I p. 321.*

A. rotundifolia glutinosa viridis. Zann. Ven. p. 7.

A. vulgaris. Bauh. Hist. I p. 151.

Alno. Matth. p. 157.

Nasce comunemente in Campalto e nel luogo detto Aca bianca; fiorisce nei mesi di Gennaio e Febbrajo, ed è pianta fruticosa.

BUXUS. (Buchsbaum) Bosso.

MASC. *Calice* di tre foglie. *Petali* due. Un rudimento del *Germe*.

FEMM. *Calice* di quattro foglie. *Petali* tre. *Stili* tre. *Cassella* 3-rostrata, e di tre cavità. *Semi* 2.

B. sempervirens. (Gemeiner B.) B. comune.

Foglie ovate, piccioli un poco pelosi nel margine, antere ovato-saettiformi. *Pers. Syn. II p. 551. Röhl. germ. II p. 512. Schult. aust. I p. 322.*

Buxus. Fuchs Hist. p. 643 cum icone.

Bosso. Matth. p. 208 cum icone.

Nasce in Campalto appresso i Fossi; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta fruticosa.

URTICA. (Nessel) Ortica.

MASC. *Calice* di quattro foglie. *Corolla* o. *Nettario* centrale ciatiforme.

FEMM. *Cal.* di due valve. *Cor.* o. *Seme* 1 nitido.

1. *U. urens*. (Brenn N.) O. abbrucciante.

Foglie opposte ellittiche quasi 5-nervi, acutamente seghettate, spighe glomerate geminate. *Pers. Syn.*

II p. 552. *Röhl. germ.* II p. 511. *Schult. aust.* I p. 317.

U. minor annua. *Bauh. Hist.* III p. 446.

Urticoides urens. *Zann. Ven.* p. 280.

Urtica minor. *Fuchs Hist.* p. 107.

Ortica III. *Matth.* p. 1185 cum icone.

Nasce negli Orti e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

2. *U. dioica*. (Gemeine N.) O. comune.

Foglie opposte cordate ovato lanceolate grossamente seghettate, fiori dioici, spighe panicolate glomerate geminate più lunghe del picciolo. *Pers. loc. cit.*

p. 553. *Röhl. l. c.* *Schult. l. c.* p. 318.

U. urens maxima. *Zann. Ven.* p. 280.

U. vulgaris major. *Bauh. Hist.* II p. 445.

U. major. *Fuchs Hist.* p. 107 cum icone.

Nasce come la precedente; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

PENTANDRIA

XANTHIUM. (Spitzklette) Carpola. (*Savi*)

MASC. *Calice* comune imbricato. *Corolla* monopetala 5-fida imbutiforme. *Ricettacolo* palcaceo.

FEMM. *Calice* invoglio di due foglie e con un solo fiore. *Corolla* o. *Drupa* secca, muricata, bifida nella cima. *Noce* di due cavità.

1. *X. Strumarium*: (Gemeine S.) C. Bardana.
 Fusto inerme, foglie cordate trinervate. *Pers. Syn.*
 II p. 558. *Röhl. germ.* II p. 521. *Schult. aust.* I
 p. 466.
X. s. Lappa minor. *Bauh. Hist.* III p. 572.
Xanthium. *Zann. Ven.* p. 282. *Fuchs Hist.* p. 579.
Xanthio ovvero *Lappa minore.* *Matth.* p. 1263.
Nasce nel Lido nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi
di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.
2. *X. spinosum.* (Dornige S.) C. spinosa.
 Fusto con spini ternati, foglie trilobe. *Pers. loc. cit.*
Röhl. l. c.
Trovasi, benchè di rado, nel Lido nei luoghi are-
nosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è
pianta annuale.

AMARANTHUS: (Amaranth) Amaranto.

- MASC. *Calice* di tre o cinque foglie. *Corolla* o. *Stami* tre o cinque.
 FEMM. *Calice* di tre o cinque foglie. *Cor.* o. *Stili*
 tre. *Cassella* coperchiata di una sola cavità. *Seme*
 uno.

Triandri.

1. *A. Blitum.* (Wilder A.) A. selvatico.
 Glomeruli triandri quasi spicati, fiori trifilli, foglie
 ovate retuse, fusto diffuso. *Pers. Syn.* II p. 560.
Röhl. germ. II p. 511. *Schult. aust.* I p. 274.
Blitum rubrum minaus. *Zann. Ven.* p. 39. *I. Bauh.*
Hist. II p. 697.

Nasce nei Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

2. *A. prostratus*. (Liegender A.) A. giacente.
 Glomeruli triandri spicati, fiori trifilli, foglie romboid-ovate un poco ottuse, retuse, fusto giacente ramoso. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p. 585. Schult. aust. loc. cit.*
Blitum sylvestre spicatum. Zann: Ven. p. 39.
Blitum album minus. Bauh. Hist. II p. 967.
Nasce nei Rovinazzi e fra Sassi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

Pentandri.

3. *A. hybridus*. (Bastard A.) A. ibrido.
 Grappoli pentandri ricomposti ammuccchati dritti, foglie ovato-lanceolate. *Pers. l. c.*
A. major. Barrell. ic. t. 648, et 650.
A. maximus novae anglie totus viridis, Zann. Ven. p. 13.
Nasce comunemente dentro e fuori della città nei luoghi sassosi e nei Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

POLYANDRIA

Stami oltre sette.

SAGITTARIA. (Pfeilkraut) Saettaria.

MASC. *Calice* di tre foglie. *Corolla* di tre petali.
Filamenti quasi 24.

FEMM. *Calice* di tre foglie. *Corolla* di tre petali.
Pistilli molti. *Semi* molti nudi.

S. sagittifolia. (Gemeines P.) S. comune.

Foglie lanceolate acuminate, saettiformi, con lobi lanceolati dritti, scapo semplice. *Pers. Synops.* II p. 563. *Röhling german.* II p. 514. *Schultes aust.* II p. 124.

Sagitta. *Bauh. Hist.* III p. 789 cum icone.

β Sagitta minor angustifolia. *Bauh. Hist.* III p. 790 cum icone.

Nasce intorno Malghera nei Fiumi e nei Fossi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

POTERIUM. (Becherblume) Poterio.

MASC. *Calice* di quattro foglie. *Cor.* 4-partita. *Stami* 30-50.

FEMM. *Calice* di quattro foglie. *Corolla* 4-partita. *Pistilli* due. *Semi* chiusi nel tubo della corolla indurita.

P. Sanguisorba. (Gemeine B.) P. comune.

Inerme, fusti quasi angolosi. *Pers. Syn.* II p. 566. *Röhl. germ.* II p. 515. *Schult. aust.* II p. 48.

Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta. *Zann. Ven.* p. 210. t. 119.

Pimpinella minore. *Matth.* p. 1088.

Sanguisorba minor. *Bauh. Hist.* III p. 113.

Nasce nel Lido nei Prati; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è perenne.

QUERCUS. (Eiche) Quercia.

MASC. *Calice* quasi 5-fido. *Corolla* 0. *Stammi* 5-10:

FEMM. *Calice* di una sola foglia col margine interissime. *Corolla* 0. *Stili* 2-5. *Noce* coriacea circondata alla base dal calice persistente.

Q. Robur. (Stein E.) *Q. Rovere.*

Foglie bislunghe picciolate glabre sinuate, lobi rotondati, frutti bislungi sessili. *Pers. Synops.* II p. 570. *Röhl. germ.* II p. 515. *Schult. aust.* I p. 619.

Quercia. *Matth.* p. 222 cum icone.

Nasce in Campalto; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta arborea.

JUGLANS. (Wallnuss) Noce.

MASC. *Amento* imbricato. *Calice* una squamma. *Corolla* 6-partita. *Filamenti* 4-18.

FEMM. *Calice* 4-fido superiore. *Corolla* 4-fida. *Stili* due. *Drupa* coriacea con noce solcata.

J. regia. (Gemeine W.) N. comune.

Amenti poliandri, foglioline quasi nove, ovali glabre quasi seghettate e quasi eguali, frutti globosi. *Pers. Syn.* II p. 566. *Röhl. germ.* II p. 517.

Nasce in Campalto; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta arborea.

CORYLUS. (Haselnuss) Avellana.

MASC. *Amento* imbricato. *Calice* una squama. *Corolla* 6. *Stamini* 8.

FEMM. *Calice* bipartito lacero. *Stili* due. *Noce* ovata circondata dal calice persistente.

C. Avellana. (Gemeine H.) A. comune.

Stipole bislunghe ottuse, calici del frutto campaniformi allargati lacero-dentati. *Pers. Syn.* II p. 571. *Röhl. germ.* II p. 513.

Nasce in Campalto nei luoghi umidi ed ombrosi; fiorisce nei mesi di Febbraro e Marzo, ed è pianta fruticosa.

ARUM. (Aron) Aro.

Spata monoflora cucullata: *Spadice* nudo di sopra, femminile di sotto e stamineo nel mezzo. *Bacca* per lo più monospermo.

A. italicum. (Italienischer A.) A. italiano:

Senza fusto, foglie albo-venose astato-saettiformi, con lobi auricolati divaricati, spadice clavato più corto della spata. *Pers. Syn.* III p. 575.

Nasce nei luoghi ombrosi ed appresso i muri; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

MONARCELPHEA

MOMORDICA. (Eselsgurke) Elaterio.

MASC. *Calice* 5-fido. *Cor.* 5-partita. *Stamini* tre.

FEMM. *Calice* 5-fido. *Corolla* 5-partita. *Stilo* 3-fido.
Pappone che si apre con elasticità. *Semi* compressi.

M. Elaterium. (Gemeine E.) E. comune.

Pomi ellittici ispidi, foglie cuoriformi ispide ottuse dentate, fusto senza ricci. *Pers. Syn.* II p. 593.

Röhl. germ. II p. 521. *Savi mat. med.* t. 11.

Elaterium officinarum cucumis asininus dictus. *Zann.*

Ven. p. 91. t. 63. *Bauh. Hist.* II p. 248.

Nasce nei Rovinazzi e luoghi sassosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale e qualche volta biennale.

Fusto giacente. Foglie verrucoso-ispide glauche.

Fiori giallo-verdi, maschi ammicchiati, femmine solitarie. Calice con lacinie sottili acuminate.

Corolla con lobi muricati nella cima. Frutti ritorti cilindrici muricati. Semi ovati-bislunghi, nitidi.

BRYONIA. (Zaunrübe) Brionia.

MASC. *Calice* 5-dentato. *Corolla* 5-partita. *Filamenti* cinque.

FEMM. *Calice* 5-dentato. *Corolla* 5-partita. *Stilo* trifido. *Bacca* quasi globosa con molti semi.

B. dioica. (Zweyhäusige Z.) *B. dioica.*

Foglie cuoriformi palmate 5-lobe dentate, calloso-puntate, fiori racemosi dioici. *Pers. Syn.* II p. 594.

Röhl. germ. II p. 522. *Schult. aust.* I p. 107.

B. aspera sive alba baccis rubris. *Zann. Ven.* p. 41. t. 243.

Vitis alba s. *Bryonia*: *Bauh. Hist.* II p. 143.

Nasce in Campalto e nel luogo detto Aca bianca nelle Siepi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

DIOECIA

DIANDRIA.

SALIX. (Weide) Salice:

MASC. *Amento* cilindrico. *Calice* una squamma. *Corolla* o. Una *glandola* nettarifera alla base.

FEMM. *Amento* cilindrico. *Calice* una squamma. *Corolla* o. *Stilo* 2-fido. *Cassella* di una sola cavità e con due valve. *Semi* papposi.

1. *S. rosmarinifolia*. (Rosmarinblättrige W.) *S.* a foglie di ramerino.

Foglie lineari-lanceolate quasi interissime piane, pubescenti nella pagina superiore, e nella pagina inferiore sericei, germi lanceolati villosi, stili prolungati. *Pers. Syn.* II p. 602. *Röhl. germ.* II p. 532. *Schult. aust.* I p. 76.

S. humilis angustifolia. *Zann. Ven.* p. 233. t. 125.

S. pumila angustifolia inferne lanuginosa. *Bauhin. Hist.* I p. 212.

Nasce nei Treporti nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta fruticosa.

2. *S. caprea*. (Sohl W.) *S. caprea*.

Foglie ovate acuminate seghettate rugose, nella pagina inferiore tomentose, stipole quasi lunate, casselle ventricose. *Pers. l. c. p. 503. Röhl. l. c. p. 534. Schult. l. c. p. 78.*

S. latifolia, folio ex rotunditate acuminato. *Zann. Ven. p. 233.*

S. latifolia inferne hirsuta. *Bauh. Histor. I p. 215 cum icone.*

Nasce in Campalto nei luoghi umidi ed appresso i Fossi; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta arborea.

3. *S. alba.* (Gemeine W.) S. comune:

Foglie lanceolate acuminate seghettate, sericei da una e dall'altra parte, serrature inferiori glandolosi, stimmi bipartiti. *Pers. l. c. p. 604. Röhl. l. c. p. 535. Schult. l. c. p. 81.*

S. vulgaris alba arborescens. *Zann. Ven. p. 232.*

Nasce in Campalto ed intorno Malghera nelle Strade e luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta arborea.

TRIANDRIA

OSYRIS. (Osyris) Osiride.

MASC. Calice 3-fido. Corolla o.

FEMM. Calice 3-fido. Corolla o. Stilo uno. Stigma subrotondo. Bacca di una sola cavità.

O. alba. (Weisse O.) O. bianca.

Osyris. *L.*

*O. foliis linearibus acutis. Pers. Synops. II p. 606.
Röhl. germ II p. 536.*

*Casia poetica mouspeliensium. Zann. Ven. p. 53. t. 83.
Nasce nel Cavallino nei luoghi arenosi; fiorisce nel
mese di Giugno, ed è pianta fruticosa.*

OCTANDRIA

POPULUS. (Pappel) Piopo.

MASC. *Amento cilindrico. Calice una squamma lacera. Corolla turbinata obliqua intera.*

FEMM. *Amento cilindrico. Calice e Corolla come nel fior maschio. Stigma 4-fido. Cassella di due cavità. Semi papposi.*

1. *P. alba.* (Weisse P.) P. bianco:

Foglie cordato-subrotonde, lobate dentate nella pagina inferiore tomentoso-nivei, amenti ovati. Persoon Syn. I p. 523. Röhl. germ. II p. 538. Schult. aust. I p. 603.

P. alba majoribus foliis. Zannich. Ven. p. 217.

P. alba Leuci. Bauh. Hist. I p. 160.

Nasce agli Alboroni; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta arborea.

2. *P. nigra.* (Schwarze P.) P. nero.

Foglie con le due pagine glabre acuminate seghettate deltoidi, più lunghe che larghe. Pers. loc. cit. Röhl. l. c. Schult. l. c.

P. nigra. Zannich. *Ven.* p. 217. t. 122.

P. nigra s. Aegiros. *Bauh. Hist.* I p. 155.

Popolo nero. *Matth.* p. 153 cum icone.

Nasce comunemente nel Lido; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta arborea.

ENNEANDRIA

MERCURIALIS. (Bingelkraut) Mercorella.

MASC. *Calice* 3-partito. *Cor.* 0. *Stami* 9 ovvero 12.
Antere globose didime.

FEMM. *Calice* 3-partito. *Corolla* 0. *Stili* 2. *Cassella* dicocca di due cavità e con un solo seme.

M. annua. (Jähriges B) *M. annuale*.

Annuale, fusto incrociato, foglie glabre, fiori maschii spicati. *Pers. Syn.* II p. 625. *Röhl. germ.* II p. 539. *Schult. aust.* I p. 622.

M. testiculata s. masc. ♀ *Zann. Ven.* p. 186.

M. spicata s. foemina. ♂ *Zann. Ven.* p. 186.

M. masc. et foemina. *Bauh. Hist.* II p. 977.

M. masc. *Fuchs Hist.* p. 475. ♀

M. foemina. *Fuchs Hist.* p. 476. ♂

Mercorella maschio. *Matth.* p. 1360. ♀

Mercorella femmina. *Matth.* p. 1361. ♂

Nasce comunemente negli Orti e luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta annuale.

HYDROCHAERIS. (Froschbiss) Idrocheride.

MASC. *Spata* di due foglie. *Calice* 3-fido. *Corolla* di tre petali. Li tre *Filamenti* interni formanti uno *Stilo*.

FEMM. *Calice* 3-fido. *Corolla* di tre petali. *Stili* 6. *assella* di sei cavità, con molti semi, inferiore.

H. Morsus Ranæ. (Gemeiner F.) I. comune.

Hydrochaeris. *Pers. Syn.* II p. 625. *Röhl. germ.* II p. 539. *Schult. aust.* I p. 623.

N. minor s. morsus ranæ. *Bauh. Hist.* III p. 173. cum icone aliena.

Nasce intorno Malghera nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

MONADELPHIA

JUNIPERUS. (Wachholder) Ginepro.

MASC. *Amento* ovato. *Calice* una squamma. *Corolla* 0. *Stami* tre.

FEMM. *Calice* 3-partito. *Petali* tre. *Stili* tre. *Bacca* con tre semi e con tre turbecoli.

J. communis. (Gemeiner W.) G. comune.

Foglie terne, patenti, mucronate, più lunghe della bacca. *Pers. Syn.* II p. 632. *Röhl. germ.* II p. 539. *Schult. aust.* p. 277.

J. vulgaris fruticosa. *Zann. Ven.* p. 151.

J. vulgaris baccis parvis purpureis. *Bauh. Hist.* I p. 293.

Nasce abbondevolmente nei Treporti e nel Cavallino nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta fruticosa.

POLYGAMIA

MONOECIA:

ANDROPOGON. (Bartgras) Andropogine:

HERMAPH. *Cal.* glumia uniflora. *Cor.* restata alla base, o nella cima. *Stami* tre. *Stili* due. *Seme* 1.

MASC. *Calice* unifloro. *Corolla* mutica. *Stami* tre.

1. *A. Gryllus*. (Gemeines B.) *A.* comune:

Pannocchia semplice diffusa, rami con tre fiori nella cima, quello di mezzo ermafrodito, restato nella cima, sessile e barbato alla base, fiori laterali maschi pedicellati mutici. *W.*

A. Paniculae pedunculis simplicissimis, trifloris, flosculo hermaphrodito aristato, ciliato, basi barbato. *Pers. Syn.* I p. 103.

A. Paniculae ramis simplicissimis trifloris. *Röhling germ.* II p. 108. *Schult. aust.* I p. 193.

Aegilops bromoides juba purpurascens. *Bauhinus Hist.* II p. 436 sine icon.

Gramen sparteum festuceum sive *Aegilops spartea villosa*. *Barr. ic. t.* 18. *f.* 2.

Nasce intorno Malghera nei luoghi montuosi; fiorisce il mese di Giugno, ed è pianta perenne.

Fusto alto 2-4 piedi stritto, di sotto un poco com-

presso, glabro, con 4-5 nodi rossi. Foglie lineari acuminate, crenate, richinate nella cima, nel margine e nel dorso, qua e là con peli bianchi. Vagine glabre, ovvero con pochi peli. Linguetta brevissima ciliata. Rami per lo più disposti in verticillo, filiformi lunghissimi, solamente nella cima con spiglette, quella di mezzo è ermafrodita, circondata alla base da peluzzi rossi, le laterali sono maschie ovvero neutre, tutt'e di un colore porporino. Valvola esterna del fiore ermafrodito mutica obsoleta 7-nerve, la interna 5-nerve, con una resta dorsale. La Corolla consiste da tre valve ciliate porporee, delle quali la esterna mutica, la interna con una resta lunghissima. Reste nei fiori ermafroditi sono appena più lunghe del calice. Schuit. l. c.

2. *A. Ischaemum*. (Deutsches B.) *A. polistachio*.

Spighe dilatate quasi otto, fiori geminati e lanati alla base, l'ermafrodito sessile, con corolla 2-valve e restata nella cima, il maschio pedicellato con corolla univalve mutica. *W. Sp. pl.*

A. Spicis digitatis plurimis, flosculis sessilibus, aristato muticoque, pedicellis lanatis. Schreb. gram: II p. 166. t. 33.

Gramen Dactylon spicis villosis. Zann. Ven. p. 117. t. 194.

Gramen digitatum hirsutum. Bauh. Hist. II p. 445 cum icone.

Gramen Dactylon spicis aristatis, geniculatis. Barr. ic. t. 753. fig. 2 mala.

Nasce intorno Malghera ed in Fusina nei luoghi montuosi; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta perenne.

HOLCUS. (Pferdegrus) Olco.

HERMAPH. *Calice con gluma 1-ovvero 2-flora. Corolla gluma restata sotto la cima. Stami tre. Stili due. Seme uno.*

MASC. *Calice gluma 2-valve. Corolla 0, ovvero 2-valve. Stami tre.*

1. *H. arundinaceus. Nob. (Rohrblättriges P.) O. arundinaceo.*

Spighette uniflore, le ermafrodite sessili restate ovvero mutiche, le maschie pedicellate mutiche. *W. Sp. pl. sub II. halep.*

II. (*halepensis*) Panicula laxa nutante, glumis oblongis, foliis acuminato-setaceis. *Schreb. Gram. p. 128. t. 18.*

Sorghum (*halepense*) Panicula sparsa, glumis oblongis glabris, floris hermaphroditis lanceolatis muticis, foemineo aristato. *Pers. Syn. I p. 101.*

Andropogon (*arundinaceus*) Panicula ramosa multiflora. *Röhl. germ. II p. 108. Schult. aust. I p. 194.*

Gramen palustre arundinaceum, milii panicula, semine phalaridis. *Barrell. ic. t. 8 figur. mala.*

Nasce negli Orti ed intorno Fusina nei Prati e nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

Radice serpeggiante. Fusto alto 2-4 piedi, dritto striato. Nodi pubescenti. Foglie lunghissime, mu-

ricate nel margine. Vagine tereti glabre. Linguetta pelosa. Pannocchia lunga mezzo sino un piede nutante. Spighette alterne unilaterali acute, nitide.

2. *H. lanatus.* (Wolliges P.) *O. lanato.*

Glume biflore villose, l'ermastredito mutico, il maschio con una resta ritorta. *Schreb. gram. p. 145. t. 20. fig. 1.*

H. Glumis villosis mucronatis, flor. masculi arista incurva, foliis vagina tumida villosa. Pers. Syn. I p. 78.

• *Gramen lanatum. Dalech. Hist. p. 425. Bauh. Hist. II p. 466 cum icone.*

Nasce intorno Malghera e nei Treporti specialmente nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

VALANTIA. (Valantie) *Valantia.*

HERMAPH. *Calice o. Corolla 4-fida. Stami quattro: Stilo 2-fido. Seme uno.*

MASC. *Calice o. Corolla 3-4-fida. Stami 3-4. Pistillo abortivo.*

1. *V. Cruciata.* (Gemeine V.) *V. comune.*

Foglie quaterne ellittico-bislunghe trinervi reticolate ispide, peduncoli ramosi glabri bratteati, brattee bislunghe, frutti glabri: *Schult. aust. I p. 309.*

V. foliis quaternis ovatis hirsutis, pedunculis lateralibus diphylis, floribus masculis ut plurimum 4-fidi. Pers. Syn. I p. 129.

Nasce in Campalto e nell' Aca bianca nei luoghi erbosi ed ombrosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

2. *V. tricornis.* (Dreyhörnige V.) V. tricorne.

Foglie ottone aculeate all' indietro, peduncoli tripartiti, frutto nutante granolato. *Roth. neue Beitr.* I p. 142. *Schult. aust.* I p. 310.

V. (*spuria*) Pedunculis trifloris, floribus omnibus pedicellatis, fructu [majusculo] granolato reflexo, caule decumbente simplici aculeato. *Pers. l. c.*
Trovasi, benchè di rado, nei terreni di Santa Marta; fiorisce nei mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta annuale.

PARIETARIA: (Glaskraut) Vetriola.

HERMAPH. Calice 4-fido. Corolla o. Stami quattro elastici. Stilo 1. Seme 1 superiore, prolungato.

FEMM. Calice di due foglie. Seme coperto dal calice secco prolungato.

P. officinalis: (Gemeine G.) V. comune:

Foglie lanceolato-ovate, peduncoli dicotomi, calici di due foglie. *L. Sp. pl. Pers. Synops.* II p. 555.
Röhl. germ. Schult. aust.

P. officinarum et Dioscoridis. Zannich. Ven. p. 204.
t. 272.

Parietaria. I. Bauh. Hist. II p. 976.

Nasce comunemente nei muri e nei Rovinazzi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

ATRIPLEX: (Melde) Atriplice:

HERMAPH. *Calice* di cinque foglie. *Corolla* o. *Stami* cinque. *Stilo* 2-partito. *Seme* uno depresso.

FEMM. *Calice* di due foglie. *Corolla* o. *Stami* o. *Stilo* bipartito. *Seme* uno compresso.

1. *A. portulacoides*. (Portulack M.) *A.* a foglie di porcellana.

Fusto fruticoso giacente, foglie ovate a rovescio interissime opposte. *Pers. Syn.* I p. 293. *Rühl.germ.* II p. 191.

A. maritima angustissimo folio. *Zann. Ven.* p. 32. t. 127.

Nasce nei luoghi bagnati dall'acqua salsa; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto.

2. *A. veneta*. (Venetiänische M.) *A. veneta*.

Fusto eretto erbaceo, foglie inferiori triangolari-astate dentate, le superiori lanceolate quasi astate interissime, frutto con calici rombei acuti, obsoleti tridentati nella cima. *Wild. Diet. Lexicon bot. Nacht.* I p. 420.

A. maritima perennis, folio deltoide, s. triangolari, minus incano? *Zann. Ven.* p. 31. t. 49 cum icone mala.

A. marinae species Valerando? *Eauh. Hist.* II p. 974 cum icone.

Nasce come la precedente, ma più di rado:

3. *A. laciniata*. (Gerissene M.) *A. laciniata*:

Fusto eretto erbaceo, foglie triangolari profonda-

mente dentate, nella pagina inferiore argentee, frutto con calici rombei, trinervi, dentellati. *Schult. aust. I p. 460.*

A. Caule herbaceo, foliis deltoideibus dentatis subtus argenteis. *Pers. l. c.*

Nasce nei luoghi secchi e specialmente intorno Malamocco appresso il mare; fiorisce nei mesi di Agosto e Settembre, ed è pianta annuale.

Fusto più o meno eretto, diffuso. Foglie più lunghe che larghe, ottuse, con denti acuti, pagina superiore glauca, la inferiore con squamette argentee, le superiori astate. Fiori disposti in Spighe panicolate nude. Antere gialle. Calici grandi 3-lobi nella cima. *Schult. l. c.*

4. *A. triangularis.* (Dreieckige M.) *A. triangolare.*

Fusto erbaceo quasi giacente, foglie triangolari-astate quasi interissime, frutto con calici triangolari quasi dentati e 2-mucronati nel disco. *W. Sp. pl.* *Nasce nei Muri e nei Rovinazzi bagnati dall'acqua salsa; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.*

5. *A. patula.* (Ausgebreitete M.) *A. patente.*

Fusto erbaceo patentissimo, foglie triangolari-astate acuminate, quasi dentate, frutto con calici rombei denticolati nella cima e quasi muricati nel disco. *Röhl. germ. II p. 192. Schult. aust. I p. 460.*

A. procumbens, Caule herbaceo patulo, folia triangulari-lanceolata, calic. sem. triangularibus acutis margine et disco dentatis. *Pers. l. c.*

Nasce negli Orti e nei luoghi coltivati; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta annuale.

ACER. (Ahorn) Acero.

HERMAPH. Calice 5-fido. Corolla di cinque petali. Stami otto. Pistillo uno. Samar. 2-3 monosperme terminate da un'ala.

MASC. Calice 5-fido. Corolla 5-petala. Stami otto.

A. campestre. (Feld A.) A. dei campi.

Foglie 5-lobe interissime, con i lobi maggiori ottusi, obsolete quasi sinuate, corimbi eretti. *Röhl. germ. II p. 242. Schult. aust. I p. 602.*

A. fol. 5-lobis obtusis glabris, racemis erectis, cortice tuberoso rimoso. *Pers. Syn. I p. 417.*

Nasce nel Lido ed in Campalto; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta fruticosa.

DIOECIA

FICUS. (Feigenbaum) Fico.

Ricettacolo comune turbinato carnoso connivente con fiori contenuti nell'interno. Fiori maschi e femmine o nello stesso individuo, o in individui diversi.

MASC. Calice tripartito. Corolla o. Stami tre.

FEMM. Calice 5-partito. Corolla o. Pistillo uno. Seme uno chiuso dal calice persistente quasi carnoso.

F. Carica. (Gemeine F.) F. comune.

Foglie cuoriformi 3-5 lobe repando-dentate, lobi ottusi, pagina superiore scabra, la inferiore pubescente, ricettacoli piriformi glabri. *Pers. Syn. II* p. 608. *Röhl. germ. p. 541*.

Nasce nei Treporti nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta arborea.

FINE DELLE PIANTE FENEROGAME.

CRIPTOGAMIA

FILICES.

EQUISETUM. (Schachtelhalm) Equiseto.

Fruttificazione terminale, conica, composta di corpicciuoli cliodiformi, sotto il capo dei quali vi è una serie d' *Invogli* fatti a cartoccio, membranosi che si aprono longitudinalmente dal lato interno, e sono pieni di globetti verdastri sferici muniti di quattro appendici settiformi avvoltate intorno ai globetti in istato di umidità, distese ed aperte in croce in istato di siccità. *Savi.*

1. *E. arvense.* (Acker S.) E. dei campi.

Scapo fruttifero nudo, fronda sterile verticillato-ramosa decumbente. *Gmel. Syst. Nat. II p. 1288.*

Röhl. germ. III p. 14.

Nasce in Campalto ed intorno Malgera nei campi; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta perenne.

2. *E. palustre.* (Sumpf S.) E. paludoso.

Fusto semplice ramoso glabro, rami 5-goni un po' scabri dritti, guaine setacee moltosesse, con denti patenti e scariosi nel margine, amento terminale bislungo. *Röhl. germ. l. c. p. 15.*

E. Caule angulato, frondibus simplicibus. Lin. Sp. pl. Gmel. Syst. l. c.

Nasce nei Prati umidi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

MARSILEA. (Vierblatt) Quadrifoglio.

Fruttificazione radicale. Invoglio comune doppio, gl'interni ovvero proprj 14-18 disposti in due serie, in ogni serie 7-9. Antere e Germi attaccati al lato esterno dell'invoglio interno.

M. quadrifolia. (Gemeines V.) O. comune.

Marsilea. *Röhl. germ.* III p. 26. *Gmel. Syst. Nat.* II p. 1322.

Lenticula palustris quadrifolia. *Bauhin. Histor.* III p. 785 cum icone.

Nasce non lungi da Malghera nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di Giugno e Luglio, ed è pianta perenne.

SALVINIA. (Salvinie) Salvinia.

Fruttificaz. radicale. Invogli fruttiferi doppii uniloculari contenenti alcuni germi ed altri genitali maschi sopra un ricettacolo colonnare.

S. natans. (Gemeine S.) S. nuotante.

Salvinia. *Röhl. germ.* III p. 17.

Marsilea nataus. *L. Sp. pl. Gmel. Syst. Nat.*

Nasce comunemente in Campalto ed intorno Malghera nei Fossi; fiorisce nella State, ed è pianta perenne.

CETERACH. (Ceterach) Cetracca.

Casselle circondate da un *anello* elastico disposte in *sori* lineari trasversali nella pagina inferiore della fronda, senza *coperchio*.

C. officinarum. (Gebräuchliches C.) C. officinale.

Fronde pennatofesse con lobi rotondati quasi eguali, pagina inferiore paleacea. *Röhl. german. sub Grammitis Ceterach. Swarz.*

Asplenium (Ceterach) Frondibus pinnatifidis, laciniis alternis confluentibus obtusis. *Lin. Spec. pl. Gmel. System. Natur. II p. 1301. Savi mat. med. t. 2.*

Asplenium s. Ceterach. Bauh. Hist. III p. 749 cum icone. Barr. ic. t. 1043.

Nasce sopra i tetti e sopra i muri nei luoghi secchi; fiorisce la State, ed è pianta perenne.

ASPIDIUM. (Waldfarn) Aspidio.

Casselle circondate da un *anello* elastico disposte in *sori* rotondi nella pagina inferiore della fronda con *coperchio* caduco.

1. *A. Thelypteris*. (Sumpf W.) A. paludoso.

Fronde quasi bipennate con penne pennatofesse interissime ritorte nel margine, sori nel margine finalmente confluenti. *Röhl. germ. III p. 25.*

Polypodium (Thelypteris) Fronde bipinnata, pinnis pinatifidis integerrimis subtus undique polline tectis. *Lin. Sp. pl. Syst. Nat. a Gmel. II p. 1311.*

Filix mollis s. glabra vulgari mari non ramosa accedens. Bauh. Hist. I I p. 730.

Filix fontis admirabilis ad marem vulgarem non ramosam accedens. *Bauhin. Histor. III p. 731.*

Filix tenuissime et profunde dentata. *Bauh. Historia III p. 149* cum icone.

Filix minor non ramosa. *Bauh. Hist. III p. 731* cum icone.

Nasce in Chioggia nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

2. *A. Filix mas.* (Männlicher E.) A. maschio.

Fronda bipennata bislunga, penne pennate bislunghe alterne, pennole bislunghe ottuse intaccate, seghettate nella cima, sori approssimati alla costa media, stipite squamoso. *Röhl. l. c.*

Polypodium (Filix mas.) Lin. Sp. Gmel. Syst. Nat. Savi mat. med. t. 54.

Nasce nel Lido nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di Luglio ed Agosto, ed è pianta perenne.

ASPLENIUM. (Streinfenfarru) Aspleno.

Casselle circondate da un anello elastico disposte in sori lineari trasversali nella pagina inferiore della fronda, con un coperchio che si apre verso la costa media.

1. *A. Trichomanes.* (Brauner S.) A. bruno.

Fronde pennate con penne subrotonde intaccate. *Lin. Röhl. germ. III p. 29. Savi mat. med. t. 16.*

Nasce nei muri antichi; fiorisce nei mesi di Luglio sino Agosto, ed è pianta perenne.

2: *A. Ruta muraria*. (Mauer S.) *A. murale*.

Fronda alternativamente composta, foglioline cuneiformi quasi trilobe intaccate. *L. Röhl. germ. III p. 29.*

Nasce come la precedente.

MUSCI

TRICHOSTOMUM: (Haarmund) Tricostomo:

Peristoma semplice dentato con denti fessi quasi sino alla base. *Frutto* terminale con *coperchio* be-
rettiforme.

T. pulvinatum. (Polster H.) *T. pulvinato*:

Tronco dritto ramoso, foglie dritte ovato-lanceolate con punta lunga capillare, teca subrotonda ritorta, coperchio restiforme. *Röhl. germ. III p. 61.*

Bryum (pulvinatum) Surculo ramoso, foliis oblongis piliferis, capsulis subrotundis nutantibus, calyptris minutis. *Gmel. Syst. Nat. II p. 1333.*

Nasce sopra i tetti nei luoghi ombrosi; fiorisce nei mesi di Febbraro e Marzo, ed è pianta perenne.

TORTULA. (Schraubenmoos) Tortiglio:

Peristoma cigliato con cigli conuati alla base. *Frutto* terminale.

T. ruralis: (Feld S.) *T. campestre*:

Tronco ramoso, foglie ovate bislunghe piliferi patenti richinate, tecaforo dritto, teca dritta quasi

cilindrica, coperchio lungo conico. *Röhl. germ. II*
p. 78.

Bryum (rurale) Surculo ramoso, foliis reflexis ob-
ovatis obtusis apice piliferis, capsulis cylindricis
operculis conicis acutis. *Gmel. Syst. Nat. II* p. 1335.

*Nasce nei muri e nei luoghi sterili; fiorisce nei me-
si di Febbraio e Marzo, ed è pianta perenne.*

BARBULA. (Bartmoos) Barbola.

Peristoma cigliato con cigli liberi alla base:

B. muralis. (Mauer B.) B. murale.

Tronco ramoso, foglie bislunghe spatolate, pilifere
nella cima, patenti, tecaforo dritto, teca dritta
quasi cilindrica, coperchio conico acuminato. *Röhl.*
germ. III p. 78.

Bryum (murale). Surculo brevissimo subdiviso, fo-
liis ovatis acutis apice piliferis, capsulis oblongis
operculis conicis acutis. *Gmel. System. Natur. II*
p. 1333.

*Nasce sopra i muri e sopra i tetti; fiorisce nei me-
si di Febbraio e Marzo, ed è pianta perenne.*

LESKEA. (Strauchmoos) Surcolaria.

Peristoma dentato-cigliato, denti sedici ed altrettan-
ti cigli cuniformi e connessi alla base da una
membrana. *Frutto* laterale.

L. complanata. (Flaches S.) S. piana.

Surcolo serpeggiante, diviso, pennato, con penne fi-
liformi nella cima, foglie acuminate enervi inte-

rissime, teca dritta ovata, coperchio conico acuminato un poco obliquo. *Röhl. germ.* III p. 85.

Hypnum (complanatum). Frondibus complanatis ramosissimis, foliis distichis imbricatis ovato-obtusis complicatis, capsulis ovatis, operculo conico. *Gmel. Syst. Nat.* II p. 1341.

Nasce nei tronchi degli alberi; fiorisce nei mesi di Febbraro e Marzo, ed è pianta pereunne.

HEPATICAE

MARCHANTIA. (Sternlebermoos) Marcanzia.

Ricettacolo comune peduncolato, peltato, laciniato, con casselle sotto le lacinie. *Cassella* ovata a rovescio uniloculare, che apresi nella cima per lo più in otto lacinie ritorte.

M. polymorpha. (Vielgestaltiges S.) M. poliforme. Fronda lobata ottusa, ricettacolo femmineo raggia-
to, il maschio picciolato. *Röhl. germ.* III p. 131.
EjUSD. tom. I p. 295. t. 4. f. 24. 25.

M. *Surculis obtuse lobatis, capsulis sternatis decem-*
fidis. *Gmel. Syst. Nat.* II p. 1453.

Hepatica secunda. *Zan. Ven.* p. 284. t. 308. minus
bona.

Nasce nei luoghi ombrosi ed umidi; fiorisce nei mesi di Marzo ed Aprile, ed è pianta pereunne.

ALGAE

FUCUS. (Tang) Fuco.

Spore disposte in sporangi aggregati immersi nella sostanza della pianta e muniti di pori mucifluidi, contenenti la fruttificazione.

1. *F. Acinaria*. (Beeren T.) *F. Acinaria*.

Fusto radicato terete-compresso spinuloso ramosissimo, foglie sessili lineari-lanceolate intere, fruttificazioni globoso-vesiculose inani peduncolate. *Wulf. Crypt. aquat. p. 30.*

F. Caule filiformi ramoso, foliis linearibus integerrimis, vesiculis globosis pedunculatis. *Gmel. Syst. Nat. II p. 1380.*

Acinaria Imperati. Ginan. op. post. I p. 18. tab. 16. 17. 18. 19. Donati marin. p. 35. t. 4. f. 1.

Nasce nel Lido e nel Cavallino nel mare.

2. *F. vesiculosus*. (Blasen T.) *F. vesichioso*.

Fronda piana dicotoma bruna con vesiche aerifere sparse, fruttificazione terminale sessile tuberculosa. *Röhl. germ.*

F. Fronde plana dicotoma costata integerrima, vesiculis axillaribus geminis, terminalibus tuberculatis. *Gmel. Syst. Nat. II p. 1280.*

F. Fronde repetito-dichotoma, marginibus integra, caule medium folium transcurrente, vesiculis terminalibus ovalibus faretis verrucosis. *Wulf. l. c. p. 34.*

Quercus marina prima. *Ginan. op. post.* I p. 21. t. 20.
fig. 39.

Virsoides. *Donati marin.* p. 31. t. 4.

Nasce nel mare sopra le pietre, specialmente intorno Fusina e nel luogo del Forte di S. Giuliano non lungi da Malghera.

3. *F. ceranoides*. (Hornartiger T.) *F. corniforme*.

Fronda quasi coriacea, lineare, dicotoma, interissima enerve, piana, più angusta alla base, carnea ovvero porporea, fruttificazione terminale bifida tuberculosa. *Röhl. germ.* III p. 137.

F. Fronde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, vesiculis tuberculatis bifidis terminalibus. *Gmel. Syst. Nat.* II p. 1380.

F. Fronde plana subcoriaceo-membranacea repetitodichotoma, avenia, apicibus dichotomiarum integerrimis oblongo-ovatis. *Wulf. l. c.* p. 37.

Nasce al Cavallino nel mare.

4. *F. lacer*. (Zerrissener T) *F. lacero*:

Fronda piana quasi coriaceo-membranacea, dicotoma senza ordine, avenia, cime dei dicotomi lacero-laciniate. *Wulf. l. c.* p. 38.

F. ceranoides β *lacer*. *Gmel. Syst. Nat.* II p. 1380.

Nasce come la precedente.

5. *F. concatenatus*. (Kettenförmiger T.) *F. catenato*:

Fronda filiforme ramosissima, rametti dicotomi, vesichette monoliformi distanti inuate, foglie lesini-

formi. *Gmel. Syst. Nat. II p. 1382. Roth. Catal. bot. II p. 159.*

F. Caule coriaceo lignescente, tuberoso, erecto, ramosissimo, ramis elongatis paniculatis, aphyllis, ramorum virgis, vesicas oblongo-ovales mucifluas, serius tuberculosas laxè concatenantibus. *Wulf. l. c. p. 49.*

Cremenei Istris abrotani vel Thymi foliis. *Bauhinus Hist. III p. 798 cum figura mala.*

Abiete marino di Teofrasto. *Ginan. op. I p. 17. tab. 15.*

Nasce come la precedente.

CERAMIUM. (Hornfaden) Ceranio.

Casselle accresciute nella superficie dei fili membranaceo-cartilaginei contenenti le spore.

A. *Fili conformi, ovvero inarticolati.*

1. *C. longissimum.* (Längster H.) C. lunghissimo.

Fili conformi tereti, filiformi, cartilaginei dicotomi, rami e rametti quasi unilaterali, prolungati ed assottigliati in cima ed alla base, casselle emisferiche, laterali, sessili e sparse. *Roth. Catal. bot. fasc. III p. 116. Röhl. germ. III p. 139.*

Fucus. Cartilagineus, caule erecto tereti, ramis longissimis globulis lateralibus sessilibus. *Gmel. Syst. Nat. II p. 1384.*

Fucus. Caule brevi gracili terete cartilagineo, ramosissimo, ramis elongatis rectis chordaeformibus, rariter et vage ramulosis, tuberculus spheroidicis

umbilicato-porosis. *Wulf. Crypt. aquat. pag. 48.*

2. *C. flagellare*. Fili ramosi più densi, rami più brevi.

Fucus (confervoides). *Gmel. Syst. Nat. II p. 1384.*
Wulf. l. c. p. 45.

Nasce dentro e fuori della città nelle Lagune e nei Canali.

2. *C. uniforme*. *Nob.* (Finförmiger H.) *C. uniforme*.

Fili tereti conformi, cartilaginei, rami dritti quasi fastigiati e quasi dicotomi, alternamente prolungato-ramulosi, eguali nelle due parti, gracili albedo-flavescenti. *Nob.*

Fucus. Caule tereti cartilagineo, ima a basi ramoso, ramis erectis subfastigiatis, alternatim elongato-ramulosis, utrisque tereti filiformibus, subsimpli-cibus, apice furcatis. *Wulf. Crypt. p. 61.*

Nasce nei Treporti e nel Lido nel mare.

3. *C. gigartinum*. (Zahnästiger H.) *C. dentiforme*.

Fili conformi compressi, cartilaginei, lineari, quasi dicotomi, colla superficie nuda, rami quasi fastigiati, rametti brevi dentiformi quasi distichi, cas-selle nei rami laterali e terminali sessili, globose, nude. *Roth. Cat. fasc. III p. 109.*

Fucus. Fronde cartilaginea filiformi-compressa dichotoma, globulis pedunculatis terminalibus sub-jacente arista. *Gmel. Syst. Veg. II p. 1386.*

Nasce nel Porto del Lido nel mare sopra i sassi.

4. *C. attenuatum*. (Verdünter H.) *C. assottigliato*.

Fili conformi tereti, filiformi, ramosi, cartilaginei, rami e rametti alterni patenti, in cima ed alla base assottigliati, casselle laterali, sessili subrottonde, trasparenti. *Nob.*

Nasce a S. Erasmo nel mare.

5. *C. plicatum*. (Verwickelter II.) C. piegato:

Fili conformi, tereti, filiformi, cartilaginei, diafani, ramosissimi, implicati, rami e rametti sparsi, casselle laterali remquasime, otissi pedunculolate. *Nob.*

C. Filamentis, cartilagineis, teretibus setiformibus, diaphanis ramosissimis, implicatis, continuis, capsulis lateralibus, remotissimis subsessilibus. *Roth.*

Cat. bot. fasc. II p. 162. Röhl. germ.

Fucus. Capillaris uniformis ramosissimus subdiaphanus. *Gmel. Syst. Veg. II p. 1385.*

Nasce a S. Erasmo nei Canali.

6. *C. musciforme*. (Moosartiger II.) E. muschiforme:

Fili conformi, compressi lineari-filiformi, ramosi membranaceo-coriacei, rami e rametti alterni, rametti ultimi dicotomi, il fusto ed i rami coperti nel margine di ciglie, casselle . . . *Nob.*

Fucus. Caule ex tereti plano-compresso, membranaceo-coriaceo, subfiliformi, ramosissimo, ramis divaricato-patentissimis setaceis una cum caule ciliis marginalibus mollibus obsitis. *Wulf. Crypt. p. 47.*

Nasce al Cavallino nel mare.

7. *C. spinosum*. (Dorniger H.) C. spinoso.

Fili conformi tereti, filiformi cartilaginei ramosissi-

mi, rami sparsi, quasi opposti qualche volta, rametti ottusi verticillato terni. *Nob.*

Fucus. *Aphyllus cartilagineus ramosus denticulis verticillato-ternis*. *Gmel. Syst. Veg.* II p. 1386.

Nasce a S. Erasmo nei Canali.

8. *C. setaceum*. (Borslemförmiger H.) *C. setaceo*:

Fili conformi tereti filiformi, coriacei, ramosi, rami alternativamente pennati, rametti semplici ovvero un poco ramosi nella cima, casselle peduncolate bislunghe. *Nob.*

Fucus. *Caule gracili terete, coriaceo, alternatim pinnulatis, pinnulis setaceis subsimplicibus, furculatis*. *Wulf. Crypt. aquat* p. 59.

Nasce a S. Erasmo nel mare sopra le pietre.

B. *Fili spuriamente ginocchiati*:

9. *C. torulosum*. (Wulstartiger H.) *C. toruloso*.

Fili quasi membranacei, tubulosi, tereti, torulosi, ramosissimi, spuriamente ginocchiati, dalle stretture quasi regolari, rami dicotomi e verticillati, casselle nei rami supremi verticillate, conico-troncate, sessili. *Roth. Cat. bot. fasc.* III p. 125.

Nasce nel Cavallino nel mare.

C. *Fili ginocchiati, ginocchi fasciati*:

10. *C. elongatum*. (Werlängerter H.) *C. prolungato*:

Fili ginocchiati filiformi, cartilaginei, tereti opaci dicotomi con rami e rametti setacei proluogati, diffusi,

ginocchi fasciati sottili opaci, articolazioni la metà più brevi del diametro, quasi pellucide, reticolato-venose, casselle racemose laterali pedicellate subrotonde nude. *Röth. Cat. fasc. III p. 128.*

Nasce a S. Erasmo ed ai Treporti nel mare e sopra i sassi.

11. *C. inflexum*. (Gebogener H.) C. piegato.

Fili ginocchiati filiformi, tereti, cartilaginei, opaci, flessili, densamente ramosi, rami setacei sparsi approssimati, quasi distuchi, insieme con i rametti capillari, in diversi modi piegati, ginocchi fasciati angusti quasi elevati, articolazioni eguali al diametro della lunghezza striate, casselle laterali, sessili, sparse, emisferiche. *Roth. Cat. fascic. III p. 131. Röhl. germ.*

Fucus (flexilis). Caule gracili terete cartilagineo alternatim supradecomposito-ramoso, ramis patentissimis inordinate ramificatis. *Wulf. Cript. p. 60?*
Nasce nel Porto del Lido sopra i sassi.

12. *C. hirsutum*. (Kurzhaariger H.) C. irsuto.

Fili ginocchiati filiformi, tereti, quasi cartilaginei, irsuti, ramosissimi, rami alternativamente ricomposto-pennati, pennole alterne fascicolato-moltofesse, ginocchi fasciati oscuri, articolazioni quasi eguali al diametro della lunghezza, trasparenti, casselle ascellari solitarie pedunculato, ovate, che si aprono nella cima. *Roth. Cath. fasc. III p. 137. Röhl. germ.*

C. hirsutum. Roth. Cath. fasc. II p. 169. t. IV.

Nasce nel Lido e nei Treporti nel mare.

13. *C. Wulfenii* (Wulfens H.) C. di Wulfen.

Fili ginocchiati filiformi, tereti quasi cartilaginei, quasi opaci, densamente ramosi, rami alternativamente ricomposto-pennati, rametti pennatofessi setacei quasi incurvi, ginocchi fasciati angustissimi oscuri, articolazioni la metà più brevi del diametro, casselle laterali sessili quasi diafane, ovate a rovescio. *Roth. Cat. bot. fasc. III p. 140. Röhl. germ. Fucus (fruticulosus)*. Caule gracili coriaceo-terete, supradecomposito-ramosissimo diffuso, ramis subsetaceis alternatim laxe ramulosis, ramulis exiguis subpinnato denticulatis. *Wulf. Crypt. aquat. p. 55.*
Nasce al Cavallino nel mare.

14. *C. confervoides*. (Konfervenartiger H.) C. confervoide.

Fili ginocchiati capillacei, tereti, membranacei, densissimi, ramosissimi, ineguali, rami e rametti alterni, fascicolati, ginocchi fasciati quasi contratti opaci, articolazioni eguali al diametro della lunghezza, subrotondi pellucidi, casselle laterali, peduncolate, ovali-acuminate. *Roth. Cat. fasc. III p. 148.*

C. confervoides. Roth. l. c. fasc. I p. 151. t. 8. fig. 4. Röhl. germ. III p. 143.

Conferva (littoralis). Filamentis ramosissimis elongatis scabriusculis. *Gmel. Syst. Vegt. II p. 1393.*

Nasce nella Laguna a S. Marta, sopra altre piante marine.

15. *C. virgatum*. (Ruthenförmiger H.) *C. verghiforme*.

Fili ginocchiati filiformi, tereti quasi cartilaginei, ineguali ramosissimi, rametti setacei, forcati nella cima, ginocchi fasciati, più o meno ristretti, articolazioni quasi tre volte più lunghe del diametro, più o meno inflatte quasi trasparenti, casselle laterali solitarie, remote, sessili quasi globose ed invogliate alla base. *Roth. Cat. bot. III p. 152. Röhl. germ. III p. 144.*

C. virgatum. Roth. l. c. fasc. I p. 148. t. 8. f. 1.

Nasce nel Lido e nei Treporti nel mare.

16. *C. diaphanum*. (Durchscheinender H.) *C. diafano*.

Fili ginocchiati, capillari, tereti, membranacei, ineguali, repetito-dicotomi ramosissimi, rami fastigiati, rametti ultimi conniventi-tenaglififormi, ginocchi fasciati un poco grossi glabri, opaci, articolazioni cilindrace, trasparenti, cinque volte più lunghe del diametro, casselle globose, sessili, solitarie, in fine lateralmente invogliate. *Roth. Cat. bot. fasc. III p. 154. Röhl. germ. III p. 144.*

Conferva (*diaphana*). Filamentis capillaribus geniculatis, meras per dichotomia elongatas, ramosissimis, certimis breviter conniventi-forcipatis, geniculis glabris. *Wulf. Crypt. p. 26.*

β *C. elegans. Roth. l. c. fasc. I p. 224.*

γ *C. fastigiatum. Roth. l. c. fasc. III p. 155.*

Conferva (*fastigiata*) Filamentis plus quam capillaceis, mollissimis, geniculatis, ramosissimis, ramis repetitodichotomis fastigiatis, articulis quam genicula duplo longioribus. *Wulf. Crypt. aquat. p. 28.*

Nasce nel Porto del Lido sopra i sassi e sopra altre piante.

17. *C. fastigiatum*. (Gleichhoher II.) *C. fastigiato*.

Fili ginocchiati capillari, tereti cartilaginei, quasi eguali ramosissimi, rametti fastigiati fascicolati, i terminali brevissimi forcolati, ginocchi fasciati quasi pellucidi, articolazioni la metà più brevi del diametro, casselle laterali solitarie sessili, subrotonde nude. *Roth. Cat. fasc. III p. 157. Röhlg. germ.*

Nasce come la precedente.

CONFERVA. (Konferve) Conferva.

Tubi ovvero fili erbacei, contenenti nelle pareti interne, le spore inservienti alla propagazione.

A. TUBULOSE.

a. *Inarticolate*.

1. *C. intestinalis*. (Darmförmige K.) *C. intestiniforme*.

Tubi semplici inarticolati inflati sinuosi flavo-viridi.

C. intestinalis. Roth. Cat fasc. II p. 159. Röhling germ. II p. 147.

C. Filamentis simplicibus cylindraceo-tubulosis inarticulatis, serius inaequaliter per omnem longitudinem tuberosae intumescens. Wulf. Crypt. aquat. p. 13.

Nasce comunemente nei Canali.

b. *articolate per stretturae*.

2. *C. crinita*. (Haarige K.) *C. crinita*.

Tubetti filiformi, tereti, lunghissimi, per remoti

intervalli, semi strangolato-articolati, ramosi, rami sparsi dalla base tuberosa capillari, lunghi semplici. *Roth. Cat fasc. III p. 174.*

C. crinita. *Roth. Cat. bot. fasc. I p. 162. t. 1. fig. 3. Röhl. germ.*

C. Filamentis filiformis-tubulosis, strictis laxissime semistrangolato-articulatis, vage ramulosis, ramulis setaceo-tubulosis, caetera homogeneis. *Wulfen Crypt. aquat. p. 15.*

Nasce nelle Lagune.

3. *C. compressa.* (Zusammengedrückte K.) *C. compressa.*

Tubetti semplici e ramosi varj, semistrangolato-articolati compressi. *Roth. Cat. fasc. III p. 175. Röhl. germ. III p. 148.*

C. Filamentis tereti-tubulosis, semistrangolato-articulatis, vage parceque ramosis, articulis oblongo-ovalibus. *Wulf. Crypt. aquat. p. 14.*

Ulva (compressa). Tubulosa, ramosa, compressa. *Gmel. Syst. Veget. II p. 1391.*

Nasce nella Laguna sopra i Sassi e sopra le Conchiglie.

4. *C. clathrata.* (Gegitterte K.) *C. clathrata.*

Tubetti setacei tereti continui, sparsamente ramosi, venoso-clatrati, per intervalli indeterminati semistrangolato-quasi articolati, rami e rametti quasi unilaterali capillari divaricati. *Roth. Catal. bot. fasc. III p. 175. Röhl. germ. III p. 148.*

Nasce nel Porto del Lido sopra le pietre.

B. FILAMENTOSE.

α *Continue.*

* *Ramose.*

5. *C. tenax.* (Zähe K.) *C. tenace.*

Fili continui, filiformi, plicato-rugosi alla base ramosissimi, rami setacci sparsi, ristretti, inferiormente quasi ramosi, superiormente fascicolati: *Roth. Cat. bot. fasc. III p. 182.*

Nasce dentro della Città nei Canali.

β *articulate, ginocchi spuri.*

a *annullate.*

6. *C. Flos aquae.* (Wasserblüthe) *C. Fior d'acqua.*

Fili semplici continui, tenuissimi, dritti, che nuotano a guisa di membrana sopra l'acqua, zone interstiziali pellucide due volte più larghe degli anelli dei sporangi tenuissimi appena visibili. *Roth. Cat. bot. fasc. III p. 192. Röhl. germ. III p. 151.*

Nasce in Campalto nei Fossi di acqua dolce.

b *Utricoli matricali.*

* *Ramose.*

7. *C. fracta.* (Zerbechliche) K. *C. fratta.*

Fili ramosissimi, densissimi, capillari, sottilissimi, spuriamente ginocchiati, rami e rametti alterni divaricati, utricoli formanti articoli, cilindrici lunghissimi finalmente ovati. *Roth. Cat. bot. III p. 130. Röhl. germ. III p. 155.*

Nasce nella Laguna non lungi da S. Secondo.

8. *C. glomerata.* (Knauel K.) *C. glomerata.*

Fili ramosissimi capillacei, spuriamente ginocchati, rami alterni, rametti ultimi fastigiati, brevi, dritti, semplici, quasi unilaterali, utricoli matricali formanti articoli cilindracei, quattro volte più lunghi che larghi. *Roth. Cat. bot. III p. 235. Röhl. germ. III p. 155.*

β *C. marina*.

Nasce abbondevolmente nel Porto del Lido in mare.

9: *C. rupestris*. (Felsen K.) *C. rupestre*.

Fili ramosissimi fascicolati, capillacei drittissimi vergati, ottusi nella cima, spuriamente ginocchati, rami appoggiati, utricoli matricali somiglianti agli articoli, cilindracei dall'una e dall'altra parte, un poco ristretti, quattro volte più lunghi del suo diametro. *Rot. Cat. bot. fasc. III p. 243. Röbling germ. III p. 156.*

C. filamentis ramosissimis viridibus. Gmel. Syst. Vegt. II p. 1395.

β *C. glauca*. Rametti quasi fastigiati ed assottigliati nella cima. *Roth. l. c.*

Nasce nei Canali intorno S. Marta:

γ *Articolate di ginocchi veri:*

a *Fasciate.*

* *Semplici.*

10. *C. Linum*: (Flachs K.) *C. Lino*.

Fili semplici filiformi lunghissimi, un poco rigidi, eguali, piegati in dentro, ginocchati, ginocchi fasciati sottili trasparenti, articolazioni eguali al

diametro ristretti e rugosi per siccità. *Roth. Cat. bot. fasc. III p. 257.*

C. Filamentis simplicissimis tereti-filiformibus longissimis geniculatis, articulis geniculisque breviter annularibus, aequalibus. *Wulf. Crypt. aquat. p. 19.*
 Conserva marina di filamenti lunghi Lino acquatico.
Ginan. op. post. I p. 27. t. 33. f. 72.

Nasce nel Lido in mare, e specialmente nelle Lagune di Chioggia:

11: *C. capillaris*: (Haarförmige K.) *C. capillare.*

Fili semplici capillari flessili, eguali, ginocchiati, ginocchi fasciati sottili quasi trasparenti, articolazioni la metà più lunghe del diametro, per siccità alternativamente compressi. *Roth. Cat. bot. III p. 260. Röhl. germ. III p. 260.*

C. Filamentis geniculatis simplicibus, alternatim compressis. *Gmel. Syst. Nat. II p. 1393.*

C. Filamentis simplicissimis capillaribus, longissimis geniculatis, articulis cylindricis, duplo quam genicula longioribus. *Wulf. Crypt. aquat. p. 19.*

Nasce comunemente nella Laguna intorno San Secondo.

12: *C. setacea*. (Borstenförmige K.) *C. setacea.*

Fili largamente ramosi, dicotomi, setacei, drittissimi quasi lubrici, eguali, ginocchiati, rami prolungati quasi divisi, ginocchi fasciati, angustissimi, pellucidi, articolazioni cilindracee opache sanguinee, sei volte più lunghe del diametro. *Roth. Cat. bot. III p. 278.*

Nasce nei Canali a Sant'Erasmus sopra le Conchiglie e sopra altre piante.

13. *C. subdivisa*: (Armästige K.) *C. subdivisa*.

Fili superiormente quasi ramosi, setacei, dritti, quasi ineguali, ginocchiati, ginocchi fasciati, molto tenuissimi, articolazioni cilindracee, sei volte più lunghe del diametro, spore cilindriche un poco grosse. *Roth. Cat. bot. III p. 287. Röhl. germ. Trovasi nella Laguna non lungi da S. Secondo.*

14. *C. ciliata*. (Gewimperte K.) *C. ciliata*.

Fili repetito-dicotomi setacei, membranacei, ginocchiati, rametti ultimi piegati in dentro conniventi-tenagliforimi, ginocchi fasciati opaci, circondati da peli, articolazioni trasparenti appena più lunghe del diametro. *Roth. Cat. bot. III p. 295. Röhl. germ.*

C. (pilosa). Filamentis, ramosis, dichotomis, setaceis, ramulis forcipatis apice inflexis, geniculis annularibus, obscuris pilosis, articulis cylindricis pellucidis glabris. *Roth. l. c. fasc. II p. 225. t. V fig. 2.*

Nasce sopra le Pietre nel Porto del Lido ed al Cavallino sopra altre piante marine.

b *Verticillate*.

15. *C. Myriophyllum*. (Tausendblättrige K.) *C. millefolgia*.

Fili ramosi setiformi cartilaginosi, ginocchiati, insieme coi rami divaricati, cinti ai ginocchi da ra-

metti verticillari, capillari, forcati, incurvi, due volte più lunghi degli articoli. *Roth. Cat. bot.* III p. 312.

Fucus (*verticillatus*). Caule tereti filiformi cartilagineo, supradecomposito-ramoso, ramis subdichotomis diffusis, setulis homogeneis multifidis verticillatim obtectis. *Wulf. Crypt. aquat.* p. 41. t. 1. bona!

Nasce nel Lido in mare.

ULVA. (Watte) Ulva.

Spore accresciute sotto l'epidermide, d'una membrana diffusa e trasparente, e specialmente nel margine.

A. Fronde distinte alla base.

1. **U. Lactuca.** (Salat W.) U. Lattuca marina:

Fronde membranacee, più da una base, distinte bislunghe, piane, quasi ondate, inferiormente attenuate, verso la cima dilatate laciniate. *Roth. Cat. bot.* II p. 245. *Röhl. germ.* III p. 170.

U. palmata prolifera, membranacea, ramentis angustatis. *Gmel. Syst. Nat.* II p. 1391.

U. Frondibus caespitose aggregatis, rectis, oblongis anguste decurrentibus, superiora versus latescentibus, serius laciniatis, proliferisve. *Wulf. Crypt. aquat.* p. 3.

Nasce comunemente dentro e fuori della Città nei Casali.

2. *U. purpurea*: (Purpurrothe W.) *U. porporea*:
 Fronde membranacee solitarie, bislungo-lanceolate,
 piane, col margine intero, ondate. *Roth. Cat. bot.*
fasc. II p. 245. Röhl. l. c.
U. purpurea. Roth. Cat. bot. fasc. I p. 209. tab. 6.
fig. 1.
U. (sericea). Frondibus subaggregatis simplicibus
oblongo-subovatis, planis, sessilibus, ora marginis
undulato plicatis. Wulf. Crypt. aquat. p. 5.
Nasce comunemente nei Canali della Città; si trova
nei mesi di Dicembre sino Febbraro.
3. *U. lanceolata*. (Lanzettblättrige W.) *U. lanceo-*
lata;
 Fronde membranacee solitarie, cespitose, lanceola-
 te, piane, interissime, dall'una e dall'altra par-
 te annuate. *Roth. Cat. bot. fasc. II p. 246. Röhl.*
germ. III p. 170.
U. fronde lineari aut simpliciter lanceolata integra,
plana, in filum decurrente, serius margine fle-
xuosa. Wulf. Crypt. aquat. p. 1.
Nasce ael Porto del Lido sopra le Pietre.
4. *U. Linza*. (Zusammengelegte W.) *U. raddoppiata*.
 Fronde membranacee, solitarie, bislunghe, raddop-
 piate, ondate, bullate. *Roth. Catal. bot. fasc. II*
p. 246.
Nasce nella Città nei Canali.
5. *V. dichotoma*. *Nob.* (Gabelige W.) *U. dicotoma*.
 Fronde membranacee, più da una base, congiunte,

dicotome, lineari, piane, ondate nel margine, di color roseo. *Nob.*

U. ramosa. Huds flor. angl. p. 476?

Nasce nel mare a S. Erasmo.

Fronde arrivano alla lunghezza di circa un'oncia ed alla larghezza di circa una linea, cespitose, membranacee, di color roseo, dicotome, lineari, piane, ondate nel margine. Rami lineari, anche dicotomi, come tutta la fronda trasparenti, ed attaccati fortemente alla carta, nella quale è imposta.

LICHENES

PARMELIA. (Schüsselflechte) *Parmelia.*

Tallo polimorfo. Scutelle concave elevate sopra il tallo, e coronate da margine libero.

P. parietina. (Stein P.) *P. parietina.*

Tallo orbicolare a colore di zafferano di sotto più pallido un poco fibroso, lacinie connate appoggiate piane, verso la cima dilatate, rotondate, apotecii nel mezzo concolori, ovvero di colore arancino, con margine intero. Röhl. germ. tom. III pars II p. 95.

Nasce sopra hli alberi e sopra i muri.

CENOMYCE. (Hohlschwammflechte) *Cenomice.*

Tallo cartilagineo crostaceo folioso laciniato. Peduncoli tubulosi ciatiformi semplici e ramosi nella

cima, con e senza apoteci. *Cefalodj* tubulosi per lo più bruni o neri nella cima dei peduncoli.

C. damaecornis. (Dammbirschhornartige H.) *C. damaecorniforme*.

Tallo membranaceo irregolarmente laciniato di sopra giallastro, lacinie moltofesse quasi canalicolate crispe ciliate da peli neri, scodelle turbinatae cilindriche dentellate, apotecio marginale picciolo sessile. *Röhl. germ. III pars II p. 120.*

Nasce nei Treporti sopra la terra.

FUNGI

MUCOR. (Schimmel) Muffa.

Ricettacoli membranosi pedicellati globosi prima diafani, in fine opachi. *Semi* nudi quasi coerenti.

1. *M. Mucedo*. (Gemeiner M.) S. comune.

Conferto, stipite semplice, capolini piccoli diventando neri. *Röhl. germ. III pars III p. 110.*

M. Stipitatus, capsula globosa. *Gmel. Syst. Nat. II p. 1486.*

Nasce nei luoghi umidi sopra le frutta, e sopra il pane ec. ec.

2. *M. herbariorum*. (Kräuter S.) *M. erbariola*:

Senza stipite, giallastro persistente, cassella globosa sessile, sopra tomento corticoso. *Röhl. germ. l. c. p. 111.*

Nasce sopra le piante asciutte nei luoghi umidi.

AGARICUS. (Blätterschwamm) Agarico.

Senza *Folva*. Cappello polimorfo. Foglie intere ovvero frammischiate da più piccole di rado semplici, ramosi.

1. *A. bicolor*. (Zweifarbiger B.) A. bicolore.

Cappello carnoso concavo, rossastro, ovvero bruno piegato in dentro nel margine quasi tomentoso, foglie quasi violacee, stipite grosso un poco tuberoso tomentoso concolore. *Röhl. germ. LI pars III p. 158.*

Si trova, benchè di rado, negli Orti nei luoghi ombrosi nei mesi di Settembre ed Ottobre.

2. *A. campestris*. (Feld B.) A. campestre.

Cappello carnoso piano con squamme brune, stipite corto, anello imperfetto. *Röhl. loc. cit. p. 220. Trattin. Fung. p. 1. t. 1. f. 2.*

A. Pileo convexo canescente maculis piloso-squamosis, lamellis inaequalibus introrsum rotundatis (adulti) rufescentibus, stipite albido recto. *Gmel. Syst. Nat. II p. 1399.*

Nasce nei Letamieri nel mese di Settembre.

3. *A. fimetarius*. (Gemeiner B.) A. del letame:

Stipitato, cappello campaniforme lacero, foglie nere lateralmente flexuose. *Lin. Sp. pl.*

Nasce negli Orti nei luoghi umidi.

DAEDALEA: (Labyrinthenschwamm) Labirintario.
 Cappello smezzato carnoso, suberoso, nella pagina
 inferiore munito da sinuosità buchiformi, retiforme:

D. quercina. (Eichen L.) L. quercino.

Fungo coriaceo di color ligneo, cappello piccolo ru-
 goso glabro, foglie grandi sinuose ramose. *Röhl.*
germ. III pars III p. 259. Tratt. Fung. tab. II
fig. 3.

Merulius quercinus. Suberoso coriaceus planus vil-
 losus, semiorbicularis, annulis diversi colori pi-
 ctus, venis confer-anastomosantibus ochroleucis
 flavisve. *Gmel. Syst. Nat. II p. 1431.*

Nasce in Campalto sopra le Quercie.

BOLETUS. (Löcherschwamm) Boletto.

Cappello polimorfo. Imenio poroso da tubi. Pori e
 tubi bislungo-rotondi interi.

1. *B. crispus.* (Krauser L.) B. crispo.

Cappelli imbricati nerastri rugosi, con margine cri-
 spo quasi ondato e quasi cartaceo, pori grandetti
 ineguali argenteo-cinerei. *Röhl. germ. III pars III*
p. 271.

Nasce in Campalto sopra i tronchi arborei.

2. *B. fomentarius:* (Zunder L.) B. fomentario.

Smezzato duro, cappello quasi triquetto debole, qua-
 si cordelliforme cinereo, pori in principio bian-
 chi grisei, finalmente quasi neri. *Röhl. loc. cit.*
p. 273.

§ *B. pomarius*: Smezzato piccolo, circa un'oncia e mezza largo ed alto, cappello perpendicolare cinereo-brunastro, pori piani nerastri. *Röhl. l. c.*

Nasce come la precedente; § sopra i tronchi degli alberi fruttiferi.

F I N E .

INDICE.

A

Acer		<i>suaveolens</i>	pag: 90
<i>campestre</i>	pag. 251	Alnus	
Achillea		<i>glutinosa</i>	„ 231
<i>magna</i>	„ 217	Alopecurus	
<i>Millefolium</i>	„ 216	<i>agrestis</i>	„ 18
Acorus		Alsine	
<i>Calamus</i>	„ 95	<i>media</i>	„ 85
Agaricus		Althaea	
<i>bicolor</i>	„ 279	<i>officinalis</i>	„ 169
<i>campestris</i>	„ ivi	Amaranthus	
<i>fmietaris</i>	„ ivi	<i>Blitum</i>	„ 233
Agrimonia		<i>hybridus</i>	„ 234
<i>Eupatoria</i>	„ 117	<i>prostratus</i>	„ ivi
Agrostis		Anagallis	
<i>alba</i>	„ 16	<i>phoenicea</i>	„ 56
<i>interrupta</i>	„ 15	<i>caerulea</i>	„ ivi
<i>sylvatica</i>	„ ivi	Andropogon	
Ajuga		<i>Gryllus</i>	„ 244
<i>reptans</i>	„ 137	<i>Ischaemum</i>	„ ivi
Alisma		Angelica	
<i>Plantago</i>	„ 100	<i>sylvestris</i>	„ 79
Allium		Anthemis	
<i>angulosum</i>	„ 91	<i>Cota</i>	„ 216
<i>carinatum</i>	„ 90	Anthericum	
<i>sphaerocephalon</i>	„ 91	<i>ramosum</i>	„ 92

Anthoxanthum		Arum	
<i>odoratum</i>	pag. 7	<i>italicum</i>	pag. 237
Anthyllis.		Arundo	
<i>Vulneraria</i>	„ 175	<i>arenaria</i>	„ 36
Antirrhinum		<i>Donax</i>	„ 35
<i>majus</i>	„ 155	<i>Phragmites</i>	„ 36
Apium		Asparagus	
<i>graveolens</i>	„ 83	<i>officinalis</i>	„ 93
Apocynum		<i>acutifolius</i>	„ 94
<i>venetum</i>	„ 68	Asperugo	
Apargia		<i>procumbens</i>	„ 53
<i>hastilis</i>	„ 194	Asperula	
Arabis		<i>cynanchica</i>	„ 43
<i>Thaliana</i>	„ 164	Aspidium	
Arctium		<i>Thelypteris</i>	„ 255
<i>glabrum</i>	„ 199	<i>Filix mas.</i>	„ 256
Arenaria		Asplenium	
<i>marina</i>	„ 111	<i>Ruta Muraria</i>	„ 256
<i>media</i>	„ ivi	<i>Trichomanes</i>	„ 257
<i>rubra</i>	„ ivi	Aster	
<i>serpyllifolia</i>	„ ivi	<i>Tripolium</i>	„ 210
Aristolochia		Astragalus	
<i>Aematitis</i>	„ 223	<i>glyciphyllus</i>	„ 181
<i>rotunda</i>	„ ivi	Atriplex	
Artemisia		<i>laciniata</i>	„ 249
<i>Abrotanum</i>	„ 205	<i>patula</i>	„ 250
<i>caerulescens</i>	„ 206	<i>portulacoides</i>	„ 249
<i>campestris</i>	„ 205	<i>triangularis</i>	„ 250
<i>paniculata</i>	„ ivi	<i>veneta</i>	„ 249
<i>vulgaris</i>	„ 206	Avena	
		<i>strigosa</i>	„ 35

B

Ballota		<i>media</i>	pag: 29
<i>nigra</i>	pag: 145	Bromus	
Barbula		<i>sterilis</i>	„ 31
<i>muralis</i>	„ 258	<i>madritensis</i>	„ 32
Bellis		<i>mollis</i>	„ 31
<i>perennis</i>	„ 214	<i>pinnatus</i>	„ 32
Berberis		<i>squarrosus</i>	„ 31
<i>vulgaris</i>	„ 98	Bryonia	
Betonica		<i>dioica</i>	„ 238
<i>officinalis</i>	„ 143	Bunias	
Bidens		<i>Erucago</i>	„ 157
<i>tripartita</i>	„ 202	Bupleurum	
Boletus		<i>rotundifolium</i>	„ 75
<i>crispus</i>	„ 280	Batomus	
<i>fomentarius</i>	„ ivi	<i>umbellatus</i>	„ 105
Borago		Buxus	
<i>officinalis</i>	„ 53	<i>sempervirens</i>	„ 231
Briza			

C

Cakile		Campanula	
<i>maritima</i>	„ 157	<i>pyramidalis</i>	„ 58
Caltha		<i>Rapunculus</i>	„ 58
<i>palustris</i>	„ 136	Cardamine	
Camelina		<i>hirsuta</i>	„ 161
<i>sativa</i>	„ 161	<i>pratensis</i>	„ 162

Carduus		<i>diaphanum</i>	pag. 268
<i>acanthoides</i>	pag. 200	<i>elongatum</i>	„ 265
<i>Marianus</i>	„ 201	<i>fastigiatum</i>	„ 269
<i>nutans</i>	„ 200	<i>gigantinum</i>	„ 263
Carex		<i>hirsutum</i>	„ 266
<i>caespitosa</i>	„ 229	<i>inflexum</i>	„ ivi
<i>extensa</i>	„ 227	<i>longissimum</i>	„ 262
<i>hirta</i>	„ 230	<i>muscifforme</i>	„ 264
<i>muricata</i>	„ 226	<i>plicatum</i>	„ ivi
<i>nitida</i>	„ 228	<i>setaceum</i>	„ 265
<i>recurva</i>	„ 229	<i>spinosum</i>	„ 264
<i>tomentosa</i>	„ 227	<i>torulosum</i>	„ 265
<i>pilulifera</i>	„ ivi	<i>uniforme</i>	„ 263
<i>vulpina</i>	„ 226	<i>virgatum</i>	„ 268
<i>paludosa</i>	„ 229	<i>Wulfenii</i>	„ 267
<i>panicea</i>	„ 228	Cerastium	
Carthamus		<i>ovale</i>	„ 115
<i>lanatus</i>	„ 199	Ceterach	
Caucalis		<i>officinarum</i>	„ 255
<i>Anthriscus</i>	„ 77	Cheiranthus	
<i>grandifloru</i>	„ 76	<i>Cheiri</i>	„ 164
Cenomyce		Chelidonium	
<i>damaecornis</i>	„ 278	<i>majus</i>	„ 127
Centaurea		Chenopodium	
<i>Calcitrapa</i>	„ 218	<i>album</i>	„ 71
<i>Cyanus</i>	„ 267	<i>maritimum</i>	„ 73
<i>Jacea</i>	„ 218	<i>olidum</i>	„ 72
<i>paniculata</i>	„ 217	<i>polyspermum</i>	„ ivi
Ceramium		<i>Scoparia</i>	„ 73
<i>attenuatum</i>	„ 263	<i>urbicum</i>	„ 71
<i>confervoides</i>	„ 267	<i>viride</i>	„ 72

Chlora		<i>intestinalis</i>	pag. 269
<i>perfoliata</i>	pag. 102	<i>Linum</i>	„ 272
Chondrilla		<i>Myriophyllum</i>	„ 274
<i>juncea</i>	„ 193	<i>rupestris</i>	„ 272
Chrysanthemum		<i>setacea</i>	„ 273
<i>Leucanthemum</i>	„ 215	<i>subdivisa</i>	„ 274
Chrysocoma		<i>tenax</i>	„ 271
<i>Lynosyris</i>	„ 203	Conium	
Cichorium		<i>maculatum</i>	„ 78
<i>Intybus</i>	„ 198	Convallaria	
Clematis		<i>Polygonatum</i>	„ 94
<i>maritima</i>	„ 133	Convolvulus	
<i>recta</i>	„ ivi	<i>arvensis</i>	„ 57
<i>Vitaba</i>	„ 132	<i>sepium</i>	„ ivi
<i>Viticella</i>	„ ivi	<i>Soldanella</i>	„ ivi
Clinopodium		Conyza	
<i>vulgare</i>	„ 146	<i>squarrosa</i>	„ 207
Enicis		Coriandrum	
<i>arvensis</i>	„ 201	<i>sativum</i>	„ 87
<i>lanceolatus</i>	„ ivi	Cornus	
Cochlearia		<i>sanguinea</i>	„ 48
<i>Draba</i>	„ 158	Coronila	
Conferva		<i>varia</i>	„ 179
<i>capillaris</i>	„ 273	Corylus	
<i>ciliata</i>	„ 274	<i>Avellana</i>	„ 237
<i>clathrata</i>	„ 270	Crataegus	
<i>compressa</i>	„ ivi	<i>Oxiacantha</i>	„ 123
<i>crinita</i>	„ 269	Crepis	
<i>flos aquae</i>	„ 271	<i>foetida</i>	„ 196
<i>fracta</i>	„ ivi	<i>pulchra</i>	„ ivi
<i>glomerata</i>	„ ivi		

Crithmum		Cynoglossum	
<i>maritimum</i>	pag: 78	<i>officinale</i>	pag: 51
Crypsis		Cyperus	
<i>schoenoides</i>	„ 17	<i>flavescens</i>	„ 11
Cucubalus		<i>longus</i>	„ ivi
<i>Behen</i>	„ 108	<i>Monti</i>	„ 12
Cuscuta		<i>virescens</i>	„ 11
<i>vulgaris</i>	„ 70	Cytisus	
Cynosurus		<i>purpureus</i>	„ 178
<i>echinatus</i>	„ 24	Cynodon	
		<i>Dactylon</i>	„ 23

D

Dactylis		<i>Consolida</i>	„ 130.
<i>glomerata</i>	„ 24	Digitaria	
Daedalea		<i>sanguinalis</i>	„ 22
<i>quercina</i>	„ 280	Dipsacus	
Datura		<i>sylvestris</i>	„ 41
<i>Stramonia</i>	„ 61	Dorycnium	
Daucus		<i>fruticosum</i>	„ 187
<i>Carota</i>	„ 77	Draba	
Delphinium		<i>verna</i>	„ 160

E

Echinophora		<i>vulgare</i>	„ 53
<i>spinosa</i>	„ 75	Epilobium	
Echium		<i>pubescens</i>	„ 101

<i>rosmarinifolium</i>	pag. 101	Erysimum	
<i>tetragonum</i>	„ 102	<i>officinale</i>	„ 163
Equisetum		Evonymus	
<i>arvense</i>	„ 253	<i>europaeus</i>	„ 65
<i>palustre</i>	„ 254	Eupatorium	
Erica		<i>canabinum</i>	„ 203
<i>herbacea</i>	„ 102	Euphorbia	
Erigeron		<i>Chamaesice</i>	„ 118
<i>acre</i>	„ 208	<i>Cyparissias</i>	„ 120
<i>canadense</i>	„ ivi	<i>Helioscopia</i>	„ ivi
<i>diversifolium</i>	„ ivi	<i>palustris</i>	„ 121
Erodium		<i>Paralias</i>	„ 119
<i>Cicutarium</i>	„ 166	<i>Peplis</i>	„ ivi
<i>malacoides</i>	„ 167	<i>Peplus</i>	„ ivi
Eryngium		<i>platyphyllos</i>	„ 120
<i>maritimum</i>	„ 74	Euphrasia	
Erythraea		<i>Odontites</i>	„ 151
<i>Centaurium</i>	„ 68	<i>officinalis</i>	„ ivi

F

Fedia		Fucus	
<i>olitoria</i>	„ 8	<i>Acinaria</i>	„ 260
Festuca		<i>ceranoides</i>	„ 261
<i>elatior</i>	„ 30	<i>concatenatus</i>	„ ivi
<i>Myurus</i>	„ 29	<i>lacer</i>	„ ivi
<i>uniglumis</i>	„ 30	<i>vesiculosus</i>	„ 260
Ficus		Fumaria	
<i>Carica</i>	„ 252	<i>officinalis</i>	„ 171
Fragaria		<i>parviflora</i>	„ 172
<i>vesca</i>	„ 125		

G

Galega		<i>Robertianum</i>	pag. 169
<i>officinalis</i>	pag. 180	<i>rotundifolium</i>	„ 168
Galeopsis		Githago	
<i>grandiflora</i>	„ 142	<i>segetum</i>	„ 113
Galium		Gladiolus	
<i>Aparine</i>	„ 44	<i>communis</i>	„ 8
<i>Mollugo</i>	„ ivi	Glaucium	
<i>palustre</i>	„ 43	<i>luteum</i>	„ 127
<i>verum</i>	„ 44	Glechoma	
Cenista		<i>hederacea</i>	„ 140
<i>germanica</i>	„ 174	Globularia	
<i>tinctoria</i>	„ 173	<i>vulgaris</i>	„ 40
Gentiana		Gnaphalium	
<i>amarella</i>	„ 70	<i>luteo-album</i>	„ 207
<i>Pneumonanthe</i>	„ 69	Gratiola	
Geranium		<i>officinalis</i>	„ 5
<i>dissectum</i>	„ 167	Gypsophila	
<i>molle</i>	„ ivi	<i>Saxifraga</i>	„ 107
<i>pusillum</i>	„ 168		

H

Hedera		Helleborine	
<i>Helix</i>	„ 65	<i>cordigera</i>	„ 222
Helianthemum		Hemerocallis	
<i>Fumana</i>	„ 129	<i>fulva</i>	„ 95
<i>vulgare</i>	„ 130		

Hibiscus		Hottonia	
<i>Trionum</i>	pag. 171	<i>palustris</i>	pag. 54
Hieracium		Hyacinthus	
<i>cymosum</i>	„ 195	<i>comosus</i>	„ 94
<i>florentinum</i>	„ ivi	<i>racemosus</i>	„ ivi
<i>Pilosella</i>	„ ivi	Hydrochaeris	
Hippocrepis		<i>Morsus Ranac</i>	„ 243
<i>comosa</i>	„ 180	Hyoscyamus	
Holcus		<i>albus</i>	„ 62
<i>arundinaceus</i>	„ 246	<i>niger</i>	„ ivi
<i>lanatus</i>	„ 247	Hypericum	
Hordenm		<i>perforatum</i>	„ 131
<i>maritimum</i>	„ 38	<i>quadrangulare</i>	„ ivi
<i>murinum</i>	„ 37	Hypochoeris	
		<i>radicata</i>	„ 197

I

Inula		Juglans	
<i>britannica</i>	„ 211	<i>regia</i>	„ 236
<i>crithmifolia</i>	„ 213	Juncus	
<i>dysenterica</i>	„ 212	<i>acutus</i>	„ 96
<i>Helenium</i>	„ 211	<i>bulbosus</i>	„ 97
<i>salicina</i>	„ 212	<i>effusus</i>	„ 96
<i>ensifolia</i>	„ ivi	<i>maritimus</i>	„ ivi
<i>viscosa</i>	„ 213	<i>pilosus</i>	„ 97
Iris		Juniperus	
<i>Pseud' Acorus</i>	„ 9	<i>communis</i>	„ 243

K

Koeleria	
<i>cristata</i>	„ 33

L

Laetnea		Leucojum	
<i>Scariola</i>	pag. 192	<i>aestivum</i>	pag. 89
<i>saligna</i>	„ ivi	Ligustrum	
Lagurus		<i>vulgare</i>	„ 2
<i>ovatus</i>	„ 34	Limnetis	
Lamium		<i>pungens</i>	„ 15
<i>album</i>	„ 141	Linaria	
<i>amplexicaule</i>	„ 142	<i>Elatine</i>	„ 153
<i>Orvala</i>	„ 141	<i>minor</i>	„ 154
<i>purpureum</i>	„ 142	<i>muralis</i>	„ 153
Lappago		<i>vulgaris</i>	„ 154
<i>racemosa</i>	„ 23	Linum	
Lapsana		<i>catharticum</i>	„ 89
<i>communis</i>	„ 198	<i>maritimum</i>	„ 88
Lathyrus		<i>temifolium</i>	„ ivi
<i>Aphaca</i>	„ 176	Liquiritia	
<i>pratensis</i>	„ 175	<i>officinalis</i>	„ 179
Lemna		Lithospermum	
<i>minor</i>	„ 224	<i>arvense</i>	„ 51
Leontodon		Lolium	
<i>Taraxacum</i>	„ 193	<i>perenne</i>	„ 39
<i>palustre</i>	„ ivi	<i>temulentum</i>	„ 40
Leonurus		Lonicera	
<i>Cardiaca</i>	„ 145	<i>Caprifolium</i>	„ 59
Lepidium		Lotus	
<i>granunifolium</i>	„ 158	<i>siliquosus</i>	„ 186
Leskea		<i>corniculatus</i>	„ ivi
<i>complanata</i>	„ 280		

Lychnis			Lysimachia		
<i>Flos Cuculi</i>	pag.	114	<i>Nummularia</i>	pag.	55
<i>vespertina</i>	"	ivi	<i>vulgaris</i>	"	ivi
Lycopus			Lythrum		
<i>vulgaris</i>	"	6	<i>Hyssopifolia</i>	"	117
			<i>Salicaria</i>	"	116

M

Malva			Melilotus		
<i>rotundifolia</i>	"	170	<i>Kochiana</i>	"	182
<i>sylvestris</i>	"	ivi	<i>officinalis</i>	"	181
Marchantia			<i>vulgaris</i>	"	ivi
<i>polymorpha</i>	"	259	Melissa		
Marsilea			<i>Calamintha</i>	"	148
<i>quadrifolia</i>	"	254	<i>Nepeta</i>	"	ivi
Matricaria			<i>officinalis</i>	"	ivi
<i>Chamomilla</i>	"	215	Mentha		
Medicago			<i>aquatica</i>	"	139
<i>coronata</i>	"	188	<i>gentilis</i>	"	ivi
<i>Falcata</i>	"	187	<i>Pulegium</i>	"	140
<i>lupulina</i>	"	188	<i>sylvestris</i>	"	139
<i>maculata</i>	"	ivi	Mercurialis		
<i>marina</i>	"	189	<i>annua</i>	"	242
<i>minima</i>	"	ivi	Mespilus		
<i>rigidula</i>	"	ivi	<i>germanica</i>	"	124
<i>sativa</i>	"	187	Momordica		
Melampyrum			<i>Elaterium</i>	"	238
<i>arvense</i>	"	152	Mucor		
Melica			<i>herbariorum</i>	"	278
<i>caerulea</i>	"	16	<i>Mucedo</i>	"	ivi

294
Myagrum
rugosum

pag. 157

Myosotis
arvensis
palustris

pag. 50
,, ivi

N

Nymphaea
alba
lutea

,, 129
,, ivi

O

Oenanthe

fistulosa

,, 80

pimpinelloides

,, 81

Oenothera

biennis

,, 100

Ononis

spinosa

,, 174

Ophrys

arachnites

,, 121

Orchis

conopsea

,, 221

coryphora

,, 219

mascula

,, 220

Morio

,, ivi

pyramidalis

,, 219

Origanum

vulgare

,, 146

Ornithogalum

umbellatum

,, 92

Ornus

europaea

,, 2

Orobanche

caryophyllacea

,, 156

Osyris

alba

,, 240

Oxalis

corniculata

,, 112

stricta

,, 113

P

Panicum

glaucum

,, 20

miliaceum

,, 21

Crus Galli

,, ivi

<i>verticillatum</i>	pag.	20	<i>lanccolata</i>	pag.	47
<i>viride</i>	"	ivi	<i>major</i>	"	46
Papaver			<i>maxima</i>	"	45
<i>Rhoecae</i>	"	128	<i>media</i>	"	46
<i>somniferum</i>	"	ivi	<i>maritima</i>	"	47
Parietaria			<i>Psyllium</i>	"	48
<i>officinalis</i>	"	248	Poa		
Parmelia			<i>annua</i>	"	26
<i>parietina</i>	"	277	<i>aquatica</i>	"	25
Parnassia			<i>bulbosa</i>	"	26
<i>europaea</i>	"	86	<i>Eragrostis</i>	"	27
Pastinaca			<i>maritima</i>	"	25
<i>sativa</i>	"	82	<i>megastachia</i>	"	28
Phalaris			<i>pilosa</i>	"	27
<i>arenaria</i>	"	17	<i>pratensis</i>	"	26
Phellandrium			<i>rigida</i>	"	28
<i>aquaticum</i>	"	81	Polygala		
Phleum			<i>vulgaris</i>	"	172
<i>Phalaris</i>	"	18	<i>monspeliensis</i>	"	173
<i>pratense</i>	"	ivi	Polygonum		
Physalis			<i>amphybium</i>	"	104
<i>Alkekengi</i>	"	63	<i>aviculare</i>	"	103
Phytolacca			<i>Convolvulus</i>	"	105
<i>decandra</i>	"	115	<i>Hydropiper</i>	"	104
Picris			<i>Persicaria</i>	"	ivi
<i>hieracioides</i>	"	194	Polypogon		
Pimpinella			<i>monspeliense</i>	"	19
<i>magna</i>	"	83	Populus		
Plantago			<i>alba</i>	"	241
<i>altissima</i>	"	46	<i>nigra</i>	"	ivi
<i>Coronopus</i>	"	47			

Portulaca		Prismatocarpus	
<i>oleracea</i>	pag: 116	<i>arvensis</i>	pag: 59
Potamogeton		Prunella	
<i>lucens</i>	„ 49	<i>laciniata</i>	„ 150
<i>perfoliatum</i>	„ ivi	<i>vulgaris</i>	„ 149
Potentilla		Prunus	
<i>sylvestris</i>	„ 126	<i>Mahaleb</i>	„ 122
<i>verna</i>	„ ivi	<i>spinosa</i>	„ ivi
Poterium		Punica	
<i>Sanguisorba</i>	„ 235	<i>Granatum</i>	„ 121

Q

Quercus	
<i>Robur</i>	„ 236

R

Ranunculus		Rosa	
<i>acris</i>	„ 135	<i>canina</i>	„ 37
<i>bulbosus</i>	„ 134	Rottboellia	
<i>heterophyllus</i>	„ 136	<i>incurvata</i>	„ 124
<i>repens</i>	„ 135	Rubia	
<i>aceleratus</i>	„ 134	<i>tinctorum</i>	„ 45
Reseda		Rubus	
<i>alba</i>	„ 118	<i>fruticosus</i>	„ 125
<i>lutea</i>	„ ivi	Rumex	
Rhamnus		<i>acutus</i>	„ 99
<i>Frangula</i>	„ 64	<i>crispus</i>	„ 98
Rhinanthus			
<i>Crista Galli</i>	„ 152		

S

Saccharum		Saxifraga	
<i>Ravennae</i>	pag. 36	<i>tridactylites</i>	pag. 106
Sagittaria		Scabiosa	
<i>sagittifolia</i>	„ 235	<i>columbaria</i>	„ 42
Salicornia		<i>stellata</i>	„ ivi
<i>fruticosa</i>	„ 1	<i>Succisa</i>	„ 41
<i>herbacea</i>	„ ivi	Scandix	
Salix		<i>Pecten</i>	„ 82
<i>alba</i>	„ 240	Schoenus	
<i>caprea</i>	„ 239	<i>Mariscus</i>	„ 9
<i>rosmarinifolia</i>	„ ivi	<i>nucronatus</i>	„ 10
Salsola		<i>nigricans</i>	„ ivi
<i>Kali</i>	„ 74	Scirpus	
<i>Soda</i>	„ 73	<i>acicularis</i>	„ 12
Salvia		<i>Holloschoenus</i>	„ 13
<i>pratensis</i>	„ 6	<i>maritimus</i>	„ 14
Salvinia		<i>nucronatus</i>	„ ivi
<i>natans</i>	„ 254	<i>lacustris</i>	„ 13
Sambucus		<i>palustris</i>	„ 12
<i>Ebulus</i>	„ 84	<i>romanus</i>	„ 13
<i>nigra</i>	„ 85	Scolymus	
Samolus		<i>aggregatus</i>	„ 198
<i>Valerandi</i>	„ 54	Scrophularia	
Saponaria		<i>canina</i>	„ 155
<i>officinalis</i>	„ 107	<i>nodosa</i>	„ ivi
Satureja		Scutellaria	
<i>hortensis</i>	„ 138	<i>galericulata</i>	„ 150

Secale			Solanum		
<i>villosum</i>	pag.	38	<i>Dulcamara</i>	pag.	63
Sedum			<i>nigrum</i>	"	64
<i>acre</i>	"	112	Sonchus		
Senecio			<i>asper</i>	"	191
<i>aquaticus</i>	"	209	<i>maritimus</i>	"	ivi
<i>Jacobaea</i>	"	ivi	<i>oleraceus</i>	"	ivi
<i>paludosus</i>	"	210	Sparganium		
<i>vulgaris</i>	"	209	<i>ramosum</i>	"	226
Serapias			Stachys		
<i>palustris</i>	"	222	<i>germanica</i>	"	144
Serratula			<i>palustris</i>	"	ivi
<i>tinctoria</i>	"	202	<i>recta</i>	"	ivi
Sherardia			<i>sylvatica</i>	"	143
<i>arvensis</i>	"	43	Statice		
Silene			<i>auriculaefolia</i>	"	87
<i>Otitcs</i>	"	109	<i>Limonium</i>	"	ivi
<i>sericea</i>	"	ivi	<i>reticulata</i>	"	ivi
Sinapis			Stellaria		
<i>Erucastrum</i>	"	165	<i>aquatica</i>	"	110
Sisymbrium			<i>nemorum</i>	"	ivi
<i>amphibium</i>	"	162	Stipa		
<i>Sophia</i>	"	163	<i>pennata</i>	"	34
<i>tenuifolium</i>	"	162	Symphytum		
Sium			<i>officinale</i>	"	52
<i>sulcatum</i>	"	80	<i>tuberosum</i>	"	ivi

T

Tamarix			Tanacetum		
<i>gallica</i>	"	85	<i>vulgare</i>	"	204

Teucrium		Triticum	
<i>Chamaedris</i>	pag. 137	<i>juncum</i>	pag. 38
<i>montanum</i>	„ 138	<i>repens</i>	„ 39
<i>Polium</i>	„ ivi	Trifolium	
Thalictrum		<i>agrarium</i>	„ 185
<i>angustifolium</i>	„ 133	<i>angustifolium</i>	„ 183
<i>flavum</i>	„ 134	<i>arvense</i>	„ ivi
Thlaspi		<i>campestre</i>	„ 185
<i>Bursa pastoris</i>	„ 159	<i>fragiferum</i>	„ 184
<i>campestre</i>	„ ivi	<i>hybridum</i>	„ 182
Thymus		<i>pratense</i>	„ 183
<i>Serpyllum</i>	„ 147	<i>repens</i>	„ ivi
Tragopogon		Turritis	
<i>pratense</i>	„ 190	<i>hirsuta</i>	„ 165
Triglochin		Tussilago	
<i>palustre</i>	„ 99	<i>Farfara</i>	„ 214
Trisetum		Typha	
<i>pratense</i>	„ 33	<i>latifolia</i>	„ 225

U

Ulmus		<i>purpurea</i>	„ 276
<i>campestris</i>	„ 71	Urtica	
Ulva		<i>dioica</i>	„ 232
<i>dichotoma</i>	„ 276	<i>urens</i>	„ ivi
<i>Lactuca</i>	„ 275	Utricularia	
<i>Linza</i>	„ 276	<i>vulgaris</i>	„ 5

V

Valantia		<i>spicata</i>	pag. 3
<i>cruciata</i>	pag. 247	Viburnum	
<i>tricornis</i>	„ 248	<i>Lantana</i>	„ 84
Valeriana		Vicia	
<i>dioica</i>	„ 7	<i>angustifolia</i>	„ 178
Verbascum		<i>Cracca</i>	„ 177
<i>Blattaria</i>	„ 60	<i>polyphylla</i>	„ 176
<i>sinuatum</i>	„ 61	<i>sativa</i>	„ 177
<i>Thapsus</i>	„ 60	Viola	
Verbena		<i>odorata</i>	„ 66
<i>officinalis</i>	„ 150	<i>tricolor</i>	„ 67
Veronica		Vincetoxicum	
<i>agrestis</i>	„ 3	<i>vulgare</i>	„ 67
<i>Chamaedris</i>	„ 3	Vitis	
<i>hederacfolia</i>	„ 4	<i>vinifera</i>	„ 66
<i>serpillifolia</i>	„ ivi		

X

Xanthium			
<i>spinosum</i>	„ 233		
<i>Strumarium</i>	„ ivi		

Z

Zostera			
<i>marina</i>	„ 224		

pag. lin.

3. 4. Ehrentragender E. Achrentragender E.

4. 5. Da aggiungere:

V. filiformis (Fadenförmiger E.) V. filiforme:
 Fiori solitarij, foglie cuoriformi intaccate, più brevi
 del peduncolo lunghissimo, filiformi, foglie ca-
 licine lanceolate, fusto giacente. *Savi Bot. Etrusc.*
 p. 15.

V. floribus solitariis, foliis cordatis crenatis pedun-
 colo brevioribus, calycinis lanceolatis, peduncu-
 lo filiformi longissimo. *Pers. Syn. I p. 13.*
Nasce e fiorisce come nella V. agrestis.

V. arvensis. (Feld E.) V. degli Orti.

Fiori solitarij, foglie ovate incise segrettate, le flo-
 rali lanceolate più lunghe del peduncolo, fusto
 dritto. *Savi l. c p. 17 Pers. Syn. I p. 13. Schult. aust.*
Alsine folio hirsutiore, floribus et locutis caudicis
adhaerentibus. Bauh. Hist. III p. 367 cum icone.
Nasce negli Orti e nei luoghi sassosi; fiorisce nei
mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta annuale.

7. 20. Klechner B. Kleiner B.

8. 5. Da aggiungere:

2. *V. officinalis*. (Officineler B.) V. officinale.
 Foglie tutte pennate, con foglioline lanceolate den-
 tate, fusto solcato. *L. Sp. Pers. Syn. I p. 37. Köhl.*
germ. I p. 92.

V. sylvestris magna annua. *Bauh. Hist. III p. 210.*

Phu germanicum. *Fuchs Hist. p. 853.*

Phu minore. *Matth. p. 44 cum icone.*

Nasce in Campalto appresso i Fossi; fiorisce nei
mesi di Maggio e Giugno, ed è pianta perenne.

8. 8. *F. ololitoria*. *F. olitoria*12. 1. *C. monti* *C. Monti*13. 13. *S. holloschoenus* *S. Holloschoenus*

pag. lin.

- | | | | |
|------|-----|--|--|
| 19. | 1. | purpurescente | purpurascente |
| 19. | 2. | plantagis | plantaginis |
| 26. | 13. | Da aggiungere. | |
| | | <i>P. trivialis</i> . (Gemeines R.) F. comune? | |
| | | Pannocchia diffusa, spiglette triflore pubescenti alla base, culmo scabro quasi a due tagli, linguetta bislunga. <i>Pers. Syn.</i> I p. 89. <i>Röhl.germ.</i> II p. 121. <i>Savi bot. Etrusc.</i> p. 57. | |
| | | <i>Nasce comunemente negli Orti; fiorisce nei mesi di Aprile e Maggio, ed è pianta perenne.</i> | |
| 29. | 22. | Festuca. | FESTUCA |
| 30. | 26. | ob tusiuscula | obtusiuscula |
| 35. | 8. | Rauch H | Rauh H. |
| 35. | 13. | Calicybus | Calycibus |
| 35. | 21. | <i>A. donax</i> | <i>A. Donax</i> |
| 36. | 24. | SACHARUM. | SACCHARUM |
| 41. | 22. | <i>S. succisa</i> | <i>S. Succisa</i> |
| 43. | 17. | Cynanchicha | Cynanchica |
| 57. | 29. | Meerslrands W. | Meerstrands W. |
| 58. | 24. | Piramidenartige | Piramidenartige G. |
| 59. | 27. | Durchwarsene L. | Durchwachsene L. |
| 65. | 23. | <i>H. helix</i> | <i>H. Helix</i> |
| 68. | 22. | ERYTREA | ERYTRAEA |
| 69. | 14. | DYGYNIA | DIGYNIA |
| 73. | 23. | succolente | succolenti |
| 87. | 8. | <i>Rhöl.</i> | <i>Röhl.</i> |
| 91. | 17. | alternamente | alternativamente |
| 97. | 9. | Giugno e Luglio,
<i>ed è pianta perenne</i>
<i>Fusto foglioso</i> | Giugno e Luglio, <i>ed è</i>
<i>pianta perenne.</i>

<i>Fusto foglioso.</i> |
| 104. | 20. | Hidropiper | Hydropiper |
| 106. | 21. | Dreitheliger S. | Dreitheiliger S. |
| 108. | 15. | (Aufgeblasener T.C.) | (Aufgeblasener T.) C.
gonfio. |

pag. lin.


109. 26. Da aggiungere:
S. conica. (Konische L.) *S. conica*.
 Calici del frutto conici striati, foglie lanceolate
 molli, petali bifidi: *Pers. Syn. p. 498. Röhl.*
germ. p. 269.
Lychnis sylvestris angustifolia calyculis turgidis
striatis. Zann. Ven. p. 175. t. 108.
Muscipula majori calyci ventricoso similis. Bauh.
Hist. III p. 350 icone.
Nasce a Broudolo nei luoghi arenosi; fiorisce
nel mese di Aprile, ed è pianta annuale.
109. 22. leucosifolio leucosifolio
 110. 11. Walde S. Wald S.
 111. 8. cum icon. *Sapon:* cum icone aliena
officinal.
1127. 22. alternamente alternativamente
 118. 10. *R. lutea* *R. lutea*
 121. 20. Granato Melagrano
 121. 23. *G. comune* *M. comune*
 122. 23. Peduncolis Pedunculis
 123. 9. lanceolate acute lanceolati acuti
 124. 13. Kund R. Hund R.
 130. 21. Rittersporn Rittersporn
 144. 17. Deutscher Deutscher Z.
 147. 27. *Cal. arido un po-* *Cal. arido un poco piano*
co piano nel mar- *nel margine, col lab-*
gine. Labbro supe- *bro superiore fasti-*
riore fastigiato *giato*
156. 11. *caryphyllacea* *caryophyllacea*
 162. SISIMBRIUM. SISYMBRIUM.
 173. 6. *monspeliaca* *monspeliaca*
 179. 2. fogliol. impari pe- foglioline impari, piccio-
 tiolate. late.
181. 18. Legumi nudi con Legumi nudi con due
 due semi nudi semi
 184. 9. *arvensis.* *arvense*


pag.	lin.		
195.	23.	(Vielblumis H.)	(Vielblumiges H.)
200.	7.	CARDIUS.	CARDUUS.
205.	1.	<i>Picettacolo</i>	<i>Ricettacolo</i>
213.	13.	CRITMUM	CRITHMUM
213.	8.	(Dickblättriger A.)	(Dickblättriger A.)
234.	17.	anglie	angliae
243.	9.	N.	Nymphaea
245.	18.	<i>Schuit.</i>	<i>Schult.</i>
245.	24.	seesilibus	sessilibus
249.		Venetianische	Venetianische
260.	19.	dicothoma	dichotoma
264.	9.	rem quasime ottissi	remotissime ottuse
265.	6.	Borstenförmigen H.	Borstenförmiger H.
265.	24.	Verlängerter H.	Verlängerter H.
268.	22.	dicotomia	dichotomias
270.	1.	semi strangolato-arti- colati	semistrangolato - artico- lati
271.	3.	inferormente	inferiamente
276.	16.	annuate	attenuate
280.	8.	Suberoso coriaceus.	Suberoso-coriaceus.












QK 332 .R82

Ruchinger, Giuseppe/Flora dei lidi venet ^{gen}



3 5185 00024 6551

